








Ex Bibliotheca
majori Coll. Rom.
Societ. Jesu













77.6.17

71
C
17

71
C
17

12
19
C
24

CL. GALENI
PERGAMENI

Medici præstantissimi, de
curatione per sanguinis
missionem, Li-
bellus.

LEONHARTO

Fuchsio, Scholæ Medicæ Tubin-
gensis professore publico, autore.


Cum Indice rerum præcipuarum
locupletissimo.



LVGDVNI,

Apud Iacobum Giuntam.

1546



68.11.A:17

ILLVSTRIS

SIMO PRINCIPI



Ac domino, D. Huldericho Duci
Vuirtenbergenſi & Deccenſi, co=
miti Montis Belgardorum,

domino ſuo clemen=
tiſſimo, ~~Leonhar-~~

~~us~~ Fuchſius

Medicus

P. D.



S T A T I M ut me ex
Onoltzbachio, ubi integri o=
cto annis aulae Illuſtriſſimi
principis Georgij Marchio-

nis Brandenburgensis ſumma qua potui
fidelitate inferuiui, in hanc tuam uocas=
ſes Scholam, Illuſtriſſ. Princeps, aliquam
ſtudij & obſeruantiae meae erga Celſita=
tem tuam ſignificationem dedi. Tuo enim
ampliſſimo nomini Paradoxorum meorum
tres libros inſcripſi, atq; in horum praef=
atione tibi quaſi ab exilio in hanc tua ſplen=
didiſſimã ditionem redeunti, ſum gratula=
tus, Scholaſq; huius noſtrae ac uera reli-

gionis instaurationem Celsitati tuæ qua
 potui diligentia commendauī. Verū ne-
 scio quī factum sit, ut is meus labor, sup-
 pressus fortē quorundam qui ueræ ac so-
 lidæ Medicinæ parum æqui fuere astima-
 tores malitiæ, præter expectationem meam,
 ad C. T. non uenerit. Quum uerò nuper
 mihi monasterij cuiusdam habitationem
 benignè concesseris, & horto aliquo sanè
 amplo & ad colendas stirpes, quarum sum
 studiosissimus, aptissimo mihi prospexeris,
 committere non potui quin denuò animi
 mei erga C. T. gratitudinem promptitu-
 dinemq; declararē. Nominē itaq; tuo am-
 plissimo præsentem libellum consecrare &
 publicè dedicare uolui, partim ut intelli-
 geres hoc quicquid est officij ac beneficij
 te in ingratum minimè contulisse, partim
 etiam ut Scholam nostram C. T. iterum
 commendandi mihi daretur occasio. Nam
 etsi multis argumentis hætenus prolixam
 & beneficam tuam erga hanc ipsam uo-
 luntatem declaraueris, tamen quum in ista
 iudiciorū peruersitate facilè exoriri queāt
 qui animum tuum ab hoc laudatissimo in-
 stituto deflectere uelint, necesse est uicissim
 sint qui tibi alijsq; principibus Scholarum

non solum conseruationem, sed & instaurationem persuadeant, hoc praesertim tempore, quo bonorum & uerè eruditorum uiro-
rum quasi caritas quaedam sese ostentat. Cui certè, malo qua alia ratione sibi occurrendum quàm Scholarum conseruatione, Scholarū. non uideo. Hæc namq; ueluti seminaria quæ conseru-
dam sunt atq; fontes, unde omnis generis tio necessa-
ad Rerumpub. administrationem ac gu-
ri-
bernationem necessarij homines emanant.

E Scholis enim initio prodeunt qui lxx Theolo-
cem ueritatis, hoc est Euangelium, & Dei gi.
uerbum, quo nobis nihil charius, nihil anti-
qui-
us esse debet, purè ac syncerè docent. Quibus certè si ulla Repub. utrunq; nunc
florere uideatur, destituta fuerit, diu subsi-
stere non potest. Nam si omnes tum sacras,
tum prophanas historias excutias, tamen
nullam unquam in qua ueræ religionis fuit
contemptus diu durasse comperies. Ne-
glectæ enim religionis omnes grauissimas
dederunt pœnas. Sunt itaq; hoc uno nomi-
ne, etiam si cætera omnia demas, conseruan-
dæ scholæ, ut quouis tēpore habeamus ido-
neos quos Ecclesijs præficiamus mini-
stros. In ista præsertim paucitate eorum
qui ad discenda sacra minimum uerè ac-

commodant.

Iuriscon- E Scholis etiam in Republ. accersuntur
sulti. qui cōtrouersias omnis generis cognoscant,
 bonos tueantur ac prouehant, improbos co-
 herceant & puniant, in summa qui res ex
 scriptis legibus iudicent. Vt enim iusta &
 aqua, quod plerique falsò putant, sine arte,
 sine doctrina, sine legum exquisita notitia
 perspiciantur, fieri non potest. Proinde ne-
 cesse est esse scholas, in quibus romanae le-
 ges doceantur. Proinde quum Alexander
 Seuerus probè intellexisset nullam rempu-
 blicam sine Iurisperitis constare posse, ideo
 ubi de iure, aut de negotijs tractaret, solos
 doctos & discretos adhibuit. Præterea is
 nullam unquam cōstitutionem sine uiginti
 Iurisperitis & doctissimis ac sapientissi-
 mis iuris sacrauit.

Medici. E Scholis exeunt, qui corporibus no-
 stris morbo pressis recta quadam ac legiti-
 ma ratione mederi possunt. Quibus certè
 quomodo Respublica carere queant non
 uideo. Neque enim theologus parum bona
 ualitudine præditus, ad suam functionem
 obcundam esse idoneus potest. Iurisconsul-
 tus parum aptus ad dirimendas lites erit,
 ad legationes, aliq̃s ad eum pertinētia mu-
 nia,

nia, nisi, corpus morbis uacuum circumse-
rat. Quid multa? nemo morbis obnoxius.
Rei, publicæ, quanquam est aliàs ad rei ge-
rendas exercitatissimas, commodè inservi-
re ualet. Atque hinc est ut inter hone-
stissimas disciplinas ueteres principem lo-
cum Medicina dederint. Perspectum enim
habuerunt nullam Rempublicam medico-
rum opera carere posse. Quocirca quum
Romani Casares probè intelligerēt quàm
salutares & necessarij Reipublicæ, essent
boni Medici, eis in singulos annos, ut Pli-
nius author est, amplissimum stipendiū du-
centa & quinquaginta sestereria, hoc est,
octo millia aureūm, & amplius, trecentis,
pendebant: cū tamen reliquarum discipli-
narū professoribus centena tantūm sester-
ria, id est, tria millia aureūm, & trecentos
quinquaginta quatuor numerarint.

E Scholis emergunt Musices periti, Musici.
qui animos nostros tristibus curis obru-
tos & implicitos exhilarant. Neque enim
temerè cap. 40. inquit Syrach, Vinum &
Musica letificant cor hominis.

E Scholis ad Rempublicam ueniunt Arithmetici
qui numerandi artem exquisitissimè tenēt, iici.
quique quæstores optimi esse possunt. In

*summi nullum est hominum genus cuius
 in aula, & Republica usus aliquis esse pos-
 sit, quod non è Scholis quàm alijs è locis
 aptius petatur. Prudentissimè igitur facis
 Illustrissime princeps, quòd hanc tuã Scho-
 lam, ueluti immensum aliquem thesaurum,
 non solùm conseruas, sed & quotidie ma-
 gis instaurare ac illustrare pergis. Hac
 enim ratione efficies, ut C. T., nun-
 quam sint defuturi ad quauis munia ob-
 eunda homines idonei. Quod ad conuersio-
 nem meam & commentarios in hunc Ga-
 leni libellum à me conscriptos attinet,
 Græci codicis fidem, nisi ubi deprauatione
 non carebat, diligenter sum secutus. Non
 paucos etiam locos in Aldino codice men-
 dosos emendauimus, quod commentarij nostrì
 abundè testantur, quos quidem perspicuos
 planè, & propèmodum paraphrasticos esse,
 propter crebras in hoc libello Galeni hy-
 potheses, alibi copiosius demonstratas, uo-
 luimus. Locum tamen qui est de missio-
 ne sanguinis in pleuritide, alijsq; internis
 phlegmonibus, paulò aliter atq; olim, ac fu-
 Auicennæ sius tractauì, quòd scilicet diuersa Auis-
 opinio de cennæ aliorumq; Arabum de sanguinis
 missionæ missione in pleuritide opinio, hætenus ali-
 quot*

quot millia hominum iugulauerit. Propter sanguinis
itaq; ceruicosos quosdam ac planè lapideos in pleuri-
ueteris inscitia propugnatores, in hoc lo- tude mul.
co illustrando nos longiores esse oportuit. eos iugu-
Nunc igitur clementissimè princeps illud lauit.
à te peto, ut hos ingenij mei fructus, qui sin-
gularis beneuolètia, ac summæ erga C.T.
obseruantia meæ perpetui testes sunt fu-
turi, perlibenter accipias, & me atq; uni-
uersam tuam Scholam quàm commendatis-
simam habeas. Deus Opt. Max. te inco-
lumem atque felicem quàm diutis-

simè seruet, ut per te studia
foueri, ornariq; perpe-
tuò cumulatisi-
mè pos-
sint.

Bene uale. Tubingæ xiiii

Cal. Septemb. Anno

M. D. XLV.

CLAVDII

GALENI PER-

gameni, de ratione curandi per
sanguinis missionem, Liber

unus. Leonharto Fuchsio

Medico Interprete.

CAPVT I.



IS qui de sanguinis mis-
sione contemplationem in-
stituunt, una quidem & pri-
ma est speculatio, ut qui
affectus corporis uacuatione egeant
considerent. Deim altera, qui nā ea quæ
per sanguinis fit missionem. Quippe
multi sunt affectus, qui alia quapiam
uacuatione, non sanguinis missione in-
digent. Tertia post has consideratio
est, ut dijudicent qui hanc uacuationē
citra noxam ferre queant. Nam non-
nunquam quidē affectus reperitur qui
sanguinis missionem requirit, atqui æ-
grotans eam tolerare non potest: idq;
aut propter etatem, aut anni tempus,
aut

aut regionis naturam, aut oris uentri-
culi uexationem, quod nomine abuten-
tes sæpe stomachum appellant: quem-
admodum sanè nunc etiam per totum
hunc librum, breuitatis gratia, hac ap-
pellatione utimur. Sed sunt quoq; qui
ob uniuersi corporis habitum sangui-
nis missionem non ferunt, etsi, quòd ad
morbum attinet, ea maximè egent.

COMMENTARIUS.

De curandi ratione quæ fit per san-
guinis missionem in hoc libro tractatu-
rus Galenus, principio tria proponit, *Tria prin-*
quæ ijs qui sanguinis missioe rectè uti *cipio ijs*
volunt sunt diligenter consideranda. *qui sangui-*
Primum est, ut sciant qui corporis affe- *nis misio-*
ctus vacuatione indigeant. Sunt enim *ne rectè*
morbi, utpote ex defectu nati, qui adie- *uti uolunt*
ctionem potius, quàm detractionem de *sunt confi-*
siderant. Quare quum nonnullis affe- *deranda.*
ctibus adiectione opus sit, prima erit *πρόβλη-*
speculatio. *πρόβλημα* enim hîc idem *μα.*
quòd *θεώρημα* significat: ut qui illorum
vacuatione egeant diligenter cogno-
scant. Altera deinde speculatio est,
ut qui affectus eam vacuationem quæ
per

per sanguinis fit misionē, exigant per-
 spectum habeant. Quippe sunt multi
 affectus qui vacuationem quidem desi-
 derant, atqui non eam quæ fit per san-
 guinis misionem, sed eam potius quæ
 fit per medicamenta purgantia, frictio-
 nes, balnea, ambulatiōes, motus, vinctio-
 nesq; discutientes, vt cap. 10. copiosius
 dicemus. Tertia speculatio est, vt diju-
 dicent qui hanc vacuationem quæ per
 detractionē sanguinis fit, citra noxam
 ferre queant. Nam accidit vt nonnun-
 quam affectus ipse sanguinis misionē
 expetat, ceterum æger eā ferre nequeat,
 idq; quinq; maximè de causis. Primò
 propter ætatem, quòd neq; pueri, neq;
 admodum senes sanguinis detractione
 commodè vti possint, quemadmodum
 cap. 13. copiosius demonstrabitur. Secū-
 dò propter anni tēpus: sub Cane enim
 & ante Canem, in maximis etiam frigo-
 ribus, vt cap. 14. ostendetur, nequaquam
 detrahimus sanguinem, etiamsi hanc
 ipsam vacuationē affectus maximè ef-
 flagitat. Tertiò propter oris ventriculi
 uē, quæ promptè syncopen & animi de-
 fectionem

*Cur agri
 misionem
 sanguinis
 ferre non
 possunt.*

κακωσις.

κακωσις, hoc est afflictionē vexationem

fectionem accersere solet, sanguinem
 mittere haud expedit. Hoc ventriculi
 os medici nonnulli abutentes nomine,
 stomachum appellant. Quod etiam se
 ctione 7. Aphor. commen. 57. scribit Ga
 lenus. Propriè enim loquendo, vt testis
 est lib. 4. de vsu par. corp. huma. Gale.
 nus, omnis ventris cauiue ceruicem præ
 positam, instar isthmi angustam, stoma
 chus significat. In eaq; significatione
 vox hæc antiquitus est vsurpata. Post
 Aristotelis verò seculum, vt idem testa
 tur Galenus lib. 5. de malè affe. lo. ca. 4.
 ad οἰσοφάγην, hoc est gulam duntaxat
 translata est. Dein Galeni ætate, vt hîc,
 & libro iam citato. cap. 5. metipse testa
 tur. ad os ventriculi, quod veteres καρ
 σίαμ dixerunt, transferri cœpit. Tandē
 post Galeni tempora, nomine hoc ma
 gis abutentes medici ad ipsum ventri
 culum transfulêre. Galenus autem, etsi
 in alijs suis libris stomachi vocabulo
 pro gula vtitur, tamen in hoc toto li
 bello pro ventriculi ore vsurpat. Quar
 to à sanguinis detractione abstinemus
 propter habitum corporis densum aut
 rarum, velut in explicatione sexti capi.

Os ventri

culi per a-

busum sto-

machus vo

catur.

Stoma-

chus pro-

prio quid.

καρσίαμ.

tis fufius dicetur.

Quæ ubi quis definierit, ea quæ est de occasione succedit confideratio, uti in alio quouis auxilio. Deinceps uerò ea quæ est de uenis quas incidere oportet. Quippe de istis abundè quæfitum est, nihil ne utiq; referat quam quis incidere uenam uolet, quum omnes omnibus affectibus æquè profint: an, quem admodum Hippocrates & probatiffimi medicorum quiq; censuerunt, plurimum intersit hanc præ illa incidere? Cæterum hac quoq; confideratione definita, succedit de Scopis sermo, quibus uidelicet quis animum intendens uacuationis mensuram coniectura assequatur. Posthæc uerò omnia in quibus utique semel auferre præstat, in quibus uerò repetitam uocatam ablationem fieri conuenit, & quos ad animi usq; defectionem uacuare, in quibus autem hanc, ueluti maximum detrimentum, cauere expedit. Hæc itaq; confiderare eum, qui rectè hoc præsidio

uti uolet, necesse est.

COMMENTARIUS.

Quæ ab illis qui sanguinis missione rectè uti volent initio sunt consideranda, ea iam dicta sunt. Nunc verò Galenus ad alia progreditur, quæ itidem ab ijs qui sanguinem mittere volunt contemplanda sunt, ita inquit; Postquàm ea quæ iam dicta sunt definita fuerint, hoc est, si quis de ijs certi aliquid constituerit, tum ea quæ est de occasione seu idoneo utendi tempore consideratio succedit, quæ quidem in omni alio auxilio adhibendo obseruari debet. Est autem occasio, quæ Græcis *καιρός* dicitur. *Occasio*
 tur, temporis pars in se habens rei ali- *quid.*
 cuius idoneam faciendi aut non faciendi opportunitatem. Adeoq; *καιρός* Græcis plus est quàm tempus, nempe articulus, ipsumq; momentum ac punctum, quod aiunt, in quo aliquid est agendū, ut sectione prima aphorismorum comment. i. latius ostendimus. Sensus itaq; *Sensus.*
 verborum Galeni is erit. Postquàm medicus definiuit quòd æger vacuatione indigeat, & ea quæ fit per sanguinis
 miss

missionem, illamq; citra noxam ferre
 queat, tum reliquum est vt consideret
 quo temporis momēto ea sit facienda,
 caueatq; diligēter ne occasionem amit
 tat. Nam si in omni alio præsidio non
 est temerè negligenda occasio, quanto
 minus in sanguinis missione, quod o
 mnium aliorū auxiliorum præcipuum
 est, in magnis præsertim morbis, & in
 internis inflammationibus, prætereūda
 erit? Ea siquidē neglecta, de ægrotan
 tis vita propemodū actum erit. Atque
 hinc est quòd Hippocrates dixerit oc
 casionē esse celerem & præcipitem. Ex
 ijs itaq; omnibus perspicuū sit Theodo
 ricum Gaudanum virum alioqui do
 ctū, hunc Galeni locū non rectè sic cō
 uertisse: quæ si quis etiam definire ag
 grediatur, particularis excipiet cōtem
 platio &c. Nam quomodo in quouis a
 lio auxilio particularis succedat con
 templatio non video, quandoquidē au
 xilium id nominis aliunde non sit con
 secutū, q̄ ab eo cui auxilium præstat.
 Neque enim vllum est auxilium quòd
 omnibus opitulari queat. Vt enim vna
 victus ratio accōmodari omnibus non
 potest,

1. *Aphor.*
Gaudani
conuersio
notatur.

potest, ita nec vnum auxilium omnibus
 affectibus, ac corporibus prodest: quū
 ab iisdem aliqui lædantur, aliqui iuen-
 tur, vt copiosè lib. 5. de Tuenda sanita-
 te, cap. 8. Galenus docet. Proinde quum
 per se auxilium sit aliquod particulare,
 non est cur Gaudani conuersio locum
 habere possit. Præbuit autem illi er-
 randi occasionem Græcus Aldinus co-
 dex, in quo ita scriptum est: *περὶ τοῦ μί-*
ρους σκίψης ἡμῶς διαδίδεται. hoc est, de *Aldinus*
 parte succedet cōsideratio. Hanc enim *Græcus*
 lectionem esse deprauatam, ea quæ se- *codex emē*
 quuntur abundè testātur. Quippe Ga- *datus.*
 lenus statim subiicit aliam esse contem-
 plationem de venis, vt scilicet quæ ha-
 rum sit incidenda sciamus. Quòd si ve-
 rò nobis constiterit quæ vena sit secan-
 da, simul quoq; nobis in qua parte ea sit
 incidenda innotescet. Quapropter si
 Græci codicis lectio vera esset, idē bis,
 nullo alio interveniente, inculcasset
 Galenus, quod absurditate haud vaca-
 ret. Necesse igitur est vt deprauatam
 codicis Græci lectione emendemus:
 quod quidem faciemus, si pro *τοῦ μί-*
ρους, legamus *τοῦ καίρου*, hoc est, de oc-

casione. Sic verò esse legendum in pri-
 mis antiquus attestatur interpres, qui
 hunc locum ita conuertit: de tempo-
 re consideratio. *καιρός* enim vocē sem-
 per tēpus interpretatur, etsi plus quàm
 tempus, vt comprehēsum est, significet.
 Dein sic esse legendum, ex auxiliij de-
 scriptione, quam author definitionum
 tradit, satis liquet, qui auxiliū ita defi-
 nit. *Βοήθημα ἐστὶ τὸ ἐκ τῆς ὀφείλειαι προσαγομένην*
ἀνθρώποις, συνθετὸν ἐκ ποικίλης, ποσό-
της, καὶ τάξεως, καιροῦ: Auxiliū est quod
 vtiliter hominibus adhibetur, constans
 ex qualitate, quantitate, ordine, & oc-
 casione. Quum igitur auxiliij ratio oc-
 casionis etiam considerationem inclu-
 dat, & sanguinis missio auxiliorum o-
 mnium sit præcipuum, rectissimè hoc
 loco Galenus in ea, perinde atq; in quo
 vis alio auxilio, occasionem esse con-
 siderandā hortatur. Hanc consideratio-
 nem excipit ea quæ est de venis quas in-
 cidere oportet, quādoquidem fuerunt
 qui statuerunt, quanquā falsò, nihil
 referre quam quis venā secet, quum o-
 mnibus affectibus æquè profint. Hip-
 pocrates autē, Galenus, & probatissimi
 quique

Βοήθημα
quid.

Auxiliū.

quique medicorum diuersum censent, *Plurimū*
 vt qui ratione & experientia cognoue- *interest*
 runt plurimum interesse hanc siue il- *hanc, uel il-*
 lam quis in affectibus corporis diui- *lam uenam*
 dat uenam, vt Pleuritidis exemplo in- *secernus.*
 frā, capite nimirum 16. clarissimè osten-
 det Galenus. Hac consideratione de-
 finita, succedit sermo de Scopis, qui-
 bus quispiam intentus mensuram va- *Scopi mē*
 cuationis saltem coniectura quadam *sura ua-*
 assequi potest. Sunt autem hi scopi præ *cautionis.*
 cipui quidem duo, magnitudo nimi-
 rum morbi, & uitium robur, quemad-
 modum in capitis noni enarratione co-
 piofus docebimus. Post hæc omnia
 qui sanguinis missione rectè uti vo-
 luerit, considerabit, quibus semel, &
 quibus bis sæpiusque sit sanguis detra-
 hendus, veluti fusius cap. 12. dicemus.
 Postremum contemplandum in san-
 guinis missione, quos ad animi usque
 defectionem vacuare expediat, & quos
 minus. Quam quidem consideratio-
 nem loco iam citato Galenus abun-
 dè explicabit. Hæc itaq; omnia eum,
 qui missione sanguinis rectè uti volet,
 considerare oportet.

ET de omnibus istis in tractatione de Medēdi ratione dictum est, quemadmodum & priuatim aduersus Erasistratum, quod ipse perperam ab hoc præsidio abstinuit. Deinde alium rursus librum conscripsimus aduersus eos Erasistratæos, qui uirū hunc usum esse hoc auxilio affirmant. Proinde odio digna est scelestorum Sophistarum tum uasritia, quòd quum mentiri se sciant, præ studio tamen nouarum rerum dolosè agunt: tum sapientiæ uanæ iactatio, quòd optimarum rerum ignari, contraria uerbis communiscantur. Horum enim alterum Chrysippo Cnidio accidit, qui uenæ sectionem è numero medicinaliū præsidiōrū prorsus sustulit. Sequenti sunt illum discipuli Medius & Aristogenes, clari & ipsi apud Græcos. His uerò magis Erasistratus ad splendidissimā euectus gloriam Chrysippi sententiam retinuit. Huius deinceps discipuli, omnes initio
præce

præceptoris dogmati insisterant, progressu autem temporis quidam horum ab eo defecerunt, pudore confusi impudentiissimo. Nam quid aliud dicam in eos, qui asseuerare audent Erasistratū uenæ sectionis præsidium admittere, quum tamen nusquam in suis commentarijs ullo in malo hoc consulere uideatur. Verum consentaneū erat, inquit, ut ei qui in mediam tanquam uacuatoriū auxilium recipit, multo magis uenæ sectio uacuet. Qui uerò hæc dicunt omnes uenam incidendam esse in ijs quibus Erasistratus in media præcepit uti censent. Quum igitur ipse in libro de Febrilibus in morborum principijs in mediam adhibendam esse tradat sequitur. hunc omnibus sanguinem mittere illo utique tēpore, quemadmodū etiam ipsi loquuntur. Verum maximum id malum est si ita faciendum artem discipulis iuuenibus persuaferint, multoq; etiam peius si non alia quoq; quæ definire conuenit, consideraerint. Quapropter

alio in libro ea exponere coactus sum,
 ac iuuenibus demonstrare Erasistratum
 nequaquam uenæ sectione usum:
 præstat enim hoc credere, quàm omni
 bus quibus ille uti, inedia præcepit or=
 dine incidere uenam, maximumq; agro
 tantibus ex hoc præsidio commodum
 fieri, si quis eo rectè utatur. Nō igitur,
 mea quidem sententia, aliud quicquam
 me de uenæ sectione scribere oportuit,
 quòd scilicet huius auxilij usus in o=
 pere de Medendi ratione sit exposi=
 tus, quemadmodum etiam in libris de
 Tuenda sanitate. In duob. uerò libellis,
 quorum alter aduersus Erasistratum
 inscriptus est, alter contra Erasistra=
 teos Romæ agētes, ea quæ ille non re=
 ctè est opinatus à me sunt demonstra=
 ta. Verum quum crebrò à me multi a=
 mici medici, quos piget, ut mihi uide=
 tur, Medendi libros perlegere, efflagi=
 tarent, coactus tandem sum ad præsen=
 tem explicationem redire, ne scilicet
 inuidere illis uidear, ac subinde conue=
 niente

niente ordine omnia de hoc præsidio
narrare. Atq; iam quidem tempestivum
est ordiri sermonem.

C O M M E N T A R I U S.

I N hoc capite secūdo Galenus cau-
sam exponit quare hunc librū conscri-
pserit, & cur denuò quæ in alijs locis
abundè de sanguinis missione dicta
sint, hîc repetere voluerit. Quippe de
omnib. cōsiderationibus quæ præcedē-
ti capite cōmemorauit, in libris de Me-
dendi ratione abundè dictum est. Et
quòd perperam à venæ sectione absti-
nuerit Erasistratus, ostensum est in eo
libello quem priuatim aduersum Era-
sistratum scripsit. Non esse autē illum
vsum venæ sectione, quemadmodū eius
sectatores mendaciter asserunt, in libel-
lo quodā cōmonstrauit, quem aduersus
Erasistratæos Romæ agentes conscri-
psit. Duplici autem ratione Erasistratæ
sectatores, quo hîc scelestos Sophistas
vocat, odio dignos esse ait. Primum ob
versutiā, ac vafritiam, quòd quū se men-
tiri intelligunt, præ studio tamē noua-
rum rerū, idenim καινοτο-
μία.

λογιστική dolosè & malitiosè agunt. Secūdò pro-
 pter *λογιστικήν*, id est vanæ, sapientiæ
 iactationē: quum enim optimarum re-
 rum ignari sint, tamen cōtrarium ver-
 bis comminiscūtur, atq; de rebus nul-
 lius momenti temerè verba fundunt.
*Chrysip-
pus Cni-
dius Era-
sistrati.
præceptor* Sic certè Chrysippus Cnidius, cuius La-
 èrtius lib. 7. de vita Philosophorum, &
 Galenus in libro aduersus Erasistratū
 sæpe meminit, ab eoq; multa illū didi-
 cisse testatur, sanguinis missionem ma-
 gno quidem errore, & summo ægrotan-
 tium periculo, è numero medicinalium
 præsidiorum sustulit. Fuerūt sanè præ-
 ter Cnidium illum, eumq; medicū, plu-
 res alij Chryssippi, Laërtio loco paulò
 antè citato authore. Vnus enim Solen-
 sis seu Tarsensis dialecticus insignis.
 Alter Cnidij filius Ptolemæi medicus.
 Tertius Erasistrati discipulus, Quartus
 Georgicorum scriptor. Quum igitur
 Chrysippus Cnidius Erasistrati præce-
 ptor è remediorum numero venæ se-
 ctionem sustulerit, nihil miri, & huius
 discipulum idem hoc dogma, atq; alios
 duos Medium & Aristogenem, quorū
 hîc meminit, quique clari & magni no-
 minis

minis apud Græcos fuerunt, subinde mordicus tenuisse ac sparsisse. Cæterū Erasistrati discipulī principiō in vniuersum omnes præceptoris sui dogmati insistebant: progressu tamen temporis aliqui horum ab eo defecerunt, idque vt facerent pudore quidem impudentissimo coacti sunt. Nam quum primum apertē venæ sectionem præceptoris sui exemplo è medio tollerēt, tamen tandē quum cernerēt eius vsu medicos carere non posse, illam admittere, etsi nullo in malo hac ipsa vti vsquam in suis commentarijs videatur, Erasistratum constanter affirmabant. Id ipsum verò hac ratione ostendere conabātur. Erasistratus, dicebant, inedia tanquam vacuatorio auxilio vsus est, igitur multo magis venæ sectiōe vacuauit. Verūm quā absurda hæc sit illorū ratio, hinc colligi potest. Nam qui hæc dicere audent, ij oēs statuunt in singulis ijs malis esse incidendā venam, in quibus Erasistratus inedia vti censet. Idem autem in libro de Febribus inscripto, in morborū principijs inediam adhibendam esse tradit, igitur in omnibus illis, eo-

demq; tēpore, sanguis mittēdus. Quā
 verò periculōsum sit, ita esse faciendū
 persuadere iuuenibus, & artē discenti-
 bus, nisi alia quoq;, quæ in incidēda ve-
 na definienda sunt, cōsiderata fuerint,
 nemo nō intelligit. Quare vt oēs Era-
 sistrati sectatorum absurditatē clarius
 intelligerent, coactus est Galenus pri-
 uatim ædito libello certis argumentis
 demonstrare, Erasistratū nunquā venæ
 sectione vsum fuisse. Quòd nimirum
 præstaret hoc scire iuuenes, ne scilicet
 omnibus detraherent sanguinē quibus
 ille inedia vti præcepit, adeoq; cōinodè
 hoc præsidium ægrotantibus adhibe-
 rent. Quū igitur abundè quæ ad vsum
 venæ sectionis spectant, à Galeno in li-
 bris de Medendi ratione, de quæ Tuen-
 da sanitate exposita sint, & quæ minus
 rectè de ea opinatus est Erasistratus in
 duobus alijs libellis, quorum in con-
 textu mentionē fecit, confutata sint, nō
 erat opus quicquā aliud de venę sectio-
 ne scribere Galenum. Sed quum crebrò
 amici aliqui, ijquē medici, quos libros
 de Medendi ratione legere piguit, à
 Galeno efflagitarint, horū assiduis pre-
 cibus

cibus coactusest, vt ad tractationē hāc de sanguinis missione rediret. Atq; hec paraphrastica ferè huius capitis est explicatio.

CAPVT III.

AFFECTVS quidem uox, quem admodum alibi quoq; nobis dictum est, ab affici uerbo deducta, similiter illi de multis effertur rebus. Verum *Affectus* nunc mutationes in habitū præter naturam, qualescunq; fuerint, affectus per uniuersum hūc librū nominamus. Quæremus autem primò quot, qualesq; sint effectus uacuationem poscentes: dein uerò qui nam illorum uenæ sectionem postulent. Quum autem omnia, quæ in *Duo inuentionis instrumenta.* quæstionem ueniunt, duo inuentionis instrumenta obtineant nempe rationem & experientiam, idq; in omnibus artibus, nec minus per uniuersam uitam, necessarium esse puto, & nunc aut sola ratione, aut sola experientia, aut utrisq; ea quæ proposita sunt inuenire. Quoniam uerò ratio ipsa partim ex cōmu-

nibus duntaxat notionibus incipiens inuenit & demonstrat, partim autē & ijs quæ ex illis inuenta sunt ad demonstrationem utitur utraq; ratione omnes uti artes nobis demonstratū est. Et nos quidem in præsentia utra earum utilis reperitur, illam deligemus. Priore quidem ratione omnes per uniuersam uitam homines utuntur, altera uerò non omnes, ad artifices enim tantum pertinet. Nā Geometra primū suæ artis theorema per solam priorē rationē demonstrat. Deinde in secundo nō sola priorē utitur, sed ad demonstratiōē eius, quod ex primo probatū est, coassumit. Quāto autem plus à primo theoremate recedit, tanto etiā magis à prima ratione discedit, ac postremo quidem paucissimis utitur, per ea quæ demonstrata sunt alia demonstrans, & per illa rursum alia, & deinceps iterū per illa alia, ut tandem demonstratio eorū ad ea, quæ plebeijs incredibilia sunt, progrediatur. Solis nimirum, Lunæ & Terræ
non

non solum magnitudinis, sed et distan-
tiæ cognitionem. Ex quibus utique in-
uentis horologia constituunt, et cle-
psydras, qui hac uia incedentes Solis
Lunæq; deliquia prædicunt. Pari ra-
tione nostra quoq; arte procedens ora-
tio multis quæ alijs in operibus demõ-
strata sunt utetur, ut q; aliquæ sint fa-
cultates quæ animãtia gubernât, quarũ
aliàs naturales, aliàs aïales nominât. Cæ-
terũ principia generationis in omnibus
rebus materiã habent quatuor elemen-
ta, quæ tota inuicem misceri, et mutuo
inter se agere consueuerunt. Quapro-
pter nullã Asclepiadis mentionem in
hoc libro faciemus, ut cuius elementa
esse falsa in decimotertio de Demon-
stratione commentario, et in opere de
Placitis Asclepiadis, in quo quintus et
sextus liber elementorum eius confuta-
tionem habet, ostendimus. Demonstra-
tum uerò et in commẽtario de Elemẽ-
tis Hippocratis, de effectricibus qua-
litatibus, quarum nomina caliditas, fri-

giditas, humiditas, siccitas, & de humorum tum differentia, tum generatione. Dicta quoque sunt de medicamentis singulos humores purgantibus pauca quædam in libro de Elementis, & singulatim in alio commentario. Vtilis etiã ad præsentem sermonem tractatio de Temperamentis, quæ eam quæ est de Elementis sequitur. Omnium uerò maximè liber de Plenitudine, in quo monstratum est duplicem esse plenitudinẽ, unã quidem ad uires, alterã uerò ad uasorum, in quibus hæc continetur, amplitudinem. Vocatur autem hæc plenitudo à medicis Græcis $\pi\lambda\epsilon\nu\tau\iota\varsigma$ ἢ ἐγχυμα, id est, ex infusione. Optimum igitur est ut ij qui scienter scrutari ea quæ in hoc libro dicuntur, uolent, de plenitudine librum perlegerint. Quæ uerò iterũ antea esse perlecta requirit, ipse indicabit. Nemo uerò miretur si tot opus sit nobis ut rectè de uenæ sectione consideremus. Non enim ad huius modò præsidij inuentionem, sed ad aliorum etiam omnium

omnium necessaria est iam comprehen-
sorū cognitio. Proinde si citra illorum
notitiam rectè curare liceret, haud tam
accuratè ea prosequeremur. Hæc itaque
præfari necesse fuit.

COMMENTARIUS.

QVVM sæpe in hoc libro affectus
voce utatur Galenus, ideò initio huius
capitis quid per eam intelligi velit bre-
uissimè exponit. Quippe affectus gene- *Affectus*
ration pro omni eo à quo aliqd aliquo *quid,*
modo afficitur accipi solet. Atq; sic di-
citur à verbo affici, quod similiter atq;
affectus de multis dicitur rebus, nempe
sanis, ægris, neutris, & inanimis quoq;
cantu videlicet, harmonia, & oratione,
ut copiosius capite primo libri de Sym-
pto. diffè. docet Galenus. Dein affectus
idem quod cōstitutio significat, & tum
ad sanos & ægros quoq; pertinet. Ter-
tiò autem omnem, quæ in id quod præ-
ter naturam est, mutationem denotat.
Qua quidem in significatione in hoc
libro à Galeno vsurpatur. Post hæc pro-
ponit de quibus initio huius libri sit
dicturus, nempe quot qualesq; sint af-
fectus

fectus qui vacuationē postulent, & qui
nam illorum venæ sectionem exigant.

Dou inuē- Antequam verò ad inuentionem atque
tionis om- explicationem earum rerū quę propo-
nium in- sult perueniat, quòd duo sint omnium
strumenta. eorum de quibus queritur inuētionis
Ratio bi- instrumenta docet, ratio scilicet & ex-
fariam de- perientia, vt lib. etiam 1. Thera. metha,
monstrat. cap. 3. Et lib. 3. Prognost. cōmen. 12. & 1.
Cōmunes Aph. comment. 1. attestatur. Cæterū ra-
notionēs. tio ipsa bifariam demōstrat & inuenit.
κοινὰ, ἐν- Primum ex communibus duntaxat no-
νοιαί. tionibus, quę Græcis vocantur κοινὰ ἐν-
Prīcipia. νοιαί, & non sunt nisi vniuersales quędā
Dignita- sententiæ nobiscum natæ, ac diuinitus
tes. omnium animis inscriptæ, quasq; natu-
Maxima. ra omnes homines tenent. Aristoteles
vocat principia, sunt enim initia & fon-
tes omnium disciplinarum. Alij digni-
tates etiam appellant, quod iure illis sit
habenda fides. Maximas alij, quòd ijs
maximè credatur, vtpote per se notis.
Eiusmodi enim sunt, vt quisq; statim
audiras probet. Quare quū ijs in sciē-
tijs nihil prius superiusq; sit per quod
cōfirmari queant, meritò ijs ipsis ratio
primum inuenit & demōstrat. Dein ra-
tio ad

ad demonstrationem utitur ijs quæ
 er notiones communes inuenta sunt.
 iore modo demonstrandi omnes per
 iuersam vitam homines utuntur: alte
 solùm artifices. Id quod Geometra-
 m exemplo ostendit. Hi nanq; pri-
 um suæ artis Theorema per solâ prio-
 m rationē, quæ scilicet ex cōmunib.
 tionib. procedit, demonstrant. In se-
 ando autē theoremate demonstrādo
 on solùm priore, sed eo etiā quod ex
 imo est probatum theoremate ad de-
 onstrationem assumuat. Quātò verò
 us à primo recedit theoremate Geo-
 eter, tantò quoq; magis à prima ra-
 one, quæ ex cōmunibus notionibus
 rocedit, descendere solet. Postremū au-
 m paucissimis seu minimis: Græci e-
 im est *ἐκ τῶν κοινῶν*, utitur, quòd scilicet
 er ea quæ antea sunt demonstrata a-
 a, & per illa rursus alia demōstret, do-
 ecadea quæ plebeijs sunt incredibi-
 a, nempe ad Solis, Lunæ, & Terræ ma-
 nitudinis ac distantiae cognitionem.
 demonstratio progrediatur. Exempla
 us rei multa extant apud Euclidem,
 hic monendus nobis lector erit. Græc.

Galen lo- cum Aldinum codicem multò aliter ha-
cus emacu bere quàm nos conuerterimus, ita nimi-
latur. rum: ὁ γάρ τοι γεόμετρος ὁ μὲν πρῶτον
 θεωρεῖται τῆς αὐτοῦ τέχνης διὰ τοῦ προτέρου.
 ἔτα τῷ δευτέρῳ μόνῳ χρῆται, προσλαμ-
 βάνει ὃ ἐστὶν τὴν ἀπόδειξιν αὐτῆς καὶ ἐκ τοῦ
 πρώτου κατασκευάζει. Hanc autem lectio-
 nem esse deprauatam nemo nō animad-
 uertit, quòd nimirum tautologiam con-
 tineat. Primum enim dicit, Geometram
 in secundo demonstrando theoremate
 sola secunda ratione vti, & mox subij-
 cit ad eius demonstrationē etiam coas-
 sumere quod ex primo est ostensum. Si
 secunda vtitur, certè aliquid quod an-
 tea demonstratum est ex communibus
 notionibus ad demonstrationē coassu-
 mit. Quippe secunda ratione vti, nō est
 nisi ea quę ex cōmunibus notionibus
 inuenta sunt, ad demonstrationē adhi-
 bere, hoc est coassumere quod ex pri-
 mo est ostensum. Nihil itaq; differt di-
 cere, sola secunda ratione vti, & coas-
 sumere quod ex primo ostēsum est. *Quin*
 etiam antiquus interpret manifestè fal-
 sam esse hanc lectionem monstrat, qui
 locum hunc ita reddidit. Ad secun-
 dum

um verò non sola vititur, coassumit
 uteni ad demonstrationem eius & id
 quod per primum constructum est. E-
 hendendus itaque is Galeni locus in
 hunc modum erit. ἄτ' ἐν τῷ δευτέρῳ οὐ
 ὄντω χρῆται, προσλαμβάνει δ' ἢ τὴν ἀπό-
 λειψιν αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ πρώτου κατασκευαστὲν,
 Et sit is planè sensus illorum verborum
 quem in nostra conuersione expressi-
 mus, nempe, Geometra in secundo suæ
 artis theoremate nō solūm prima ratio-
 ne, quæ ex cōmunibus duntaxat notio-
 nibus inuenit, vititur, sed ad demonstra-
 tionem huius theorematitis etiam id assu-
 nit, quod ex primo theoremate est pro-
 batum. Perperam itaq; αὐτῆς pro αὐτῷ
 legitur. Porro qui ratione iam exposita
 solis Lunæq; deliquia prædicunt, illi
 quoq; horologia & clepsydras cōstruūt.
 Clepsydræ autem horologia fuerūt quæ
 quam qua horæ notabantur inclusam
 habuerūt. Pro quibus hodie quæ arenu-
 am, vel albicantem puluisculum, quo
 horæ sigillatim inuertendo notātur, in-
 clusum obtinent, vitimur. Cæterum ut
 Geometræ ad demonstrationem inter-
 dum ijs quæ per alia sunt demonstrata

Sensus.

*Clepsy-
 rar.*

adhibent, sic etiam in hoc libello Galenus noster multis, quæ in alijs libris sunt demonstrata, ad instituti sui probationem, veluti hypothesibus quibusdã, utitur. Inter quæ sanè primum est, quòd aliquæ sint facultates, naturalis nimirũ & animalis, quæ animantia gubernât. Duarum verò hîc tantũ meminit, quum tamen tres esse lib. 9. Ther. metho. cap. 10. & in libris de Hippocratis & Platonis dogmatibus disertè tradat, quòd scilicet vitalẽ, quæ tertia existit, & quã hoc loco præterijt, sub naturali cõplexus sit. Naturalẽ enim facultatem vocat quæ ex corde & iecore per arterias & venas corpori vitam & alimoniã impertit. Sic libro de musculorum motu secundo Galenus actionem naturalem vocat eam, quæ ex arteria & vena procedit, quòd scilicet vtraque voluntatis expert sit, & spõtè ac naturaliter fiat. Alterum quod alibi, nempe in libris de Elementis, demonstravit, est quòd principia generationis in omnibus rebus pro materia habeant quatuor elemẽta. Principia enim quatuor sunt qualitates, Gale. lib. j. de humana natura com. 2. teste, summa scilicet

*Duarũ tantũ
tum facultatum ani-
mantia gubernantiũ,
cur hic memin-
erit.
Naturalis
facultas.
Actio natu-
ralis.*

licet caliditas, frigiditas, humiditas, & siccitas, ex quibus & materia, elementa ipsa, quæ sunt corpora simplicia, procreata esse constat. Hinc est quod Galenus libro primo de Elementis inter reliqua sic scriptum reliquerit: Per qualitates elementa facta sunt. Quum enim summa caliditas materiæ innascitur, vniuersum iam erit elementum. Eodem modo quum frigiditas, & humiditas, & siccitas innascitur. Hæ enim solæ substantiam subiectam alterantes, mutue inter se elementorum transmutationis causæ sunt. Principia verò dicta sunt, quod nihil se prius habeant ex quo procreata sint, neq; fiant ex se vicissim, neq; ex alijs, & quod ex se oia quæ sunt naturaliter producant. Ignis itaq; generationis principium, materia est vniuersis subiecta elementis, qualitatis expers: ite calor summus materiæ innascens. Elementa autem quatuor, quæ principia per materia habent, in rerum generatione non solum inuicem commiscantur, veluti in tritici, hordei, eruorum, & fabarum aceruo accidit, ita vt sic qualia sint remaneant. sed alterata transmutataq; tota inuicem com-

*Principia
cur dicta.*

*Elementa
quomodo
inter se com-
misceantur.*

miscentur, & mutuò inter se agunt. Adeoq; quòd in se mutuò agunt, non ex cōcretionē & separatiōe, sed quòd substantia eorundē per se totā patiatur & alteretur, obtinēt. Atq; ita de elemētōrū ratione differuit Hippocr. Porro quum Asclepiadis elemēta falsa esse tum in de cimetertio de Demonstratione libro, tum in quinto & sexto de Placitis Asclepiadis libris Galen. euidentibus rationibus docuerit, ideò illorū in hoc libro nulla fit mentio. Sunt autē Asclepiadis elementa, minima & incompacta corpuscula, quę ille ὀγκους καὶ πόρους nominavit, vt constat ex lib. 1. de Tuēda sanitate, cap. 2. & lib. 1. Simpli. cap. 1. & cap. 1. libri de Differentijs morborum. Dolendum autem vnicè est, quòd Demonstrationum quindecim libris Galeni haftenus, magno incommodo studiosorum medicinę, carere coacti sumus, ab inuidis βιβλιοτάταις occultatis. In ijs enim multa sunt quę lucē pręsenti, alijsq; cōpluribus Galeni locis afferre possent. Sed bona spes est eos propediē in lucē prodituros. Ita enim ad me nuper doctissimus vir Io. Albertus Vuidmestadius,

Asclepiadis elementa.

Demonstrationum. 15. libri Galeni propediē in lucem prodibunt.

dius, cognomento Lucretius, Iuriscōs.
& senator Bauaricus scripsit: Dum pas-
sim Nicolai integritati consulere stu-
deo, fortè se mihi Galeni libri. 15. *πρὸς*
ἀποδιῆς offerunt ex Bibliotheca Io.
Petri Feretrij Rauēnatis, Iuriscōf. do-
ctissimi, & Mylensium episcopi, qui eos
se mihi per Graffteros mercatores, vt
hinc in lucem exeant, missurum spon-
dit. Hec ille. Quæ hoc loco cōmemora-
re volui, vt etiā alijs qui hos libros au-
dè expectant, aliquam eorūdem spem,
& haud dubiè certam, facerem. Tertiū
quod in Cōmentario de Elementis de-
monstrauit, est quòd quatuor qualita-
tes de sentētia Hippocratis sint effectri-
ces, quum cōtrā alijs quidā primas duas
effectrices, aliās verò duas passiuas esse
dixerint, quemadmodum lib. 1. de Natu-
ralibus facult. Galenus testatur. In eodē
etiam commentario, secundo nimirū,
aliquid est de differētia & generatione
humorū, quæ copiosius subinde lib. 2. de
Naturalib. facult. Galenus demonstrauit.
In secundo quoque de Elementis libro
pauca quædam de medicamentis singu-
los humores purgantibus dicta sunt, &

seorsum in libello de Purgantium medicamentorum facultatibus. Quę certę singula tanquam alibi demonstrata tenere decet eū qui cum fructu aliquo presentem libellum de Curadi ratione per sanguinis missionē legere voluerit. Vtile quoq; erit ei perspecta habere ea quę in libris de Temperamentis, & de Plenitudine inscripto tradita sunt & demonstrata, pręsertim quod duplex sit plenitudo, vna ad vires, altera ad vasa, quę Gręcis medicis vocatur κατὰ τὸ ἔγχυμα, quod scilicet humorum copia tum vasīs veluti infusa sit. Atq; horū omnium cognitio non solum ad tractationem eam quę est de sanguinis missione cōfert ac necessaria est, sed ad aliorum etiam omnium pręsidiorum quibus morbi profliguntur inuentionem conducit. Hinc est quod eadem tam accuratē prosecutus sit Galenus.

Plenitudo

κατὰ τὸ
ἔγχυμα.

CAPVT IIII.

CAeterum iam tēpus est ordiri sermonem, considerando quot sint affectus qui uacuatione indigent. Si igitur eos quispiam experientia collectos recenscat,

recenseat, sola ad enarrationē opus est memoria. Quòd si uerò rationali uia, commune & uniuersum inueniat genus necesse est. Ex illius deinde in species & differentias sectione usque ad extremas species, numerum affectuum qui uacuationem indicant inuestigare oportet. Sic enim constare omnia quæ per uiam ratione utentem inueniuntur, demonstrauimus. Quum itaq; medicæ artis officiū sit, omnium partium corporis quæ secundum naturā sunt actiones, si quidem pereunt, recuperare, tueri autem ubi saluæ fuerint, hæc; constitutionem naturalem sequantur: hæc quidem præsentem tueri, intereuntem uerò recuperare necesse est. Postquam igitur demonstratū est, primarias actiones à similaribus corporibus perfici, ab instrumentarijs uerò secundarias, considerandū erit tibi quam utilitatē aut noxam humores qui in corpore cōtinentur partibus eius afferant. Quum itaq; in libro de plenitudine ostensum sit bisariam fieri & dici *Plenitudo duplex.*

multitudinem, uno quidē significato ad
 uires, altero uerò ad amplitudinem uas-
 forum humores continentium, quam non
 nulli $\kappa\tau\lambda$ $\rho\acute{o}$ $\epsilon\gamma\chi\upsilon\mu\alpha$, hoc est, ex infu-
 sione nominant: utriq; uacuatione opus
 est, siue in agrotante homine, siue sano
 euenerint. Quemadmodum enim qui o-
 nus gestat non protinus ubi grauatur
 ac fatigatur iam concidit & uictus ab
 eo est: ad eundem modum ubi uirtus à
 plenitudine grauatur, fieri potest ut nō-
 dum agrotet homo. Si quidem nonnulli
 qui consueta etiānum munia obeunt, sen-
 tire se graues, pigros, segnes, & agrè
 mobiles dicunt, ea ipsa est plenitudo ad
 uires: ueluti etiā quum ab exercitijs ten-
 di uidentur, ut Erasistratus dixit, imple-
 tur brachia & cubitus: haud exigua est
 alterius plenitudinis, quam $\kappa\tau\lambda$ $\rho\acute{o}$ $\epsilon\gamma\chi\upsilon\mu\alpha$,
 hoc est, ex infusione uocari dixi,
 eo quòd ex humoribus in uasa infusis
 consistit & intelligitur, nota. Dictum
 uerò est in libris de Sanitate tuenda, ubi
 in uniuerso corpore fit ulceris sensus,
 potissi-

potissimum uerò per motiones ipsas,
unc affectum uitiosi humoris esse so-
lem. Attamen hoc ipsum non paucis
tiamdum consuetas obeuntibus actio-
es accidere apparet. Interdum etiam in
artibus quibusdam corporis, nō in uni-
ersa eius mole, signa conspiciuntur il-
is in partibus consistentium affectuū,
miliū ijs quales utiq; in toto corpo-
e cōsistere diximus. Quippe caput ali-
quando solū grauari, aut ulceris quenz
lam sensum habere, uel temporū muscu-
os tendi, idq; simpliciter, aut cum plu-
rimo calore. Sic etiam in iecore, liene,
entriculo, costis, & transuerso septo
grauitatem sæpenumero sentimus. Pari-
tione in ore uētriculi aut grauitatē, aut
orsū, aut nauſeā, aut ciborū fastidiū,
aut absurdā appetentiā percipimus. Ad
hec fixi in parte aliqua dolores, idq;
aut propter humorum confertim in-
gruentem multitudinem, aut flatuosum
ob spiritum uacuationem indicāt, per-
nde atq; ij dolores qui ob acrem humo-

rem partem exedentem rodentemq; excitantur. Sunt uerò nonnulli qui ab intemperie nascuntur, & horū ipsorum quidē alij à nuda citra humores intemperie, alij uerò cū humoribus. in omnibus itaq; iam dictis, infestatum humorum, aut uaporum uacuationes, hominem à malis liberant. Non tamen omnino uenæ sectione opus est, sed sufficit etiam purgatio, frictio, balneum, & inunctio discutiētis alicuius medicamēti. Qui igitur sunt affectus quos sanguinis missio iuuat, deinceps dicantur.

COMMENTARIUS.

QVVM initio huius libelli Gale. tria quæ ijs qui sanguinis missiōe rectè uti volunt considerata sunt proposuisset, nūc à primo exorsus quot sint affectus uacuatione indigentes docet. In huius uerò rei inquisitione, ut omniū aliarū, duplici instrumento est opus, experientia nimirum & ratione. Si experientia quispiam numerū affectuum uacuatione indigentium inquirere, & inquisitos subinde recensere voluerit, sola ad enarra

enarrationem eorundem affectuum opus
 est memoria. Meminisse enim oportet
 eorum omnium quos diutina experientia
 vacuatione egere obseruauit. Quod si
 uero logica seu rationali via in prædi-
 ctis inquirendis affectibus uti quispiam
 uelit, primum commune & genus uniuersum,
 hoc est quod in se complectatur omnes
 corporis affectus, inueniat necessarium
 est. Quo quidem inuento illud in species
 & differentias digerat oportet, ita
 ut sectio ipsa usque ad extremas species
 progrediatur. Ea inquisitionis ratione
 usus est Galenus in libro de differentiis
 morborum inscripto. Illic enim initio
 genus constituit, quod subinde in species
 & differentias secatur, ad extremas usque
 species progrediens. Hoc est, ut nostri
 hodie dialectici loquuntur, à genere ge-
 neralissimo ad speciem specialissimam pro-
 gredi oportet eum qui rationem rem ali-
 quam inuenire conatur. Cæterum quoniam
 artis medicæ duo sunt officia, unum quod
 curationes partium corporis quæ sunt se-
 cundum naturam tuetur, alterum quod
 ablatas, profligandis nimirum morbis,
 recuperat: atque hæc quidem corporis cõ-

*Genus uni-
 uersum.*

*Artis me-
 dicæ duo
 officia.*

stratus dixit, brachia implentur. Distentio enim, vt in lib. de plenitudine ait Galenus, eius quæ ad vasa nominatur effectus existit. Et qd aliud est bonus athletarū habitus, cuius sectiōe prima Aph. 3. meminit Hippocrates, nisi plenitudo ad vasa, quæ etiam κατὰ τὸ ἔγχυμα, ob causam hîc à Galeno expositā, appellatur? *Vlceris sensus.* Accidere autē sanis adhuc hominibus plenitudinem ad vasa, ex vlceris sensu, qui nonnunquam illis per notiones accidit, fit manifestum. Neq; enim is affectus est nisi vitiosi humoris soboles, vt lib. 3. de Tuenda sanitate, capite 4. Galenus in eum scribens modū attestatur: Vlcerosus affectus ab excrementorum copia tennium simul & acrium oritur: quæ nimirum inter exercitandum proueniunt duplici de causa: aut eo excremento quod crassius erat fuso & attenuato, non tamen toto expulso, aut adipe molliūe carne liquata. Necessē enim est à tali humore ceu tenui & acri, pungi & quasi vulnerari tum cutem, tum ipsam carnem. Hæc ille. Cæterum affectus prædicti non tantū in vniuerso corpore, sed etiam in partibus quibusdā corporis

corporis interdum consistunt. Quippe
 nonnunquā solūm caput grauatur, aut
 laceris sensum habet. Interdum muscu- *Musculi*
 temporales nominati tātūm, tendi vi- *temporales,*
 entur, qui duo quidem sunt, vtrinque
 nim vnus, qui à verticis, & temporis, &
 rōtis, & cuneiformij ossibus, & eo osse
 quod minorem sedis oculi angulū am-
 plectitur, amplo latoq; principio enasci-
 tur, ac maxillæ inferioris acuto proces-
 su inferitur. De quibus Galenus lib. 4.
 Anat. adm. & lib. II. de Vsu partium mul-
 ta. Tenduntur autem interdum prædi-
 cti muscoli simpliciter, hoc est citra in-
 temperiem aliquā, nonnunquam verò
 plurimo calore. Sic euenit vt gra-
 uitatē aliquando in ore ventriculi, aut
 morsum, aut nauseam, aut ciborum fa-
 tidium, aut absurdā appetentiam sen-
 tiamus, quæ quidem omnia plenitudi-
 nis alicuius signa existunt. Ad hæc in
 parte aliqua corporis dolores figuntur, *Doloris!*
 ut propter humorū cōfertim ingruen- *causa na-*
 tiam copiam, aut flatuosum ob spiritū. *ria.*
 Acrēs præterea humores partem aliquā
 corporis erodentes, & exedentes exci-
 tantur. Deniq; dolor aliquando ab in-

*Omnes do-
loris causæ
duæ.*

temperie, vel nuda, hoc est citra humo-
res, vel cum humoribus nascitur. Quas
quidem omnes causas doloris Galenus
lib. 12. Ther. metho. capite 7. in duas con-
trahit, nempe continuitatis diuisionē,
& alterationem. Humorū enim copia
confertim ingruentium, flatuosi spiri-
tus, & acres humores vnitatem soluunt,
ideoq; dolorem excitant. Intemperies
autē alterando dolores mouent. Quod
etiam Hippocratem fecisse constat, qui,
vt attestatur cāpite 4. de Inæquali intem-
perie, & lib. 1. de Sympt. causis, capite 5.
Galenus ita scriptum reliquit: Dum al-
terascit ac corrumpitur natura, dolores
fiunt. Alteratur verò & corrumpitur cu-
iusque natura, quum vel calefit, vel fri-
gefit, vel siccatur, vel humefit, vel eius
vnitas soluitur. Quòd autem alteratio-
nem ipsam dolorem excitantē tum con-
fertim factam, tum verò violentam esse
oporteat, Galenus locis iam citatis co-
piosè monstrat. Porro vt tandem qui
sint affectus vacuatione indigentes, Ga-
lenus disertè significaret, subiunxit in-
quies: In omnibus iam dictis affectibus,
vacuatiōe humorū & vaporū opus est,
quòd

quòd ipsa hominem à malis & doloribus liberet. Quum autem variæ sint vacuationis species, non semper opus est venæ sectione, sed sufficit interdum purgatio, ut ibi acres fuerint humores, interdum etiâ frictio, balneum, & inunctio discutiētis alicuius medicamēti, vel uti si propter flatus excitentur dolores, hæc enim tria flatus & vapores euocare possunt. Reliquum nunc est, ut deinceps qui sint affectus quos sanguinis missio iuuat dicamus.

CAPVT V.

Non solum partes animantis ex sanguine aluntur, sed & natiuus calor mansionē ex sanguine obtinet, perinde atq; ignis qui in foco est ex lignis ad ardendum idoneis, à quo totas ædes calefactas conspiciamus. Quemadmodū igitur ignis ille offenditur, interim quidē cōfertim ei iniectis lignis, interim uerò tametsi nō multis, tamē admodū humidis, nōnunquā autē omninō nō impositis, aut prorsus exiguis: sic calor, qui in corde existit uel propter sanguinis

copiā, uel propter multam indigentia,
 uel ob qualitatem frigidam seipso mi-
 nor efficitur. Interim uerò maior, aut
 propter calidam sanguinis qualitatem,
 aut ob exiguum defectum. Quicquid au-
 tem cor per caliditatem uel frigiditatem
 patitur, huius etiam confestim aliæ
 corporis partes participes fiunt.

COMMENTARIUS.

ALTERVM quod initio huius li-
 belli ijs qui sanguinis missione uti re-
 ctè uolent considerandū proposuit Ga-
 lenus explanaturus, nempe qui affectus
 sint quos sanguinis missio iuuat, quæ-
 dam ad eam rem melius intelligendam
 necessaria præmittit, nempe quòd par-
 tes corporis omnes ex sanguine nutrian-
 tur, & quòd suam mansionem natiuus

Oēs par- calor ex sanguine habeat. Si enim omnes
tes corpo- corporis partes, ueluti humore sibi fa-
ris ex san- miliarissimo, ex sanguine aluntur, non
guine alun- erit certè detrahendum temerè, ne scili-
tar. cet suo alimento partes illæ destituan-
tur, corporisq; robur deiciatur. Quòd
si etiā calor natiuus mansionē suā ex san-
guine obtinet, cauendum unicè erit ne
 intemp

intempestiua sanguinis missione nati-
uum corporis calorē imminuamus, aut
prorsus extinguamus. Aut contrā per- *Calor na-*
mittamus, vt eiusdem copia suffocetur. *tius ex*

Quare si calor natiuus ex sanguine p- *sanguine*
inde atq; ignis in foco ex lignis fove- *fouetur.*

tur, fit vt iisdē rationibus augeatur mi-
nuaturq;. Quemadmodū enim ignis à
quo tota domus incalescit, lignis ei con-
fertim iniectis suffocatur, aut prorsus
extinguitur: ita quoq; calor qui in cor-
de existit à copia sanguinis. Quando e-
nim venæ immodico sanguine turge-
scunt, calor natiuus, quod scilicet per-
spiratu ad refrigerationem destituatur,
attestante in sine libelli de Bono corpo-
ris habitu, & de Vsa respirationis Gale-
no, extinguitur. Et sicuti ignis à lignis
humidis, etiam si multa non sunt, detri-
mentum aliquod accipit: ita quoq; ca-
lor natiuus à frigida aliqua qualitate
offenditur, minorq; fit. Minorem au-
tem illum efficiunt frigida, vbi exigua
quātitate assumpta fuerint, aut si minus
sint valida. Hinc est quod Galen. li. 3.
de Simpl. med. fac. cap. 18. ita scriptū reli-
querit: Quęcunq; frigiditate occidunt,

ea exigua quātitate sumpta mortē haud
 afferunt, nō magis q̄ si copiosæ flammæ
 pauxillum aque instilles, aut lignū inij-
 cias humidū ac viride. Sin copiosa fue-
 rit qualitas frigida, tum calorē, perinde
 atq; ligna viridia & humida si multa cō-
 fertim inijciātur, ignem, celerrimè ex-
 tinguet. Deniq; vt ignis nō impositis il-
 li lignis, aut valde exiguis offenditur:
 sic etiā calor natiuus ob sanguinis mul-
 tam indigentia deficit. Materia itaque
 vnde accenditur calor natiuus sangui-
 nem, vt in lib. de Vsu Respir. ait Gale-
 nus, obtinet. Cæterū calor cordis bifa-
 riam intenditur augeturūe, propter sci-
 licet calidam sanguinis qualitatem, &
 ob exiguū eiusdem defectū, Per ἐνδεια
 ὀλίγην autem, hoc est defectū exiguum,
 intelligit cōmoderatā sanguinis quan-
 titatē: id quod ex contrarijs paulò antè
 memoratis euidentissimū fit. Quippe
 minorē effici calorem cordis ab immo-
 dico sanguine, & immodica eiusdē indi-
 gentia dixit: igitur quod in medio est
 vtriusq; illū fouet & conseruat. In me-
 dio verò vtriusq; est exigua indigentia,
 hoc est ea quæ nō est immodica, sed cō-
 modera

Calor cor-
 dis bifariā
 intenditur,
 ἐνδεια ὀλί-
 γη.

moderata, tanta nimirum ut cōmode-
 atum cordis calorē tueri & conseruare
 possit. Quod adstruimus exemplo
 ignis & flammæ. Galenus quoq; in lib.
 de Vsu Respirat. in hunc modum scri-
 bens, confirmat: commodatio, inquit,
 omnium, conseruatricis est flammæ.

Eodem modo igitur non dissimile
 vero est cōtingere, & circa insitum ani-
 mantibus calorem, utpote qui materiam
 unde acceditur sanguinē habet. Quo
 quidē in loco multa ad institutū facien-
 tia reperient studiosi, & lib. 3. de Téper.
 cap. 5. ubi animantia bifariam calidiora
 fieri, aut qualitate caloris intensa, aut
 substātia eius aucta, copiosè monstrat.

Ex ijs igitur perspicuū est calorē cor-
 dis, perinde atq; flammā, ab eadē mate-
 ria nō augeri modò, verum etiā aliquā-
 do, extingui, ut fufius capite 2. libri de
 Morb. causis Galenus mōstrauit, ad quē
 locum lectorem ablegamus. Porro quic-
 quid cor per caliditatē, vel frigiditatē
 patitur, huius etiam cōfestim aliæ par-
 tes corporis participes fiunt. Nam
 tum veluti ex quodam fonte in vni-
 uersum corpus calor & frigus deriua-

*Calor cor-
 dis ab ea-
 de augetur
 & extin-
 guitur.*

rem partem exedentem rodentemq; ex-
 citantur. Sunt uerò nonnulli qui ab in-
 temperie nascuntur, & horū ipsorum
 quidē alij à nuda citra humores intem-
 perie, alij uerò cū humoribus. In omni-
 bus itaq; iam dictis, infestatum humo-
 rum, aut uaporum uacuationes, homi-
 nem à malis liberant. Non tamen omni-
 nò uenæ sectione opus est, sed sufficit
 etiam purgatio, frictio, balneum, & in-
 unctio discutiētis alicuius medicamēti.
 Qui igitur sunt affectus quos sangui-
 nis missio iuuat, deinceps dicantur.

COMMENTARIUS.

QVVM initio huius libelli Gale. tria
 quæ ijs qui sanguinis missiōe rectè uti
 volunt consideranda sunt proposuisset,
 nūc à primo exorsus quot sint affectus
 vacuatione indigentes docet. In huius
 verò rei inquisitione, ut omniū aliarū,
 duplici instrumento est opus, experien-
 tia nimirum & ratione. Si experientia
 quispiam numerū affectuum vacuatio-
 ne indigentium inquirere, & inquisi-
 tos subinde recensere voluerit, sola ad-
 enarra

enarrationem eorundem affectuū opus est memoria. Meminisse enim oportet eorum omniū quos diutina experientia vacuatione egere obseruauit. Quod si verò logica seu rationali via in prædictis inquirendis affectibus vti quispiam velit, primum cōmune & genus vniuersum, hoc est quod in se complectatur omnes corporis affectus, inueniat necesse est. Quo quidē inuento illud in species & differentias digerat oportet, ita vt sectio ipsa vsq; ad extremas species progrediatur. Ea inquisitionis ratione vsus est Galenus in libro de differentijs morborum inscripto. Illic enim initio genus constituit, quod subinde in species & differētiās secat, ad extremas vsq; species progrediens. Hoc est, vt nostri hodie dialectici loquuntur, à genere generalissimo ad speciē specialissimā progredi oportet eum qui ratione rem aliquam inuenire cōnatur. Cæterum quā artis medicæ duo sint officia, vnū quod actiones partium corporis quæ sunt secundum naturam tuetur, alterum quod sublatas, profligandis nimirum morbis, recuperatq; hæc quidem corporis cō-

Genus vniuersum.

Artis medicæ duo officia.

stitutionem præter naturam, illæ verò naturalem sequantur, oportet eam quæ naturalis est tueri, eam verò quæ præter naturam est immutare, quemadmodum lib. i. de Tuenda sanit. cap. i. etiam testatur idem Galenus ita scribens: Quum vna sit ars quæ circa hominis corpus versatur, eius primæ ac maxime partes sunt duæ: quarum alteram sanitatis tuendæ, alteram morbi profligandi facultatem appelles. Earum contraria inter se officia sunt, siquidem illi tueri, huic immutare constitutionem corporis est propositum. Hæc ille. Porro quum alibi demonstratū sit à Galeno primarias actiones à similaribus partibus perfici, ab instrumentariis verò secundarias, considerandum erit medico quā utilitatē aut noxam humores in iisdē partibus contenti afferant. Si enim copiosiores iusto, aut prauifuerint, earundē partiū actionibus noxā afferēt. Sin boni & mediocres, utilitatē: ex ijs namq; alētur. Fiūt aut iusto copiosiores humores bifariā, vel enim ita augētur, ut vires partiū grauēt, & tunc plestitudo ad vires dicetur: vel tāta eorum est multitudo, ut sua copia vasa in quibus

conti.

*Humores
bifariā
augentur
plestitudo
ad vires
dicetur
vel tāta
eorum
est multitudo*

continentur distendant, atq; tū plenitudo
ad vasa nominatur, vel ex infusione, vt
capite præcedente est dictum, & copio-
sissimè in libro de Plenitudine à Gale-
no monstratum. Vtraq; autem plenu-
do vacuationem requirit, siue sanis, siue
ægotantibus accidat. Sanis autem pos-
se accidere plenitudinem ad vires, ele-
ganti & perspicua similitudine Galenus
ostendit. Quemadmodum enim, inquit,
is qui graue aliquod onus gestat non
protinus simulatq; grauatur ac nonni-
hil sub eo fatigatur cõcidit, & planè ab
eo vincitur: sic fieri potest vt virtus ho-
minis quidè à plenitudine grauetur eo
nondum ægotante. Vtcunq; enim is se
grauem, pigrum, segnem & ægrè mobi-
lem esse dicat & sentiat, tamen quum cõ-
suetam etiamnum munia obeat, sanus ad-
huc sit oportet. Quippe sanitatè, vt li 1.
de Tuenda sanitate, capite 4. testis est
Galenus, eam corporis constitutionem
appellamus, in qua in vitæ actiõibus nõ
impedimur. Pari ratione euenit vt inter-
dum altera plenitudo quæ ad vasa dici-
tur sanum corripit, cuius signum est si
ab exercitijs tendi videtur, & vt Eras-
-

*Sani pleni-
tudine ad
vires inter-
dum inci-
dunt.*

*Sanitas
quid.*

stratus dixit, brachia implentur. Distentio enim, ut in lib. de plenitudine ait Galenus, eius quæ ad vasa nominatur effectus existit. Et quod aliud est bonus athletarum habitus, cuius sectio prima Aph. 3.

Bonus athletarum habitus.

meminit Hippocrates, nisi plenitudo ad vasa, quæ etiam κατὰ τὸ ἔγχυμα, ob causam hanc à Galeno expositam, appellatur?

Vlceris sensus.

Accidere autem sanis adhuc hominibus plenitudinem ad vasa, ex vlceris sensu, qui nonnunquam illis per notiones accidit, fit manifestum. Neque enim is affectus est nisi vitiosi humoris soboles, ut lib. 3. de Tuenda sanitate, capite 4. Galenus in eum scribens modum attestatur: Vlcerosus affectus ab excrementorum copia tennium simul & acrium oritur; quæ nimirum inter exercitandum proveniunt duplici de causa: aut eo excremento quod crassius erat fuso & attenuato, non tamen toto expulso, aut adipe molliuere carne liquata. Necesse enim est à tali humore ceu tenui & acri, pungi & quasi vulnerari tum cutem, tum ipsam carnem. Hæc ille. Cæterum affectus prædicti non tantum in vniuerso corpore, sed etiam in partibus quibusdam corporis

corporis interdum consistunt. Quippe nonnunquā solū caput grauatur, aut vlceris sensum habet. Interdum muscu- *Musculi*
li temporales nominati tātū tendi vi- *temporales*
dentur, qui duo quidem sunt, vtrinque
enim vnus, qui à verticis, & temporis, &
frōtis, & cuneiformij ossibus, & eo osse
quod minorem sedis oculi angulū am-
plectitur, amplo latoq; principio enasci-
tur, ac maxillæ inferioris acuto proce-
ssu inferitur. De quibus Galenus lib. 4.
Anat. adm. & lib. 11. de Vsu partium mul-
ta. Tenduntur autem interdum prædi-
cti muscoli simpliciter, hoc est citra in-
temperiem aliquā, nonnunquam verò
cum plurimo calore. Sic euenit vt gra-
uitatē aliquando in ore ventriculi, aut
inorsum, aut nauseam, aut ciborum fa-
tidium, aut absurdā appetentiam sen-
tiamus, quæ quidem omnia plenitudi-
nis alicuius signa existunt. Ad hæc in
parte aliqua corporis dolores figuntur, *Doloris!*
aut propter humorū cōfertim ingruen- *causa na-*
tiam copiam, aut flatuosum ob spiritū. *ria.*
Acres præterea humores partem aliquā
corporis erodentes, & exedentes exci-
tantur. Deniq; dolor aliquando ab in-

*Omnes do-
loris cause
duæ.*

temperie, vel nuda, hoc est citra humo-
res, vel cum humoribus nascitur. Quas
quidem omnes causas doloris Galenus
lib. 12. Ther. metho. capite 7. in duas con-
trahit, nempe continuitatis diuisionē,
& alterationem. Humorū enim copia
confertim ingruentium, flatuosi spiri-
tus, & acres humores vnitatem soluunt,
ideoq; dolorem excitant. Intemperies
autē alterando dolores mouent. Quod
etiam Hippocratem fecisse constat, qui,
vt attestatur cāpite 4. de Inæquali intem-
perie, & lib. 1. de Sympt. causis, capite 5.
Galenus ita scriptum reliquit: Dum al-
tera scit ac corrumpitur natura, dolores
fiunt. Alteratur verò & corrumpitur cu-
iusque natura, quum vel calefit, vel fri-
gefit, vel siccatur, vel humefit, vel eius
vnitas soluitur. Quòd autem alteratio-
nem ipsam dolorem excitantē tum con-
fertim factam, tum verò violentam esse
oporteat, Galenus locis iam citatis co-
piosè monstrat. Porro vt tandem qui
sint affectus vacuatione indigentes, Ga-
lenus disertè significaret, subiunxit in-
quies: In omnibus iam dictis affectibus
vacuatione humorū & vaporū opus est,
quòd

quòd ipsa hominem à malis & doloribus liberet. Quum autem variæ sint vacationis species, non semper opus est venæ sectione, sed sufficit interdum purgatio, ut ibi acres fuerint humores, interdum etiã frictio, balneum, & inunctionio discutiētis alicuius medicamēti, vel uti si propter flatum excitentur dolores, hæc enim tria flatum & vapores euocare possunt. Reliquum nunc est, ut deinceps qui sint affectus quos sanguinis missio iuuat dicamus.

CAPVT V.

Non solum partes animantis ex sanguine aluntur, sed & natiuus calor mansionē ex sanguine obtinet, per inde atq; ignis qui in foco est ex lignis ad ardendum idoneis, à quo totas ædes calefactas conspiciamus. Quemadmodū igitur ignis ille offenditur, interim quidē cōfertim ei iniectis lignis, interim uerò tametsi nō multis, tamē admodū humidis, nōnunquā autē omninō nō impositis, aut prorsus exiguis: sic calor, qui in corde existit. uel propter sanguinis

copiā, uel propter multam indigentiam, uel ob qualitatem frigidam seipso minor efficitur. Interim uerò maior, aut propter calidam sanguinis qualitatem, aut ob exiguum defectum. Quicquid autem cor per caliditatem uel frigiditatem patiatur, huius etiam confestim aliæ corporis partes participes fiunt.

COMMENTARIUS.

ALTERVM quod initio huius libelli ijs qui sanguinis missione uti rectè uolent considerandum proposuit Galenus explanaturus, nempe qui affectus sint quos sanguinis missio iuuat, quædam ad eam rem melius intelligendam necessaria præmittit, nempe quòd partes corporis omnes ex sanguine nutriantur, & quòd suam mansionem natiuus

Oēs partes corporis ex sanguine aluntur. calor ex sanguine habeat. Si enim omnes corporis partes, ueluti humore sibi familiarissimo, ex sanguine aluntur, non erit certè detrahendus temerè, ne scilicet suo alimento partes illæ destituantur, corporisq; robur deiciatur. Quòd si etiā calor natiuus mansionem suā ex sanguine obtinet, cauendum unicè erit ne
intemp

intempestiua sanguinis missione nati-
uum corporis calorē imminuamus, aut
prorsus extinguamus. Aut contrā per- *Calor na-*
mittamus, vt eiusdem copia suffocetur. *tivus ex*

Quare si calor natiuus ex sanguine p- *sanguine*
inde atq; ignis in foco ex lignis foue- *fouetur.*

tur, fit vt iisdē rationibus augeatur mi-
nuaturq;. Quemadmodū enim ignis à
quo tota domus incalescit, lignis ei con-
fertim iniectis suffocatur, aut prorsus
extinguitur: ita quoq; calor qui in cor-
de existit à copia sanguinis. Quando e-
nim venæ immodico sanguine turge-
scunt, calor natiuus, quod scilicet per-
spiratu ad refrigerationem destituatur,
attestante in sine libelli de Bono corpo-
ris habitu, & de Vsu respirationis Gale-
no, extinguitur. Et sicuti ignis à lignis
humidis, etiam si multa non sunt, detri-
mentum aliquod accipit: ita quoq; ca-
lor natiuus à frigida aliqua qualitate
offenditur, minorq; fit. Minorem au-
tem illum efficiunt frigida, vbi exigua
quātitate assumpta fuerint, aut si minus
sint valida. Hinc est quod Galen. li. 3.
de Simpl. med. fac. cap. 18. ita scriptū reli-
querit: Quęcunq; frigiditate occidunt,

ea exigua quātitate sumpta mortē haud
 afferunt, nō magis q̄ si copiosæ flammæ
 pauxillum aquę instilles, aut lignū inij-
 cias humidū ac viride. Sin copiosa fue-
 rit qualitas frigida, tum calorē, perinde
 atq; ligna viridia & humida si multa cō-
 fertim inijciātur, ignem, celerrimē ex-
 tinguet. Deniq; vt ignis nō impositis il-
 li lignis, aut valde exiguis offenditur:
 sic etiā calor natiuus ob sanguinis mul-
 tam indigentia deficit. Materiā itaque
 vnde accenditur calor natiuus sangui-
 nem, vt in lib. de Vsu Respir. ait Gale-
 nus, obtinet. Cæterū calor cordis bifa-
 riam intenditur augeturūe, propter sci-
 licet calidam sanguinis qualitatem, &
 ob exiguū eiusdem defectū, Per ἔνδεια
 ὀλίγη autem, hoc est defectū exiguum,
 intelligit cōmoderatā sanguinis quan-
 titatē: id quod ex contrarijs paulò antè
 memoratis euentissimū fit. Quippe
 minorē effici calorem cordis ab immo-
 dico sanguine, & immodica eiusdē indi-
 gentia dixit: igitur quod in medio est
 vtriusq; illū fouet & conseruat. In me-
 dio verò vtriusq; est exigua indigentia,
 hoc est ea quę nō est immodica, sed cō-
 modera

*Calor cor-
 dis bifariā
 intenditur,
 ἔνδεια ὀλί-
 γη.*

moderata, tanta nimirum ut cōmoderate
 cordis calorē tueri & conseruare
 possit. Quod adstruimus exemplo
 ignis & flammæ. Galenus quoq; in lib.
 de Vsu Respirat. in hunc modum scri-
 bens, confirmat: commodratio, inquit,
 omnium, conseruatix est flammarum.

Eodem modo igitur non dissimile
 vero est cōtingere, & circa insitum ani-
 mantibus calorem, utpote qui materiam
 vnde accēditur sanguinē habet. Quo
 quidē in loco multa ad institutū facien-
 tia reperient studiosi, & lib. 3. de Téper.
 cap. 5. vbi animantia bifariam calidiora
 fieri, aut qualitate caloris intensa, aut
 substātia eius aucta, copiosè monstrat.

Ex ijs igitur perspicuū est calorē cor-
 dis, perinde atq; flammā, ab eadē mate-
 ria nō augeri modò, verum etiā aliquā-
 do, extingui, ut fufius capite 2. libri de
 Morb. causis Galenus mōstrauit, ad quē
 locum lectorem ablegamus. Porro q̃c-
 quid cor per caliditatē, vel frigiditatē
 patitur, huius etiam cōfestim aliæ par-
 tes corporis participes fiunt. Nam
 tum veluti ex quodam fonte in vni-
 uersum corpus calor & frigus deriua-

*Calor cor
 dis ab ea-
 de augetur
 & extin-
 guitur.*

tur. Hinc est quòd' in febribus calor in corde præter naturam accensus per arterias, tanquàm canales quosdā, in vniuersum corpus distribuatur. Et Galenus li b. 3. de Simplic. med. facul. cap. 17. de leteria quæ frigiditate interimūt nō posse interficere tradit, nisi prius cor refrigeret. Quòd si igitur vniuersum corpus calefeit, aut refrigeratur, id non fit nisi cordis & arteriarum ministerio calorem & frigus huc deriuantium.

Fit autem & una aliqua in parte nonnunquam præter naturam tum caliditas, tum frigiditas, quemadmodū sæpius à nobis in alijs cōmentarijs est demonstratum. Harum uerò generatio bifariā accidit, interim propter humores calidos, aut frigidos, interim etiā ob solam intemperie. Ceterum particulares caliditates & frigiditates, quæcunque parti malè affectæ uicina sunt simul alterant, in totū uerò corpus, priusquam cor alteret, haud extēduntur. Eundē in modū & corpus cordis duplici ratiōe alterari ostēsum est, uel per intēperie, uel ob

calidos aut frigidos humores, uel propter alicuius horum indigentiam.

COMMENTARIUS.

Qvv m antea totius corporis caloris & frigoris causas exposuisset, nunc eius qui in vna aliqua parte corporis excitatur causas commemorat. Non solum verò in vniuerso corpore, verum etiam in vna aliqua eiusdem parte fieri posse caloré & frigus in alijs libris demonstrauit Galenus. Hinc initio libri de Inæquali intemperie ita scribit: Inæqualis intemperies aliàs in toto animantis corpore fit, incidit autem & in vnaqualibet parte. Incalescunt autē & refrigerantur partes corporis bifariam, nempe vel propter humores qui præternaturā ad ipsas fluūt, & in ijs tumorem excitant, quemadmodū euenit quoties vel phlegmone, vel cedemate, vel erysipelate, vel cancro aliòve tumore præternaturam afficiuntur. Incalescunt & refrigerantur interim quoq; præter solā intemperiem, hoc est ob nudas qualitates absque vllius humoris affluxu, vt loco iam citato, & capitulo 4. libri de Dif-

Partes corporis bifariam incalescunt & refrigerantur.

fer, morborum latius docet Galenus. Porro intemperies calidæ & frigidæ in vna aliqua parte ortæ, eas quæ laborant vicinæ sunt partes vnâ alterant, quod illis scilicet suum calorem aut frigus propter vicinitatem communicet. Fieri autem non potest vt in vniuersum corpus extendatur calor & frigus, nisi antea cor incalascit & frige fiat, adeoq; alteratum fuerit. Alteratur verò cordis

Cordis cor corpus duplici modo per simplicem *nipus dupli-* mirum intemperiem, siue inæqualis, *ci modo al* ue æqualis ea fuerit, & per humores *teratur.* calidos aut frigidòs tumorem aliquem in eo excitantes, aut alicuius horum indigentiam. Sic in magna inedia, natium cordis temperamētum solui contingit. Quid verò alterationes cordis sequatur, Galen lib. 5. de male affe. locis, cap. 1. copiosè demonstrat.

Porro humores calidos frigidòsq; fieri demonstratum est propter eorum quæ comeduntur & bibuntur quātitatē, et ob plurimam animi corporisq; tum motionem, tum quietem. Quemadmodum autem in uētriculo præuæ concoctiones

Etiones frequenter eueniunt, ijs quæ as=
 sumpta sunt magis pituitosis aut bilio=
 sis effectis, aliamuē quandam præter na=
 turam corruptionem perpeſſis, aut cru=
 dis, & alterationis expertis plurimo
 tempore manentibus, & in flatū uerſis:
 ita etiā ubi sanguinis procreatione de=
 fraudamur, humorū in arterijs uenisq;
 affectus proportionē ijs quæ à frustra=
 ta in uētriculo cōcoctione fiunt, reſpō=
 debunt. Quoniā uerò calida & humi=
 da omnia facillimè putrefcere apparēt,
potiſſimū quādo in calidis contineā=
 tur locis, neceſſe erit alimentum quod
 ex uentriculo distribuitur, ubi à natura
 non uincitur, inq; sanguinem bonum
 haud mutatur, aliàs aliam perpeti pu=
 tredinē. Atqui quū quæ ex calida mate=
 ria putrefcunt calidiora fieri cōtingat,
 calidior proinde erit sanguis putreſcēs
 Hoc uerò calidior fētō, calidiore quoq;
 ſenſibiliter erit pars in qua putreſcit.
Quoniā uerò à ſenſibiliter calidis quæ
uicina ſunt unā incaleſcunt, ſic utique
 affectis

affectis partibus quæ circunquaq; sunt
 omnia unà incalescent, idq; mordaci &
 acri calore. Eiusmodi enim est qui à
 putredine proficiscitur. Si igitur pars
 quæ ita incaluit effatu digna fuerit, ca-
 loremq; suū ad cor usq; protendere ua-
 luerit, idq; uel quòd uicina sit, uel quòd
 princeps, uel quòd calida, unà quoque
 ipsum accendet, ut pote natura calidissi-
 mum. Quòd si uerò semel illud accen-
 sum fuerit, promptè iam totum ipsius
 corpus simul incalescet, perinde atq; à
 foco aliquo ingentem flammam habena-
 te quæ illum continet domus. Vocant
 autem id malum corporis febrem. Ve-
 rum interdum priusquam sanguinis
 multitudo putrescere incipiat, in par-
 tem aliquam confertim decumbens, aut
 prorsus eam extinxit, ut actio abolere-
 tur, aut non contemnendam noxam ac-
 ciperet. Siquidem ad hūc modum apo-
 plexiæ fiunt, multo nimirum sanguine
 in principium animantis confertim ir-
 ruente. Proinde ubi in aliam partem cum
 impe

impetu ruit, tumorem in ea præter naturã efficit. Ex hoc genere est phlegmone. Vbi uerò crassior magisq; melancholicus fuerit sanguis eò decumbens, durus fit tumor: sicuti ubi pituitosior fuerit fluxio, laxus. Biliosa uerò existente fluxione, erysipelas efficitur. Sed hæc omnia exquisitè discriminata habes in ijs quæ modò diximus operibus.

COMMENTARIUS.

NUNC Galenus ea quæ paulò antè dixit magis illustrare pergit. Nam quū partes corporis bifariã incalescere aut refrigerari, nempe vel propter humores, vel nudas qualitates dixisset, nunc ob quam causam humores atque inter eos sanguis potissimū, calidiores iusto aut frigidiores fiant, exponit. Quippe *Humores pro ciborū* pro ciborū potuūq; modo humores calidi aut frigidi sūt. Hinc capite primo *potionūq; modo calidi aut frigidi sunt.* libri de Morborū causis ita scriptū reliquit: Inter illa quæ immodicū calorem inducere possunt, quintū obtinent locum ciborum qualitates acres & calidæ, cuiusmodi sunt alliorum, porri, ceparum, & id genus aliorum. Nam qui

qui ijs immodicè vtūtur, febre nonnū-
 quam laborant. Eiusdem generis sunt
 potiones calidæ, vt vinum vetus & acre;
 si imbecillo corpori largius ingeratur.
 Quod autē cibi frigidos humores ef-
 ficiant, capite secundo iam citati libri
 in eum scribēs modū ostendit: Optimi
fucci cibus, & qui plurimū alimēti præ-
bere potest, si animāti immoderatus in-
geratur, frigidos morbos excitabit. Præ-
 terea tū cibi, tū potiones suapte natura
 frigidiores, ipsi quoq; inter frigidorū
 morborū causas numerātur, cuiusmodi
 sunt Papauer, mādragora, hyosciamū;
 cicutā. Motū verò corporis calefacere,
 quietē verò refrigerare humores, notū
 est quān vt lōgius à nobis dici debeat,
 præsertim quum Galenus locis nūc in-
 dicatis id ipsum etiā abundè docuerit.
 Quid verò animi motus pariāt, idē Ga-
 lenus cap. vltimo libri secūdi de Sympt.
 causis copiosè docet, vt nihil attineat
 hīc inserere. Porro quòd cōcoctio quæ
 in venis fit, pportione quadā illi quæ in
 ventriculo perficitur respōdeat, nō hoc
 solū in loco, verum etiā alijs, cap. nīmī
 rum vltimo lib. 4. de Tuēda Sa. & cap. 1.
 libri

*Motus &
 quietis effe-
 ctus.*

*Animi
 motus.*

lib. 3. de Sympt. caus. mōstrat. *Quadrifariam aut prauas fieri in vētriculo cō-* *Quadrif-*
coctiones hoc loco docet. Primū vbi riam pra-
 illa quæ assumpta sunt pituitosiora & uā in uen-
 biliosiora reddūtur: id quod ex nidore *triculo cō-*
 quē referunt cognoscitur, quēadmodū *coctiones*
 Galenus cap. 1. lib. de Sympt. caus. tertij *fiunt.*
 in eum scribens modū ostēdit: Ac cor-
ruptela, inqt, si nidorē refert, à calidis
biliosisquē cibis accidit. Sin acida fue-
rit, à frigidis natura & pituitosis. Se-
 cundò deprauatur cōcoctio ppter cor-
 ruptionē quam cibi assumpti patiūtur.
 Hoc aut accidit, Galeno ibidē teste, vbi
 vitiosa ciborum qualitas infestat, aut
 excrementa in ventriculo redundant.
 Idem etiam efficere possunt ordo præ-
 posterus, & cibus intempestiuē exhi-
 bitus, vt videre licebit loco nunc cita-
 to. Tertiò praua fit coctio propter
 cruditatem. Cruditas autem propriè
 est quando nulla prorsus fit alteratio *Cruditās*
 cibi, *quid.* Quanquā æquiucōcē sic etiam, eo-
 dem Galeno cap. 3. lib. de Sympt. differ.,
 authore, vocetur in alienam qualitatem
 alteratio. Quartò deprauatam fie-
 ri concoctionem contingit, vbi in fla-
 tum

tum cibi conuertitur. Id quod sanè accidit, vt attestatur cap. 7. libri tertij de Caus. sympt. Galenus, vbi humores pituitosi in ventriculo continentur, vel cibi ab imbecilli calore in vapores soluntur. Cæterùm quales affectus sint

Alimenti qui frustratâ in venis sanguinis procrea-
à natura nō tionem sequuntur, Galenus cap. primo
superati ex iam citati libri copiosè admodum mō-
uentriculo strat. Postquam obiter causas deprava-
distributio uatæ cōcoctionis Galenus perstrinxit,
nem putre- nunc quòd alimenti à natura haud su-
do sequitur. perati ex ventriculo distributionem

sequatur putredo ostendit, dicens: Si omnia quæ natura calida & humida sunt, potissimum si in calido & humido loco maneant, & vt ait lib. 11. Therap. Inetho. capite 4. vbi ex professo de putredine agit, neque perflata, neque ventilata sint, promptè putrescūt, quid mirum si alimentum natura calidum & humidum à natura non victum, neq; in sanguinem bonum mutatum, loco corporis calido contentum putrescat? Sed quum ea quæ ex calida materia putrescunt fiant calidiora, vt sanguis putrescens etiam calidior fiat necesse est.

Hinc

Hinc est quòd Galenus capite 1. libri de
Causis morborum dicat: Ex putredine
calefiunt tum corpora reliqua omnia,
tum maximè semina, aut stercora. Por-
ro sanguine calidiorè reddito, calidio
rem quoq; sensibiliter fieri partē in qua
putrescit oportet. Sensibiliter calidis,
quæ vicina sunt vnà incalescunt, sensi-
biliter autem calidis, quæ vicina sunt
vnà etiam incalescunt. Quod Galenus
loco iam citato ijs verbis confirmat:
Quod verò, inquit, ob calidiorū vicini-
tatem proxima quæque corpora cale-
scant, satis patere puto ijs, qui balnea-
rum, solis æstiuī, & flammæ cuiuslibet
vim fuerint experti. Hæc ille, Parte ita-
que corporis in qua sanguis putrescit ca-
lidiorè facta, necesse est vicinas quoque
calidiores fieri. Et si pars quæ incaluit
effatu digna fuerit, calorēq; suū ad cor
diffundere, vel quòd illi vicina sit, vel
quòd principatum in corpore gerit, vel
quod natura calida sit, poterit vnà quo-
que cor ipsum, quod natura calidissi-
mum est, vtpote innati caloris fons, vt
ait lib. 5. de Male affe. loc. cap. 1. Galen.
accendet. Eo autē accenso, facile vni-

uersum corpus simul incalescet, haud
secus atq; domus tota à foco ignem ha-
bente immensum. Vbi verò vniuersum
corpus incalescit, malum ipsum Febris
Febris nominatur. Quod Galenus præcitato
quid. loco fusius in hunc modum scribēs de-
 clarat: Si ab exercitatione, ait, quispiam
 fuerit fatigatus, is immodicū sustinere
 calorem dicetur, maiorem inquā quā
 pro naturali habitu, tum in musculis,
 tum in articulis: quippe ad hos in pri-
 mis mouendi munus pertinet. Quòd si
 si calor nō vltrā progrediatur, sed prius
 quam per totū animantis corpus fuerit
 sparsus, soluatur, affectus ita genitus las-
 situdo duntaxat fuerit. Si verò in totū
 extendatur corpus, morbus ipse Febris
 nominari debet. Cæterum nō rarò con-
 tingit vt sanguinis multitudo antequā
 putrescat in vnam aliquā corporis par-
 tem confertim decumbat, & tunc eius-
 dem actionē prorsus aboleat, aut saltē
 noxam haud cōtemnendā inferat. Sic sa-
 nē vbi in cerebrum cōfertim irruit, apo-
 plexiam facit, corporisq; motum & sen-
 sum tollit. Si verò in aliā partē corporis
 sanguis decumbit, phlegmonem efficit.

Qui

Qui si crassus & melancholicus fuerit, scirrhus & durum tumorem cancerumq; *Scirrhus*. pcreat. Sin pituitosior, œdema. Quod *Cancer*. si fluxio fuerit biliosa, erysipelas, quem *Oedema*, admodum cap. ult. libri de Morb. differ. & *Erysipe* - in eo libro quem de Tumoribus præter *lar*. naturam inscripsit, & multis alijs suorum monumentorum locis Galenus fufius docet.

Verum nunc ut dixi, ea quæ demonstrata sunt hypothesium loco in hoc libro assumens, congruenter illis sermonem de sanguinis missione demonstro. Quum itaq; plenitudo sit duplex: optimum enim est ab ea auspicari: & ea quæ vires prægrauat, in putredinem præpente incidat, & nonnunquam etiam in partes quasdam impetu aliquo decumbat, inibiq; tumores præter naturam efficiat: altera uero quæ ad uasa nominatur sæpe in partes ingruat, ac tumores excitet, inò & apoplexias, uenarumq; ruptiones moliatur, eam proctinus uacuare tentandum est, priusquam magnū aliquod malum in homine creet. Atqui

plenissimè quo pacto, utraq; mala et dignoscere, & sanare oporteat, in tractatione de Tuëda sanitate dictū est. Sicuti ubi uel febris, uel sanguinis reiectio propter plenitudinem, uel apoplecticorū morborum aliquis inuasit, quomodo & illis mederi conueniat, in Medendi ratione ostensum est: ideoq; hoc scriptum superuacaneum esse censeo. Nā si perinde atq; in illis libris scripsi, & hīc scribam, bis eadem de re differere cogar, & propterea sermonem admodum prolongare. Si uerò in compendium librum hunc contraham, duorum alterum accidere periculum erit, ut uel obscurius aliquid, ob breuitatem, dicam, uel distinctionem aliquam utilem præteream. Sed cū non meo consilio hunc librū aggressus sim, si quod iam dictorum in eo delictum occurrat, illi culpam ferent, qui ut onus hoc susceperem authores fuerunt: sicuti si rectè eueniat, utilisq; appareat, laudem illis omnem concedo.

COMMENTARIUS.

FINITA tandem commemoratione *In utraq;*
 eorum quæ alibi à Galeno sunt demō. *plenitudi-*
 strata, hæc ipsa hypothesium loco hoc *ne celeri-*
 in libro vsurpaturus, sermonem de san. *ter uacuan-*
 guinis missiōe auspicatur, initioq; quod *dum.*
 in vtraque plenitudine celeriter sit va-
 cuandum docet, eiusq; rei causas affert.
 Siquidem vbi, ea quæ ad vires refertur
 plenitudo fuerit, in putredinem facilè
 incidit, aut cum impetu in partes cor-
 poris irruit, & in ijs tumorem præter na-
 turam excitat. Quare in tempore & cō-
 festim priusquàm tale aliquid eueniat,
 quod redundat vacuandū erit. Sic quo-
 que si ea quæ ad vasa dicitur plenitudo
 aderit, antequam in partes corporis de-
 cumbat, ac in ijs tumores præter natu-
 ram excitet. imò antequàm sua copia
 subitò suffocet, venarumquæ ruptiones
 afferat, eam confestim vacuare oportet.
 Id quod Athletarum exemplo Hippo-
 crates etiam nos monere voluit, ita scri-
 bens: Athletarum summè firmæ corpo-
 ris constitutiones periculosæ, si ad ex-
 tremum progressæ fuerint: neq; enim
 eodem in statu consistere possunt, neq;

*Apople-
ctici mor-
bi.*

interquiescere. Quum verò non quiescūt, iam in melius proficere haud possunt. Restat igitur vt in deterius vergāt. His itaq; de causis firmam constitutionem sine mora soluere expedit, vt rursus corpus refici incipiat. Hæc ille. Vt ex ijs quę diximus perspicuū sit in vtraque plenitudine per sanguinis missionem esse vacuandum. Cæterum quomodo vtrunque malum sit dignoscendum & sanandum, libro tertio & quarto de Tuenda Sanitate est dictum. Item, quæ ratione febris, aut sanguinis ex rupta vena reiectioni, alijsq; morbis suffocatione afferentibus: quos Apoplecticos hoc loco vocat, sit medendum, in libris de curandi ratione inscriptis est ostensum. Quum itaque alibi hæc omnia copiosè sint exposita, ideò hoc scriptū superuacaneū censet, deq; prolixiore de ijs tractatione se excusat, ne scilicet illi bis de vna & eadem re sit differendum. Sed dicet aliquis, non quidem opus esse vt singula referat hoc in loco, sed sufficere si ea quæ copiosius alibi tractauit in compendium contrahat. Cui quidem ita respondet, futurum sanè si hoc conetur, vt
vel

vel aliquid propter breuitatem obscu- *Breuitas*
 rius dicat: vix enim breuitas obscurita- *vix obscu-*
 te vacare potest: vel distinctionem ali- *ritate ca-*
 quam vtilem ad præsentem tractationē *ret.*
 omittat. Neque enim is qui breuitatis
 passim studiosus est, distinctè de singu-
 lis differet. Tandem tamen omnem cul-
 pam in eos transfert qui vt hunc libellū
 conscriberet crebris suis efflagitationi-
 bus eum impulerunt.

CAPVT

VI.

Hoc igitur deinceps orationis
 sit exordium. Quibus utiq; dum
 consueta adhuc obcunt munia, aut pars
 aliqua princeps, aut uniuersum corpus
 grauatur uel tenditur, ijs quidē necessa-
 ria est uacuatio. Si uerò ætate nec pue-
 ri adhuc fuerint, nec senes, de sangui-
 nis missione consilium inito, primos ho-
 sce maximè scopos intuens, nempe ple-
 nitudinis tum quantitatem tum qualita-
 tem. & uirium robur aut imbecillitatē,
 deinde naturalem uniuersi corporis ha-
 bitum, tempusq; & regionē, uictumq;

præcedentem, num scilicet qui sic affectus est plurimis cibis & potionibus, & præsertim multum nutriētibus, usus sit. Ad hæc consueta & inconsueta, quos motus exercuerit, quasq; excretiones habuerit, aut præter consuetudinē retentæ sint, ad omnia uerò hæc num gracilior aut crassior euaserit.

COMMENTARIVS.

ORDITVR tandem sermonem de sanguinis missione Galenus noster, atque quòd ijs qui vtraq; plenitudine, dum consueta adhuc munia obeunt, in principe aliqua parte, vel toto corpore laborant, necessaria sit vacuatio, eaq; per sanguinis missionem, si neq; adhuc qui ita afficiūtur sint pueri, neq; senes: adhibitis tamen primis scopis, vt paulò pòst dicemus, maximè necessarijs, docet. Porro plenitudinem ad vires ijs verbis innuit, si princeps pars aliqua vel totum corpus grauatur: quippe grauitas eius plenitudinis est certissima nota. Plenitudinem verò ad vasa significauit, ijs verbis, vel tēditur: tensio enim ipsissimum est huius plenitudinis signum, vt in

vt in libello de Plenitudine Galenus
 copiosius monstrat. Tenduntur enim
 ex hac solidæ animalis partes, præcipuè *Vacuadū*
 in quibus humores continentur. Non *in plenitu*
 autem temerè adiectum in cōtextu est, *dine dū cō*
 dum consueta adhuc munia faciūt: neq; *sueta ad-*
 enim expectandum est dum functiōes *huc munia*
 lædātur, quod scilicet plenitudines ma *facimus.*
 xima malæ & pericula comitētur, vt præ *Primi sco*
 cedenti capite est expositum. Quare ce *pi sangui*
 leriter, antequam nimirū illæ noxæ in- *nir in mis-*
 gruunt, vacuandum erit. Captare itaq; *sione expē*
 hoc in loco occasionem ipsam oportet. *dēdi decē.*
 Cæterum primi scopi in sanguinis mis. *Plenitudi*
 sione expendendi decem numero exi- *nir quanti*
 stunt. Horum equidem primus est ple- *tas & qua*
 nitudinis tum quantitas, tum qualitas. *litas.*
 Quantitas, num scilicet plurimum qua-
 tuor humores supra naturalem suā pro-
 portionem adaucti sint. Qualitas etiā,
 hoc est species seu forma plenitudinis
 consideranda erit, num scilicet sangui-
 nea, biliosa, pituitosa, aut melācholica
 sit. Ideoq; hoc in loco, vt multis etiam
 alijs, qualitas idem quod *idē* signifi-
 cat. Vt autem illæ plenitudinis species
 sint distinguendæ paulo post docebit

Galenus. Alter scopus in vena secanda
necessarius, est virium robur & infirmi-

*Virium ro-
bur & in-
firmitas.*

tas, Nam non solum in sanguinis mis-
sione, verum etiam omni alia vacuatio-
ne, Galeno lib. 1. Aph. com. 3. teste, vires
ægroti attendere oportet, ac donec to-
lerat, & nondum laborat, tentandū est
exuperantem humorē educere. Quum
verò dissoluuntur, etiam si restant super-
uacua, cauere eorundē vacuationem cō-
uenit. Virium enim imbecillitas adie-
ctionem potius quā detractionem re-

*Naturalis
uniuersi
corporis
habitus.*

quirit. Tertius scopus est naturalis vni-
uersi corporis habitus. hoc est confide-
randum in sanguinis missione num ho-
mo molli ac tenera, aut densa & solida
carne sit. Habitus eñ, vt testis est lib. 4.
Vid. acu. com. 22. Galenus, ad corporis
consistentiā refertur, quum hic quidem
mollis sit, ille verò durus. Quippe qui
densa solidaq; sunt carne, eodem Gale-
no lib. 1. ad Glauconem authore, largā
vacuationem sustinent. Qui verò mol-
lem, teneram, raram, laxam, prompteq;
diffluentem, quū ex se resolutioni sint
idonei, vacuationem nō ferunt. Quarto

Tempus.

in mittendo sanguine tempus expēden-
dum

dum, num scilicet calidum aut frigidū
 fit. Siquidē Galeno loco iam citato te- *Calido tē-*
 ste, in calido tempore improbē vacuati *porc cur*
 syncope & resolutione intereunt. Ca- *non uacuā*
 lor enim ambientis ē corpore foras euo *dum.*
 catum spiritū digerit, resiccatq; corpo-
 ris habitum, & imbecilliolem reddit.

Quapropter tum omninō à sanguinis
 missione abstinendum erit. In frigido *Frigido tē*
 tempore, corpus refrigeratur, proinde *porc cur*
 sanguinis missionem impedit. Quum *non mittē-*
 enim sit antea refrigeratus corporis ha- *bus san-*
 bitus, rursusq; in febribus per accessio- *guis,*

nis initia refrigeretur, nunquam postea
 pristinae valetudini restituitur, nativo
 scilicet calore à frigoris vi deuicto.
 Nihil itaque attinet corpus antea abun-
 dē satis refrigeratum, sanguinis detra-
 ctione magis refrigerari. Quinto con-
 sideranda in vena secanda regio, num *Regio.*
 calida aut frigida sit, propter easdē cau-
 sas. Temporis nanq; conditio, & regio

eandē habent rationem. Sexto cōtem *Victus*
 plandus in sanguinis detractiōe, victus *præcedens.*
 præcedens, cū videlicet pluribus cibis
 & potionibus, ijsq; multūm nutrienti-
 bus vsus sit, aut contrā. Si enī largo cibo

Consuetudo.

usus est, adeoq; per vitę intēperātiā crudorum humorū copiam congeſsit, huic certē sanguis, vt capite ſeptimo latius docebimus, minimē est mittendus. Sin exiguo cibo contentus fuit, adeoq; vacationem tolerare poteſt, huic intrepidē ſanguinē detrahes. Septimō qui ſanguinem mittere alicui inſtituit, is conſuetudinem conſiderabit. Quippe habet hæc ipſa plurimum momenti, Gale-
no lib. 1. cap. 13. ad Glauconē teſte, tum ad alia omnia, tum maximē ad vacationis indicationem. Alij enim nunquā ſunt vacationem antea experti, neque integram pertulerūt, largoquē cibo uſi ſunt. Quapropter ſanguinis miſſionē, inediaq; citra noxā non ferēt. Quum enim conſuetudo procliuitas quædam ac facilitas ſit eodem modo ſemper agēdi aut patiendi in rebus naturæ tam amicis quā aduerſis uſu comparata, ſi quid ægro inſolitum, iniucundū, quodquē extimeſcat obijciatur, id ſine magno detrimento, ſæpe etiam ſine graui periculo, ſubire haud poterit. In quo genere quum ſit ſanguinis miſſio, hanc vacationem ſine metu ac plerunq; ani-
mi de-

Consuetudo quid.

mi deliquio, si meticulosus sit, & vacuationem nunquã antè expertus, sed liberali cibo semper vsus, non sustinebit. Alij contrà vacuationibus sunt assueti, & parco cibo vtuntur: hos itaq;, modò reliqua consentiant, intrepidè vacuare oportet. Octauò in mittendo sanguine perpendendum quo genere exercitij vsus sit. Qui enim exercitijs, crebrò vtuntur, quum parum hac ratiõe superuacuum congerant in corpore, parcius sunt vacuãdi. Contrà qui hæc ipsa prorsus negligunt, aut rarò saltem ijs vtùtur, largius vacuabimus. Nono cõsiderandum erit num excretiones consuetæ suppressantur necne. Verbi gratia, in viris diligenter inquirendum, num hæmorrhoides solito tẽpore profluant, vt in mulieribus, num istatis tẽporibus menses erumpant, aut prorsus suppressantur. Quibus enim solitæ per has aut alias corporis partes excretiones præter naturam retinentur, hos intrepidè vacuare cõuenit. Sic sanè in anasarca quæ ex suppressis vel mensibus, vel hæmorrhoidibus nata est, venam audacter incidemus. Decimo & vltimo in sanguine

*Exercitia**Excretiones consuetæ.**Habitus corporis.*

nis missione contemplādum num æger obesus aut gracilis sit. Nā graciles propter virium imbecillitatem affatim vacuare nō licet. Obesos verò propter sanguinis inopiam, siquidem angustas venas, Galeno lib. 2. de Temper. capite 5. teste, habent.

Cæterum utriusq; plenitudinis quantitas è propriorum signorum magnitudine definietur. Quantò enim grauior sibi homo uidetur esse, tantum etiam plenitudinem ad vires auctam esse manifestum est. Ad eundem modum quantum tensionis sensus augetur, tantum etiam altera plenitudo, quam à nonnullis ὁ ἐγχυμα uocari dixi, aucta erit. Verum utriusq; plenitudinis qualitatem partim è colore dignosces, memor colorem humorum esse, si quidem uniuersum corpus in calore & frigore externo mediocriter se habeat, partim ex ijs quæ humorum naturæ insunt. Frigidiores nanq; frigidior totius corporis sensus sequitur, calidiores autem calidior:
 & eos

Et eos quidem qui in uenis coaceruantur humores, tumor & tensio uasorū: qui uerò in carne sunt, eos sensus aut grauitatis, aut tensionis, sicuti etiam caloris in illa comitatur. Porro gubernantium nos facultatum imbecillitatem & robur proprijs iudicari functionibus monstratum est, uoluntarijs quidem ea quæ in neruis, & horum principio cerebro est facultas: ijs uerò quæ per pulsus fiunt, ea quæ in arterijs & corde. Verum per bonā, & prorsus abolitam nutritionem, tum colorem bonū & uitiōsum, tertia facultas, nutrix nimirum, quam ex iecore proficisci demonstrauī, dignotionem sortita est.

COMMENTARIUS.

QVVM paulò antè primum secundæ venæ scopum esse dixisset plenitudinis tum quantitatem tum qualitatē, nunc quibus signis utraq; sit cognoscenda docet. Quantitas quippe utriusque plenitudinis, eius nimirum quæ ad vires refertur, & eius quæ ad vasa, è pro-

Grauitas priorum signorum magnitudine defini-
signū pleni nitur. Proprium verò signum plenitu-
tudinis ad dinis ad vires est grauitas, quemadmo-
uires. dum in libro de Plenitudine inscripto

Tensio si- Galenus copiosè monstrat: quapropter
gnum ple- quando grauior nunc sibi quàm antea
nitudinis homo esse videtur, tantò etiā auctior eā
ad uasa. quæ ad vires dicitur plenitudo erit. Ple-

Qualitas nitudinis autem ad vasa propriū signū
plenitudi- est tensio, vti ibidem Galenus ostendit,
nir bifa- ideoq; quantū tensionis sensus augetur,
riam co- tantum etiam plenitudo illa crescat ne-
gnoskitur. cesse est Cæterum qualitas vtriusq; ple-

nitudinis bifariam cognoscitur. Primū
 ex colore, is enim humores redundan-
 tes ostendit, quemadmodū Galenus se-
 ctione prima Aphorismorum com. 2. ijs
 verbis disertè monstrat, inquiens: Hu-
 morem redundantem ex colore debe-
 mus coniectari, nisi aliqui fortè in pro-
 fundū recesserint, Color enim similis
 efflorescit humoribus, si non intrò re-
 dierint. Et lib. 4. de Tuenda sanit. cap. 3.
 ait: Iam albiore, pituita superante, pal-
 lidiore bili abundante cernuntur ho-
 mines: quòd si meracior bilis sit, etiam
 planè flauiores. Siquidem color ab hu-

more

more prouenit, non ex solidis animalis partibus, utiq; quum succi se in altū nō receperunt. Hæc ille. Ex colore itaque humores cognoscuntur, modo corpus in calore & frigore externo mediocriter se habeat. Si enim immoderatè à calore & frigore corpus affectū fuerit, nihil certi ex colore iudicari potest. Calor enim aëris ambiētis ad exteriora trahit, frigus contrā ad interiora humores pellit. Atque hinc est quod Galenus in libello de Plenitudine ruborem sanguineæ plenitudinis esse notā tradat, sed distinctione adhibita: Si nanq;, inquit, ab extrinseco aliquo rubor eueniat, verbi gratia sole, vel balneo, vel exercitatiōe, vel itinere, vel ut summam dicā ex calore, pari modo ex ira, pudoreq;ue, atq; alijs similibus, ut ex acuta febre, iam nō sanguinem indicat. Quodd si igitur æqualis totius corporis fuerit affectus, nullum autem eorū quæ percensuimus adsit, tunc utiq; rubor sanguineæ plenitudinis in vniuerso animantis corpore nota fuerit. Sin minus, illius quidē partitis, in qua apparet. Et rursus in fine serè præcitatū libri ait: Proinde neq; ex can-

Color humores ostēdit.

descendentem, vel lotum, vel lauante se, vel exercitatu, vel vino recens impletu, vel alio quouis modo calefactu ad dijudicationem adhibere conuenit, sed eu qui in quiete omniu externarum motionu existit. Porro ea distinctione adhibita, plenitudinis species seu qualitates, quu vniuersum corpus humoribus æqualiter distentum fuerit, Galeno loco iã citato authore, distinguendæ erunt. Rubicunda sanguinis plenitudo est, sub pallida verò flauibilis. Albescit supra naturam, vbi pituita superat, quemadmodu nigrescit, si atra bilis excedit, In singulis autem prædictorum sanguinem simul coactum esse oportet. Animaduendum etiam hoc loco erit Græcum co-

Plenitudinis species ut distinguenda.

Græcus dicem non tantum esse deprauatum, sed *codex emendatus.* & mutilum. Emendandus verò erit huc

in modu: ἐπειδὴ ἀμμιτρίως ἔχει θερμότη] τε καὶ ψυχρότη] τῆς ἐξωθεν ὁλομτὸ σῶμα καὶ, πρόσκειται ἐκ τῶν συνυπαρχόν] ων τῇ χυμοῦ φύσει. Cui quidem lectioni nostra per omnia respōdet conuersio. Et hanc planè esse legitimam antiquus interpres confirmat, qui præsentem locum ita reddidit. Quando moderato se ha-

se habet in caliditate & frigiditate extrinseca totum corpus: & adhuc ex ijs quæ existunt humoris naturæ. Secundò qualitas vtriusque plenitudinis cognoscitur ex ijs quæ naturæ humorum insunt. Id autem quomodo sit intelligendum metipse Galenus explicat, in-
4 apb. 39.
 quiens: Humores nanque natura frigidiores, sensus totius corporis frigidior sequitur: calidiores autem calidior. Hinc est quod Hippocrates etiam dixerit: Qua parte corporis calor aut frigus est, ibi morbus. Calidus itaque corporis sensus, calidorum humorum plenitudinis nota est. Frigidus autem contrariorum. Quòd si eorū qui in venis sunt humorum plenitudo fuerit, earundem tumor & tensio comitabuntur, Tumor enim, cum tensione, Galeno in libro de Plenitudine teste maiorem indicat copiam. Sin eorum qui in carne sunt, aut grauitatis, aut tensionis, sicuti etiam caloris in carne sensus sequitur. Grauitatis, in ea quæ ad vires vocatur, tensionis & caloris in altera quæ
Codex
κατὰ τὸ ἔγχυμα nominatur plenitu- *Græcus re*
 dine. Est & hoc loco codex *Græcus* *stitutus.*

*Facultatū
robur &
imbecilli-
tas unde
cognoscen-
da,*

deprauatus, perperam enim legit *διὰ-
θεσις* pro *διὰταξις*. Esse autem scriben-
dum *διὰταξις*, antiquus interpres con-
firmat, qui hoc loco conuertit extensio.
Porro viriū seu facultatum robur & im-
becillitas non aliunde quàm è proprijs
functionibus melius cognoscitur. Ani-
malibus quidem seu volūtarijs ex actio-
nibus ea quæ in cerebro & neruis est fa-
cultas cognoscitur: vitalibus verò è fun-
ctionibus, ea quæ in corde & arterijs est.

Nutrix verò ex bona vel abolita nu-
tritione, item calore bono, vel vitioso.
Quippe eius fons iecur est, cuius robur
color bonns, imbecillitatē verò vitio-
sus sequitur, quemadmodum libro 3. de
Sympto. causis. capite 5. Galenus copio-
se admodum monstrat.

Vbi igitur præsens plenitudi-
nis signis facultates robustæ fuerint,
sanguinē mittes uidelicet in affectu ten-
sionis nulla adhibita distinctione, ma-
gisq; etiā in phlegmonoso. Si uerò de-
grauans plenitudo infestat, non semper
sanguis detrahendus est. Fieri enim po-
test ut crudus per corpus sit coacerua-
tus hu

tus humor. In quo exquisitè attendere oportet quantū ualeat uirtus, & quantum ipsius humoris sit genitū. Quippe prius exoluta ab eiusmodi affectibus uirtus, per sanguinis missionē in extremum malū recidere solet, ut nequaquā ipsa postea reparari queat. Quòd si factum fuerit, periculū haud leue sequitur, præsertim si æstiuā constitutione stomacho malè habēte febris accesserit, aut uniuerso corpore natura molli & temperamento humido existente. Hi enim promptè discutiuntur, celerrimèq; animi deliquium incidunt, etiamsi magna febris haud accedit. Si uerò horum nihil fuerit, cæterū hyems, uel regio natura frigida sit, aut hominis natura frigidior, ijs per sanguinis missionē & totum corpus refrigeratur, & accidunt nonnulla quæ ad uehementē refrigerationē sequuntur symptomata. Qui sic affecti sunt, hos sanguinis missione uacuare non conuenit, sed frictionibus, & mediocriter calefaciētibus unctionibus,

potionibusq; crassitudinem humorum incidentibus, ac mediocriter calefacientibus. Quæ enim ualenter calefaciunt, confertim admodum vires deijciunt, ut curationi haud sufficiant. Sæpe etiam febrem auxerunt, ut ex inde vires noxam contraxerint. Quapropter tum ciborum, tum potionum humorum crassitudinem incidentium calefaciendi facultas mediocris esto.

COMMENTARIUS.

NUNC tandem in qua plenitudine sanguis tutò mitti possit Galenus monstrare incipit. Si igitur, inquit, plenitudinis signa aderint, virtusq; robusta fuerit, & tensionis affectus comparuerit, nulla prorsus distinctione adhibita, sanguis mittendus est: plenitudinem enim ad vasa tensionis affectus denotat, qua vacuatione per sanguinis missionem, ut dictum est à principio huius capituli, curatur. Magis verò sanguis mittendus, ubi phlegmonosus fuerit affectus, ut copiosius lib. 3. de Tuëda sanit. cap. 5. Galenus ostendit. Si uerò plenitudo ad vires vocata

In plenitudine ad vires non semper mittendus sanguis.

cata infestauerit, nō semp sanguis mittendus erit. Fieri enī potest vt crudus humor in vniuerso corpore coaceruatus sit, quòd vbi acciderit, venā incidere haud licet. Quod clarius lib. 4. de Tuēda sanit. cap. 5. Galenus docet, in eū scribens modū: Si in lasso corpore, inquit, sanguis bonus exiguus sit, crudi verò humores plurimi, huic sanguis haud mittendus. Quippe incisa vena bonum sanguinē emittit, malū qui in primis maxime venis circa iecur, & quod mesenterium vocāt colligitur, in vniuersum attrahit corpus. Hæc ille. Crudus autē humor, Galeno ibidē cap. 4. & lib. 1. de Ali-
 men. facul. cap. de tritico teste, proprio dicitur qui frigidus & crassus est. Quapropter crudo humore coaceruato duo præsertim exquisitè cōsideranda erūt, nēpe q̄ robusta sit virtus, & quātum crudi humoris sit genitū. Si enim virtus p̄ eiufmodi affectus prius abūdē exoluta fuerit, à sanguinis detractione prorsus abstinendū erit. Siquidē per hāc ipsam in extremum malū recidet, adeò vt nullo modo subinde reparari queat. Neq; enī parū in sanguinis missiōe dissolui vires,

Crudus humor quid.

Duo in crudo coaceruato humore cōsideranda.

omnibus est manifestū. Quòd si igitur
 medicus parū prudens & peritus tū san-
 guinem miserit, maximū sequi vitæ pe-
 riculum necesse est: præsertim si æstiu-
 fuerit cōstitutio, quæ & ipsa dissoluere
 corporis vires potest, & æger ad synco-
 pen stomachicā habilis admodū sit, fe-
 brisq; accesserit, aut vniuersum corpo-
 ris temperamētū molle & humidū, qua-
 le est puerorum, fuerit. Hinc Galenus
 lib. 9. Ther. metho. cap. vlt. vacuātis præ-
 sidij nō egere pueros tradit, quòd sub-
 stantia eorū, quum facilimè digeratur
 ac dissipetur, habeat ex se ipsa vnde na-
 turaliter vacuetur. Ita hoc etiā loco ean-
 dem ferè cur ijs qui prædictis affectibus
 laborāt nō sit mittendus sanguis, ratio-
 nem subiungit, dicens: Horū enim prò-
 ptè discutitur substātia, celerrimeq; ani-
 mi deliquiū incidūt, etiam si magna fe-
 bris nō accedit. Quòd si verò iā dicto-
 rū nihil ad sit, tēpus tamē in quo ille cui
 sanguis est, detrahendus egrotat hyber-
 num fuerit, aut regio in qua degit frigi-
 da, aut ægrotantis temperamētū: id em̃

Natura hoc loco & multis alijs Galeno libro 3.
quid. de Tempera. capite 4. authore, natu-

ra significat, frigidius, sanguis minimè mittendus erit. Per sanguinis enim missionem vnuerfum corpus refrigeratur, & nonnulla quæ ad vehementem sequuntur refrigerationem, vt sunt caros & comâ seu profundus somnus, accidunt symptomata. Quapropter frictionibus potius tum vtendum erit, & calefacientibus vnctionibus, ex oleo nimirum chamæmelino, & huic similibus confectis, potionibusq; crassos humores incidentes, de quibus in libris nostris de Medendis corporis malis copiosè diximus, & mediocriter calefacientibus. Quum enim vires imbecilles sunt, fieri non potest quin valenter calefacientia vires deiciant, vt curationi quæ adhuc reliqua est haud sufficere queant. Ex quorum usu hoc etiam incommodum sequitur vt febrem augeant, quæ subinde vires corporis eneruat. Hac igitur de causa potiones ac cibi quibus æger ad incidendos humores vtitur mediocriter calefacere debet. De quibus abū-

de libri 8. Therap. metho.

capite. 4. Galenus

pertractat.

SI qui sanguinem excrearunt breui admodum curati sunt tempore, cæterum cum nunc in partibus thoracis et pulmonis sortiuntur constitutionē, ut si paululo plus coaceruet sanguinis, rursus uel uasis alicuius osculum referetur, aut rumpatur: ijs et si nullum in corpore etiamdū symptoma est, initio Veris sanguinem mittere oportet. Similiter et ijs qui facile in comitiales morbum incidunt, aut apoplexiā. Ad eundē modum si reliquorum morborū alicui obnoxium esse hominem perspectum habuerimus, uerbi gratia, aut peripneumoniae, aut pleuritidi, aut anginae: commitendum nō est ut expectemus dum euidentis aliquod plenitudinis symptoma appareat, sed anteuertere sanguinis missione præstat. Pari ratione etiā quibus hæmorrhoides suppressæ sunt, maximè ubi natura magis melancholici fuerint. Et qui singulis annis æstate plenitudinis morbis laborant, etiam hos, Vere
ineun

ineunte uacuare oportet. Eodem modo
 & ijs qui Vere ipso morbis, cuiusmodi
 capiuntur. Sunt uerò nonnulli oculis
 imbecillioribus, aut uertiginosis obno-
 xij malis, qui & ipsi Veris initio ua-
 cuari postulant.

COMMENTARIUS.

IN hoc capi. 7. Galenus quibus uerno
 tempore, etiam si nullum in ijs plenitu-
 dinis compareat symptoma, sit mitten-
 dus sanguis, docet. Sanguinem enim de-
 trahere primum conuenit ijs qui ali-
 quando sanguinem spuerunt, atque ab
 eo malo prorsus curati sunt, tamen
 eam in partibus thoracis & pulmonis
 sortiti sunt constitutionem, ut si vel
 paululum coaceruent sanguinis, ijs vel
 vasis alicuius osculum aperiatur, vel
 rumpatur. Nisi enim sanguinis exi-
 guam etiam copiam auferamus, venæ
 imbecilliores eam ferre haud possunt,
 ideoque vel aperiuntur confestim, vel
 rumpuntur. Verno autem tempore po-
 tissimum mittendus sanguis, quod hoc
 tempus sit temperatum, adeoque va-
 cuationibus corporis aptissimum.

*Quibus uer-
 no tempo-
 re sit mit-
 tendus san-
 guis.*

*Cur uerno
 tempore mit-
 tendus sit
 sanguis.*

Quod

6. *Aph.*
47.

Quod etiam Hippocrates testatur, qui ita scriptum reliquit: Quibus sanguinis missio, aut medicamentum purgans cōfert, ijs verno tempore sanguinem detrahere, aut medicamenta purgantia propinare oportet. Eodem sanè tempore sanguis quoq; mittendus ijs qui pròptè apoplexiam aut comitiales morbum incidunt. Cuius rei rationē tradit Galenus sect. 1. *Aph. comm.* 15. dicens: Necessè siquidē est vt Vere sanguis auferatur, ne calor æstius repentē superueniens sanguinem diffundat, & quodāmodo extendat, efferuereq; faciat, ita vt qui hactenus exiguus fuerat, nō possit amplius in venis cōtineri, sed vel dirumpat ipsas, vel exedat. Et quādo cum impetu in aliquā corporis partem alijs imbecilliorē fertur, vel in ipsa phlegmonē, vel erysipelas, vel aliquod aliud morbi genus operatur. Præstat itaq;, vt hoc etiā loco Galenus monet, hæc mala sanguinis missione anteuertere, vt nimirū humorū ad patrem aliquā corporis impetus in contrariū auertatur. Pari ratione si quibus solitæ corporis vacuationes, vt sunt hæmorrhoides, supprimun-

tur,

tur, ijs sanguinem mittere oportet, præsertim si natura magis melâcholici fuerint : vt scilicet hoc nomine caueamus ne suppressis hæmorrhoidib⁹ superuacua ad iecur, aliâmvē partem principē decūbant. Quid multa? oportet omnes eos qui quotannis plenitudinis morbis ætate, aut Vere capiuntur, aut oculis sunt imbecillioribus, aut vertigini obnoxij, verno tempore, ad auertendos & vacuandos humores à locis malè affectis, sanguinis missione vti.

Prius autē à nobis considerandū est quale sit hoc quod ipsis coaceruatur. Siquidem nonnulli amaræ bilis humorē plus cæteris aceruant, alij melancholicum, aut pituitosum, alij uerò ex æquo omnes, in quibus sanguis redundare dicitur. Hos igitur omnes uacuabis, quē admodū etiā podagricos et articulorū dolore conflictatos, Veris initio, dato nimirū aut medicamento purgante, aut misso sanguine. Equidē complures qui tribus aut quatuor annis per intervalla pedum doloribus molestati sunt, ego
sanavi

*sanauit, aut redundante humore Veris
 initio purgato, aut sanguine detracto.
 Manifestum autem est quòd tales in uni
 uersa uictus ratione moderati sunt.
 Proinde incontinentes, ebriosq; ac gu
 læ deditos neq; purgatione, neq; sangui
 nis missione magnopere iuuabis. Nam
 per uictus intemperantiam crudorum
 humorum multitudinem celeriter coa
 ceruant. Verùm ut hos cures ne studere
 quidem oportet. Vbi aut obediunt, sum
 mopere eos iuuabis, si Veris initio pri
 mum quidẽ uacuans, deinceps ad exer
 citia, uictusq; rationem salubrẽ perdu
 cas. Cæterum quæ de istis dixi, hæc tibi
 de omnibus qui prædictis paulò antè
 malis, nempe comitiali morbo, apople
 xia, uertigine, sanguinis spuitione, aut
 melancholia, capi apti sunt dictum esse
 putato.*

COMMENTARIUS.

Quid in ijs QVVM antea quibus verno tem
quor uerno pore sanguis sit mittendus exposuerit,
et tẽpore eua nunc quid in vniuersum in ijs qui Vere
 vacua

vacuatione indigent sit considerandū, *cuamvis sit*
 docet, népe quale sit quod in ipsis acer. *consideran*
 uatur. Sunt enim qui amaræ bilis plus *dum.*
 cæteris coaceruare soçét, quos Hippo- *πικροχό-*
 crates *πικροχόλους* appellat. Alij humo *λοι.*
 rem potius melancholicū, nonnulli verò
 pituitosum, aliqui ex æquo oēs, in qui-
 bus sanguis redū dare dicitur. Cuius rei
 rationē reddit Galenus in libro de Ple-
 nitudine, vbi in eum scribit modū: Fieri
 non potest vt ex qui situs vsq; adeò san-
 guis in venis interim cōtineatur, vt ni-
 hil in eo nec bilis, nec pituitæ, nec sero-
 sæ saniei feratur. Proinde nos in supe-
 rioribus idem intelligi volumus, siue
 humores, siue sanguinē abundare dice-
 renus. Quippe immixtus, & ab alijs hu-
 moribus tyncerus sanguis nūquam in
 venis cōprehenditur. Demonstratū est
 alibi de mixto nihil referre humores an
 sanguinem appelles, non tamen quali-
 bet, sed mediocri quadam mensura, in
 animantibus naturali habitu præditis,
 alijs humoribus ei admistis. Nam vni-
 uersis in naturali symmetria & com-
 moderatione adauctis cum sanguine
 per excellentiam dicto, idem humorū
 voca

vocabulum significat, nullumq; discrimē est humores auctos, vel sanguinem fere siue hu-
Nihil re- dicat. Hæc ille. Pari sanè ratione nihil
fere siue hu- refert an plenitudinem esse dicas vbi ex
mores au- æquo vniuersi humores aucti sunt, an
ctor, siue quemadmodum Galenus libro secūdo
sanguinem de compos. med. localium. capit. 1. facit,
dicat.

Plenitudo vbi sanguis auctus est. Cæterum oēs
 eos qui plenitudine aut ca cochymia la-
 borant, veluti etiam podagricos & ar-
 ticulorum dolore confictatos, incipiē-
 te Verevacuabis. Sanguinis quidem mis-
 sione, plenitudine laborantes: vitiosis
 verò humoribus redundantes, medica-
 mento, quod molestantem humorem
 purgat, dato. Hac quidem ratione cō-
 plures triennio aut quadriennio per in-
 terualla doloribus pedum laborantes
 Calenus sanauit. Porro ad integram po-

A podagra & doloris articulorum curatio-
græ & ar- nem temperantia in victus ratione opus
ticulorum est: qua quidem neglecta cætera præsi-
doloris cu- dia certè parum vel nihil prorsus con-
rationem ferunt. Hinc perspicuum omnibus fit,
temperan- cur hodie pauci aut nulli propemodum
tia in victu podagrici sanentur. Quum enim omnes
opus est. fere, nisi quibus fortè hæreditatis iurē
 hoc

hoc malū euenit, in victus ratione plurimū delinquant, ac supra modum incontinentes, viniq; meracioris ac robustioris amantes sint, quid miri si etiam perpetuo hoc morbo cōflicentur, nec vllis præsidijs iuventur? Quare rectissimè Galenus subiungit, manifestissimū, esse quòd tales qui sanantur, per vniuersam victus rationē moderati sunt. Incontinentes autem, ebrios, guleq; deditos nullis remedijs magnopere iuari. Quòd scilicet per intemperantiā in victus ratione crudorum humorū copiam celeriter coaceruent, adeoque prędictorum malorum authores sint. Quare medicū illis ne manū quidē admouere oportet, ne eorundē incōtinentia accidat vt præsidia quę alijs fuere saluti apud vulgum infamentur. Obtemperantes autē summo opere iuuabuntur, si Veris initio vacuati fuerint, & deinceps exercitijs idoneis, victusque ratione salubri vtantur. Verū quod de podagricis & arthriticis dictum est, hoc etiā ad alia mala corporis transferri debet. His enim correpti vacuatione verna iuantur, ū in victus ratione non peccent.

NON solum autem ubi adest plenitudo, uel ad uires, uel ad uasorum humores continentium capacitatem dicta, missio sanguinis plurimū iuuat: sed & citra plenitudinem incipiente inflammatione aut propter ictū, aut dolorem, aut partium imbecillitatem. Quippe dolor ipse sanguinem ad inflammationis locum trahit: & multo- ties partium imbecillitas inflammatio- nem citra totius corporis plenitudinem excitat. Demonstratum enim est in cōmentarijs de Naturalibus facultatibus, imbecillā natura partem promptè grauari, ubi uel paulò plus excrementi in ea coaceruetur. Quinetiam quòd quaelibet pars facultatem ut familiare attrahitricem, ita etiam alienorum excre- tricem obtineat. Tum quòd duplex sit alienum, alterum quantitate, alterū qualitate. Proinde et si pars aliqua ab humoribus in se contentis non grauatur, tamen excrementa quædam in qualitate præter

præter naturam habet, ad eorūdem excretionem per uenas quæ in ea sunt, tanquam per canales, excitari. Cæterum si quod propulsatur prauus fuerit sanguis, aut alius humor, ut ad aliquā propinquam ueniat partem necesse est. In ea alterum duorum eueniet, ut aut concoctus, aut per halitum digestus in aliam tertiam haud transluet: aut si neutrum prædictorum assequatur, denuò ex secunda parte in aliam confluat, deinceps ex illa rursus in aliā, et id ipsum non desinet fieri, quoad in talem quampiam decumbat, quæ amplius quod in ea redundat in aliā propellere nequeat, Accidit uerò hoc ipsum illis partibus quæ facultatem excretricem uicinis omnibus imbecilliores habent. Siquidem nō iam in illas quæ propter robur quod obtineat haud assumunt, id quod molestat propellere ualent. Demonstratum enim à nobis hoc quoque in illis est cōmentarijs quòd quælibet pars non solum quod superuacuum est in uicinam

protrudat: uerum etiam quòd suscipiat, sepe uerò contrà remittat, & propel-
lat, in se haud assumēs. Atq; in hoc cer-
tamine ualidior uincit. Quapropter
partes omnium imbecilliores excreme-
ntis morbis primæ capiuntur. Hac qua-
piam ratione è fluxione natos affectus
fieri scito, uniuerso uidelicet corpore
imbecillo existente, quæ una aliqua est
mali habitus species: principibus illius
partibus, etiam si paucus in ipsis est san-
guis, grauari solitis, eumq; ad carnosas
iuxta cutem partes protrudentibus, ma-
gisq; ad glandulas excipiendo superua-
cua idoneas, tum propter substantiæ la-
xitatem, tum quia inter alias partes in-
firmiſſimas habeant naturales faculta-
tes quemadmodum etiam pinguedo. Nā
quum quatuor eæ sint, ut ostensum est,
prima quidem attractrix, altera reten-
trix, tertia excretrix, & quarta altera-
trix, alias quidem tres imbecillimas glā-
dulæ carnesq; obtinent: alteratricem ue-
rò jōtā haud multò cæteris partibus

minorem. Post glandulas pulmo fluxio
 ni recipiendæ promptissimus est. Nam
 & hic tres facultates imbecillas obti-
 net, & corpus laxū. Deinceps lien. Ce-
 rebrum autem perinde ut illæ, aut etiam
 plus excipiendo fluxui est habile. Cete-
 rum hoc illis meliore est conditione. q̃
 constructionem habet excernendis ijs
 quæ suscepit promptam. Magnos enim
 uentriculos obtinet qui pronis meatibus
 uacuantur. Quibus igitur pulmo,
 lien, ac cerebrum carnosogenere natu-
 ra robustiora sunt, in ijs ad glandulas
 & carnes fluxiones perueniunt, ubi ni-
 mirum uniuersus corporis habitus im-
 becillus fuerit, sunt in affectibus è flu-
 xione natis accidit. Merito itaq; cura-
 tionis horum scopus est non quidē ua-
 cuatio, sed totius corporis roboratio:
 quanquā curationis initium in ijs à
 sanguinis missione fit. Si uerò excremē-
 ta praua etiam qualitate sunt prædita,
 purgationem quoq; adhibemus. In qui-
 bus maximè corporibus neutrius pleni

tudinis proprium symptoma expecta-
re oportet, gravitatem quidem eius quæ
ad vires dicitur, tensionē uerò eius quæ
ad uasa. Pari ratione in ijs quibus pars
aliqua grauitè icta est, siue aliter quo-
modocunque incipientē obtinet inflam-
mationem, ubi magnam ipsam fore su-
spicamur, curationem à uacuatione or-
dimur, aut purgantes, aut uenā inciden-
tes, prout alteram altera magis conue-
nire uacuationem iudicamus.

COMMENTARIUS.

*Sanguis in-
terdū præ-
sente ple-
nitudine
mittendus.*

QVVM in superioribus monstratū
fit sanguinē tum potissimum esse mit-
tendū quando plenitudo nata fit in cor-
pore, tunc certè quòd interdum etiā fit
detrahendus sanguis ubi nulla adest ple-
nitudo monstrat, nempe ubi phlegmo-
ne aliqua vel propter ictum, vel dolorē,
vel partium imbecillitatē incipit. Quip-
pe ex ictu, aut casu ex alto loco partes
corporis afflictæ sanguinem ad se præ-
ter naturam trahunt, ideoq; phlemone
fit. Quare sanguis quē alliciunt per ve-
næ sectionem auertendus & vacuandus
erit.

erit. Dolor autem quo pacto phlegmonem efficiat, Galenus lib. 13. The. meth. tradit, in hunc scribens modum: Quæ dolent cernuntur ea quoq; phlegmonē ex dolore pati, sed causam eius quidam omninō non assignāt, quidā nullo modo probabilem. Nostra verō sententia talis est. Docuimus in eo opere quod, de Naturalibus facultatibus edidimus, vnā esse naturæ facultatem quam excretoriam dicimus. Ea suo munere fungitur quum triste aliquid sentit. Vnum verō quiddā est ex eis quæ eam contristant, ipsa quæ dolorem excitat causa, quæcunq; ea sit. Hanc igitur eijcere dū properat, phlegmonem interdū in particula concitat. Quum enim primis suis conatibus nihil profecit, vehementius aggressa quod intestat expellere, sanguinis aliqd & spiritus ex superpositis partibus in afflictam simul exprimit. Atque hinc fit quod ex dolore particula proportionē confluentis in eam humoris, in tumorem attollitur. Hæc ille. Quin etiam lib. 3. Ther. meth. dolorem fluxiones cōcitare, & cap. 95. Artis medicæ Galenus tradit. Quomodo autē imbecillitas partiū

excitat in tas partium citra plenitudinem excitet
terdū phle phlegmonē, & hīc & alibi copiosè Ga-
gmone ci lenus docet. In libro em̃ tertio de Na-
tra pleni turalibus facultatib. cap. 13. Ther. meth.
eudinem. & lib. 6. de Tuenda sanitate, cap. 11. & 13,
 Ther. meth. demonstratum est imbecil-
 lam partem facilè grauari, vbi vel pau-
 lò plus excrementorum in ea coacerua-
 tum fuerit, & quòd quælibet particula
 habeat non solùm facultatem familia-
 rium attractricem, verum etiam alieno-
 rum excretricem, & quòd duplex sit alie-
 num. Ita enim in 6. de Tuenda sanit. in-
 ter cætera scribit: Siquidem demonstratū
 est in ijs cōmētarijs qui sunt de Na-
 turalibus facultatibus inscripti, singu-
 las partes trahendi facultatē habere pro-
 prij sibi ac conuenientis humoris, quē
 alterantes, assimilantesq; abutuntur ad
 nutrimentum. Rursus aliam facultatē
 habere, qua quod superuacuū est expel-
 lere in vicinum desiderēt. At si ipsa qui-
 dem quæ vicina est particula corporis
 habitum firmum habeat, quod sibi ob-
 truditur, utiq; non admittit, facitq; ut in
 ipsa solùm quæ primum affecta particu-
 la est, dolor vsq; subsistat: sin imbecilior
 fit,

fit,quàm illa vnde excrementum mitti-
tur,admittit illa quidem,cæterùm ipsa
quoque ad imbecillio rem,quempiã à se
rursus transmittit:atq; hæc rursus ad a-
liam,donec in eã procumbat, cui imbe-
cillior nulla sit reliqua. Atque ad hunc
quidem modum,quorũ nulla victus sui
cura est,alius alia parte assiduè vexa-
tur. Qui verò nihil colligunt superua-
cui,his manent imbecillæ partes semper
in tuto. Cuius rei evidentissimum ar-
gumentum est,quòd aliqui sex mensi-
bus pluribusue infirmis ptibus laborāt.

Quũ si sola imbecillitas ipsa efficeret,
ppetuò laboraret pars infirma,ceu cui
malè afficiatur causa nūquam abesset.
Nunc quoniam perpetuò non laborat,
manifestum est aliud quippiam interue-
nire quod eius mali gignendi sit occa-
sio:quòd certè aliud non est,q̃ quòd vel
quãtitate,vel qualitate redundat. Ha-
tenus Galenus. Idem sanè, sed multò
breuius,cap.4.de Morborum causis Ga-
lenus docet,nempe nō solùm,sua quan-
titate excrementa particulas ad excre-
tionem irritare, sed & prava sua qualita-
te. Excernūt autem eadẽ per venas quæ

in ijs sunt tanquam per canales quosdā.
 Cæterum quod excernitur, siue prauus
 sanguis fuerit, siue alius humor, vt in vi-
 cinam aliquam veniat particulam ne-
 cesse est. Quo facto alterum duorū eue-
 niat oportet, vt aut illic concoquatur,
 aut discutatur. Legēdum enim hoc lo-
 co *διαφορῶντα*, & non *διαφθαρῶντα*,
 vt Aldinū exemplar habet. Id quod an-
 tiquus confirmat interpret, qui locū il-
 lum Galeni ita cōuertit. In illa verò al-
 terum duorum eueniet, vel digestos, vel
 transpiratos nō adhuc ad aliā transflui
 tertiam. Præterea si humor in secunda
 inagis corrumpetur, ex illa in tertiam
 necessariō transflueret. Neq; enim secū-
 da, vt quæ tertia robustior est, illum re-
 tineret. Quod si itaq; humor prauus in
 secunda particula vel concoquitur, vel
 discutitur, in tertiam haud transluet.
 Si verò neutrum horum accadat, ex se-
 cunda in aliam confluat necesse est, &
 subinde ex illa rursus in aliam, idq; tan-
 tisper duret, donec in talem aliquam de-
 cumbat, quæ amplius quod in se redun-
 dat in aliā propulsare nequit. Eiusmo-
 di autem est quæ excretricem facultatē
 cæteris

Aldinus
codex emē
datus.

cæteris sibiq; vicinis omnibus imbecilliorē habet. Neq; em̃ id quod molestat in alias, quæ propter robur quod habet nihil assumunt, propellere potest. Nam, vt in libris de Naturalibus facultatibus demonstratum est, quæuis corporis pars nō solūm quod superuacuum est, & in ea redūdat in vicinam protrudit, verū etiam ab alia superuacua assumit: quum scilicet ea imbecillior fuerit: sæpe etiā accidit, vt quod ab altera mittitur eidē remittat, & vicissim à se repellat, haud quod mittitur assumens. Et in eo quīdem certamine penes validiorem particulam victoria erit. Verba autē Galeni è libro tertio iā citati Cōmētarij ita se habet: Sicuti inter se particulae altera ab altera nutrimentū trahūt, ita altera in alteram quod superuacuum est à se deponit. Et sicut trahentium ea vicit quæ valentior erat, sic & à se deponentium. Estq; hæc vocatarum fluxionum causa. Habet enim particula quæque natium quoddam robur, quo quod superuacuum est persequitur. Vbi igitur earum aliqua effectus alicuius occasione imbecillior est reddita, ex omnibus

in illam cōfluere quæ superuacua sunt, est necesse. Ea nanq; quæcunq; pars valentissima est, in vicinas omnes reponit.

Earū rursus singulæ in alias quæ ipsis sunt imbecilliores, dein rursus illarum singulæ in alias, idq; eatenus longissimè procedit, quoad ex omnibus fugatum superuacuū in vnam quampiā maximè imbecillarū procūbat. Hinc nanq; in aliam transfluere nequit, vtpote nec valentiorū aliqua id recipiēte, nec malè affecta & laborante ipsa à se repellere valente. Hæc Galenus. Quæ quidem quum non parum lucis ijs quæ hoc loco dicuntur afferunt, præterire non voluimus. Ceterū ex iam dictis omnibus perspicuum fit partes cæteris omnibus imbecilliores morbis ex supuacuis atq; excrementis ortis primas corripi, quòd nimirum illa in se recipere ob causam paulò antè expositam cogantur. Hac itaq; ratione affectus è fluxione nati sunt, vniuerso nimirum corpore imbecillo existente, & principibus illius partibus, etiam si exiguus in ijs est sanguis, grauari solitis. Quum enim imbecillæ sint principes quoque partes in

ea

Quæ partes morbis ab excrementis nasci corrumpantur.

ea mali habitus corporis specie, nihil mirum si à modico etiam sanguine grauentur. Quare illum ad carnosas iuxta cutem partes, magisque ad glandulas, quòd scilicet excipiendis superuacuis idoneæ sint: idq; duplici ratione, propter nimirum substantiæ laxitatem, & quòd inter omnes alias corporis partes naturales facultates, perinde atque pinguedo, infirmissimas habeant. Priores enī tres, attractricē videlicet, retentricē, & excretricē glādulę ac carnes imbecillimas habent, alteratricem autem solam haud ita multò reliquis partibus debiliorem. Hinc libr. 13. Ther. meth. Galenus ita quoq; scriptum reliquit: Sæpe à nobis monstratū est superuacanea quæ valentioribus partibus ob plenitudinē vel qualitatem expelluntur ea in imbecilliores procumbere: atq; hinc accideret vt glandulæ facilè fluxiones recipiāt, & maximè quæ rariores natura sunt. Quippe valentius est arteriarum & venarum, & neruorum, & musculorum robur: imbecillius autem & fortè nullum corporum quę glandularū sunt naturę. Sic igitur fit, vt & propter vlcus quod

*Glandulę
fluxiones
facilè recipiunt.*

in manns aut pedis digito fit, eiusmodi glandulę in inguinib⁹ & alis tum intumescent, tū phlegmone occupentur, quū de fluentē ad vltimos artus sanguinē priores exceperint. Quinetiam in ceruice & secus aures sæpenumero glandulę ijs quibus in ceruice, capite, vel aliqua vicina parte vlcus est natum, intumescunt. Hęc Galenus. Ceterū post glandulas ad excipiēdas fluxiones pulmo promptissimus est, quòd videlicet hic tres facultates imbecillas habeat, corpusque eius laxum, leue, & rarum sit, quemadmodum lib. 4. 6. & 7. de Vsu partiū Galenus abundē monstrat. Post pulmonē ad fluxiones excipiendas lien idoneus est, quod corpus huius visceris rarū, & spongię modo laxum, Galeno libr. 4. de Vsu par. teste, existat. Cerebrū excipiendis fluxiōibus perinde atque iam dictas partes habile est, propter caua & ventriculos quos continet. Verū hoc illis est meliore conditione, quòd ita constructū est, vt promptē quas recipit fluxiones excernere queat. Magnos enim ventriculos obtinet, qui pronis & deorsum spectantibus meatibus, per palatū
nimir

nimirum & nares, vacuatur. Ex ijs itaque clarū fit quibus pulmo, lien, & cerebrum carnosio genere natura valentiora sunt, illis ad glandulas & carnes fluxiones, vbi scilicet totus corporis habitus imbecillus fuerit, peruenire, quod sint partes omnium debiliores, & ad fluxiones excipiendas aptiores. Quocirca in affectibus à fluxione procreatus cu rationis præcipuus scopus totius corporis roboratio est, non vacuatio. Nisi enim vniuerso corpori robur cōcilietur, nunquam fluxionum causa deerit. Nihilominus tamen initiū curationis à sanguinis missione fit. Nisi enim sanguis auferatur, periculum est ab ipsis excrementis ad imbecilliores partes defluentibus fieri phlegmonem. Quod si simul prauam quoque excrementa qualitatē sortita sunt, purgatio etiam adhibenda erit, ne videlicet putredinis morbos præcreent. Atq; ijs quidē præsidijs vtendū, etiam si nullū plenitudinis symptoma adest. Pari ratione in ijs quibus pars aliqua corporis grauiter icta est, siue aliter quomodocunq; incipientē sustinet phlegmonem, vbi magnam fore me-

In affectibus à fluxione procreatis præcipuus scopus rationis scopus roboratio.

tuimus, curationem à vacuatiōe auspicabimur, venam incidentes, aut purgatorium medicamentū propinātes, prout alterum altero præsidio magis cōuenire iudicauerimus. Atq; hæc quidem de Hippocratis sententia dicta esse intelligantur, qui lib. 2. Victus acutorū morbo num, Aphor. 10. & 11. in pleuritide & inflammatione costarum nunc venæ sectione, nunc purgatione vtendum esse docet. Tutius verò semper est, vt in Cōmentarijs ibidem Aphor. 11. Galenus etiam testatur, vbi etiam dolor ad hypochondria finitur, in pleuritide sanguinis misionem vsurpare, propter causas quas illic commemorat. Quodd autē venæ sectio internis inflammationibus cōmodior sit ipsa purgatione, hinc palàm fit. Venæ nanque sectio citra loci male affecti impletionem, dolorem, calorē, aliamue insignem læsionem retrahit, deriuat & vacuat. Proinde materiam instantem minuit, naturam exonerat, vires roborat, dolores mitigat, caloremque restinguit. Purgatio autem etsi vacuat, retrahit, & deriuat humorem, tamen id nō semper potest, Hinc ab Hip-

*Tutius
est in omni
pleuritide
misione
sanguinis,
quàm pur-
gatiōe uti.
Cur venæ
sectio in in-
ternis in-
flāmatio-
nibus com-
modior.*

*4. Vict.
acut. aph.
19.*

pocrate dictum est: Qui statim inter morbi initia phlegmones medicamēto purgante soluere conātur, ij à distenta inflammataq; parte nihil auferunt, affectus verò, utpote crudus, nō remittitur, ac partes sanæ morbo resistentes colliguescunt: quocirca morbus imbecillum tam corpus vincens, curationi non obedit. Hæc ille. Præterea purgatio calefaciendo, trahēdo, locum malè affectum irritando ac implendo, fehemq; augēdo mirificè nocet. Quare meritò fugienda in phlegmonibus erit. Causam autē cur Hippocrates in pleuritide ea uti vo-
suerit, infra cap. nimirū 15. exponemus.

CAPVT IX.

RECTE' igitur in ijs quæ de uic-
tuetu acutorum morborum pro-
posita & disputata sunt admonemur
ut sanguinem mittamus, ubi magnus fue-
rit morbus & æger florentis ætatis, ro-
burq; aderit. Perperamq; Menodotus
in sola syndrome plethorica uocata
uenæ sectionem obseruari tradit. Con-
tra enim in uniuersum sanguinis mit-

tendi scopi plenitudinem in se primo
 haud cōplectuntur, sed suspiciōē eius
 qd' adhuc sit mali. Nā si magnū fore ap
 pareat, sanguinē mittemus etiā si nulla
 plenitudinis nota adest, etatē, regionē,
 & uires cōsiderātes, quæ sola etiā in ijs
 quæ de uictu acutorū disputātur dicta
 esse cōspiciuntur. Vigentes enim etate
 propter pueros & senes ad distinctam
 explicationem adsumpsit. Primi autem
 & maximè proprii sanguinis mittendi
 scopi sunt, morbi magnitudo, & robur
 laborantis. Et hanc primā esse syndro=
 men dicere oportet, haud plethoricā, in
 qua sanguinis missio obseruata sit: quip
 pe in illa & hæc cōprehenditur, ut quæ
 morbi magnitudinē adaugeat. Non so
 lum enim ubi iam adsit morbus magnus
 sanguinis mittēdi occasio est, sed & ubi
 futurū esse suspicio est. Doctrina enim
 quā Hippocrates tradidit anteuertit,
 docēs nos quæcūq; pñtibz iā morbis
 rectè faceremus, melius esse ut hæc inci
 piētibus ipsis, aut iam imminētibus ana

teuertēdo faciamus. Proinde & prædi-
ctos scopos ad sanos trāsferre licet. Si-
quidem & ijs sanguinē mittes, ubi ma-
gno aliquo capi morbo suspicio est: æ-
tatis tamē & roboris habita ratione.
Nā si quis ut magnū incurrat morbum
habilis sit, etiamsi nullū adhuc in corpo-
re symptoma apparet, sanguinē tamen
mittendum censemus. Satis est enim æta-
tem unā cum uiribus cōsiderasse. Tria
itaq; sunt quæ dignotionem continent,
morbi magnitudo, aut præsens, aut im-
minens, ætas uigens, & uirium robur.

COMMENTARIUS.

MITTENDUM esse interdū san-
guinē nulla etiā plenitudinis nota præ-
sente, modò præcipui mittendi sangui-
nis scopi, morbi videlicet magnitudo,
ætas uigens, roburq; facultatis, adfint,
Hippocratis testimonio cōfirmat. De-
promptū autē hoc ipsum est ex lib. 4. de
Vitu acutorū morborū, ubi Aphor. 16.
ita scriptum reliquit: In acutis, inquit;
morbis sanguinem mitte, si vehemens
esse appareat morbus, et egrotātes etate
floreāt, ipsisq; robur adfit. Quibus sanē

verbis Hippocrates sanguinem esse detrahendum hortatur in acutis morbis, nulla etiam plenitudinis nota apparen-
te, si mittendi sanguinis tres præcipui scopi id ipsum fieri suadeant. Proinde Menodotum errasse constat, qui in sola plethorica vocata syndrome, venæ sectionem obseruare tradidit. De quo in explicatiōe iam citatæ Hippocratis sententiæ ita scribit Galenus: Quum omnia hæc rectè dicta sint, quosdam tamē non rectè vfos fuisse putandum est: quo quidē

Menodotus.

è numero Menodotus empiricus est, qui in sola plethorica vocata syndrome, sanguinis missionem obseruari affirmat. Nos autem & ea haud existente sanguinem mittimus, vbi vehemens dolor repentē hominem prehenderit, vel pars aliqua fracta fuerit, vel os è suo articulo motum sit. Nō autem semper sanguinem mittimus etiā si plethorica syndrome facta est, sed frictione, & balneis multis, & abstinētia bidui aut tridui, ad id quod naturale est reducimus. Hęc Galenus, quę commemorare volumus, vt lucem aliquam ijs quæ hoc loco dicuntur afferrent. Eadē planē tradit etiā

lib. 4. Ther. meth. cap. 6. vbi ita inter cetera de methodicis vocatis scribit: Nam vbi in plethorico, vt illi loquuntur, concursu, vacuationē à se obseruatā dicunt, manifestē fatētur ob nullius alterius eorum quę in ægro visuntur respectum se ad vacuationē accedere. Neq; hoc dico propterea quod purgatio vacuatio sit, quā plethoricus cōcursus non indicet: sed quod etiā tametsi plethoricus cōcursus non adsit, ad ipsam tamē sanguinis missionē interdū sit cōfugiendū: quando si valens sit morbus cū viriū robore, nemo est qui sanguinem nō mittat, qui vtiq; in artis operibus sit exercitatus. Quippe ipsos Empiricos videmus quū lapsus ab alto quis sit, aut alius plaga aliqua cōtusas vehemēter corporis partes habuerit, ad sanguinis missionē confugere, quanquā idē homo paulò ante sanus fuerat, prorsusq; plethorici concursus expers. Ex quo patet non hoc esse quod mittēdū sanguinē indicet, sed magnitudinē morbi, ac viriū robur, exceptis tamen à sermone pueris. Hactenus Galenus. Cæterū qd sit plethorica syn-drome aut plethoricus concursus, mul-

Plethori- tis in locis docet Galenus, nullibi autē
ca syndro- clarius quā in libro de Plenitudine,
nic. vbi in eum modum scriptum reliquit:

Quin & tertius quidam coetus alius est,
 qui nec sit an nō sit aliqua facultas no-
 rit, nec se inquirere fatetur, verū ex non
 nullis quæ euidenter apparēt notis circa
 ægrotantē, vacuationē per longū vsum
 sibi inuentam ait. Hic si deinceps quēnā
 notę hę sint rogetur, Vasorū, inquit, di-
 stentio, & rubor, & vniuersi corporis
 grauitas, & pigritia ad motum, traducta
 in otio prior vita, nō sine ciborū & po-
 tuum larga ingestione, & solitarū excre-
 tionū retentio. Ex hac igitur syndrome
 (sic enim symptomatū cōgeriem appel-
 lat) venę secundę vtilitatem observa-
 tam esse dicit. Hęc ille. Monendus hoc
 loco nobis lector erit in codice Græco
 Aldino esse immēsum errorē, qui cita-
 tam paulò antè sententiā ita legit: καὶ
 ἀνιά? η ἡ νόσος, ἢ ὁ νοσῶν: hoc est, &
 morbus, aut æger in vigore fuerit. Con-
 stat enim hūc alibi ita præcepisse: Quū
 morbi inchoāt, si quid mouendū vide-
 tur, moue: quum verò consistunt ac vi-
 gent, melius est quietē habere. Expun-
 genda

Græcus
Aldinus
codex ca-
stigatus.

2. *A ph.*

29.

genda igitur hæc verba, *ἢ νόσος* erunt,
 quâdoquidē initio morbi, nō eo vigē-
 te sit mittendus sanguis, vt alibi etiā do- *4. Victi.*
 cuit Hippocrates ita scribens: Quapro. *acu. 24.*
 pter, prius adhibito fomento, statim ab
 initio venā secare oportet, quū nondū
 fixa sunt omnia quę infestāt, tum flatus,
 tum fluxiones, sic enim facilius reme-
 dijs vincuntur. Hæc quū ita se habeāt,
 palām omnibus sit quòd sanguinis mit-
 tendi scopi plenitudinē in se primò nō
 cōplectātur, vt Menodotus censuit, sed
 potius suspicionem eius mali quod ad-
 huc sit. Si enim magnū fore morbū su-
 spicemur, sanguinem mittemus etiā si
 nulla adest plenitudinis nota, ætatē ta-
 men, regionem, & vires inspiciētes, quo-
 rum solorum etiā Hippocrates in ea di-
 sputatione quæ de Victu acutorū mor-
 borum ab ipso instituta est meminit. Vi-
 gentium enim ætate mentionem facere
 voluit propter pueros & senes, quo-
 rum neuter ad sanguinis missionem ha-
 bilis & idoneus est, vt cap. 13. latius do-
 cebimus. Regionis tamen & ambientis
 aëris Hippocrates non meminit. Hinc
 in enarratione eius sententiæ Gale-

nus ita scriptum reliquit: Verùm vt nihil
 desit, adiiciam & eum qui ab ambiente
 nos aëre desumitur scopum, quum fue-
 rit abundè calidus & siccus, ita vt citò
 ab eo corpus euaporetur. Nempe tunc
 sanguinis missione abstinemus etiam si
 morbus magnus est, florensque; ætate ho-
 mo. Id ergo author solùm prætermisit.
 Hæc ille. Primi igitur & maximè pro-
 prii sanguinis mittendi scopi sunt duo,
 morbi nimirum magnitudo, & laborā-
 tis robur. Et hanc syndromen, magni-
 tudinis scilicet morbi, & roboris labo-
 rantis, primã dicere conuenit. Plethori-
 ca enim syndrome in illa complectitur,
 vt quæ magnitudinem morbi adauget.
 Quando enim vehemētiora fuerint ple-
 thorica sympt. tanto vehemētiorẽ quo-
 que esse morbũ oportet. Nō solùm igi-
 tur quũ iam adest morbus magnus mit-
 tēdi sanguinis occasio est, sed & ubi fu-
 turũ propter plenitudinẽ, aliãmve cau-
 sam suspicamur. Quippe doctrina quã
 Hippocrates in lib. Aphorismorum tra-
 dit, anteuertit, eo quòd doceat nos quæ-
 cunq; præsentibus iam morbis rectè fa-
 ceremus, melius esse vt incipientibus
 ipsis,

*Duo pri-
 mi & ma-
 ximè pro-
 prii mittē-
 di sangui-
 nis scopi.*

*Plethori-
 ca syndro-
 me in præ-
 dictis sco-
 pis comple-
 ctitur.*

ipfis, aut iam planè imminentibus auertentes faciamus. Ita enim in secunda sectione Aphorismorum scriptum reli. *apho. 19.*
quit: Quū morbi incipiunt si quid mouendum videtur mouet. Vt hinc certè planum fiat prædictos duos scopos etiā ad sanos transferri posse, quòd scilicet ijs quoq; vbi eosdē magno aliquo capi morbo suspicamur, sanguinē mittamus, non obstāte, quòd omnes adhuc actiones integras, & nōdum labefactatas habeant, modo ætas & vires permittant.

Quocirca tria sunt in vniuersum quæ *Tria sunt*
dignationē mittēdi sanguinis cōtinēt, *in uniuersū*
morbi nimirū magnitudo aut præsens, quæ digno
aut imminens; vigor ætatis & robur vi- *tionem mit-*
rium. His enim præsentibus, etiā si nulla *tendi san-*
plenitudinis apparēt symptomata, san- *guinis com-*
guinem intrepidè mittemus. *tinent.*

Verū negligentius fortè in ijs quæ
in libro de Viçtus ratione acutorum
proposita sunt sola particula ætatis ex-
posita esse uidebitur. Neq; enim uigen-
tium ætatem solū dixisse rectè se ha-
bet, sed & eam quæ hanc præcedit, &
quæ illam sequitur; ut scilicet duæ tan-

tum distinctione ipsa, nempe puero-
rum & senum, exemptæ sint. Sed senum
ætas in uerbo uirium complecti potest:
nulli enim qui in ea ætate est constitu-
tus robur inest. Quibusdã uerò medicis
ne pueris quidẽ robur inesse uisum est,
sed malè rem intelligentibus, ut alibi à
nobis est demonstratum. Sanguinẽ itaq;
mittemus ubi magnum fore morbum su-
spicabimur, aut præsente in iam intuebi-
mur, aut incipientem, robur uirium cõ-
siderantes, pueris tantum ex oratione
exemptis. Dicemus etiam minus perfe-
ctè dignotionis quæ ab ætate fit ab eo
qui proposita libri de Victus ratione
scripsit mentionem factam fuisse. Suffi-
ciunt enim ad mittendum sanguinem hi
soli scopi. Neq; enim ubi copia crudo-
rum humorum tanta est coaceruata, ut
sanguinis missionem prohibeat sermo
redarguitur, quippe uiriũ robur istis
non adest. Estq; ipsa hæc nota quòd illi
sanguinis missionẽ perferre haud que-
ant, quando unà cum colore totius cor-
poris

poris qui tum accidit, sanguinem re-
 dundare significante, pulsus fuerit in
 uehementia & magnitudine inæqua-
 lis, per eius inæqualitatem superanti-
 bus debilibus, & paruis.

COMMENTARIUS.

REPREHENDIT hoc loco Gale-
 nus quod in citata paulò antè ex lib. de
 Victu acutorum morborum sentètia de
 ætate negligentius est dictum. Neq;
 enim vigentis tantùm ætatis eius sen-
 tentiæ author meminisse debuit, sed &
 eius quæ hanc præcedit, hoc est adole-
 scentiæ, & eius quæ sequitur, id est con-
 stantis seu mediæ ætatis, quippe pos-
 sunt etiam hæ ferre, haud secus atq; iu-
 uenes, sanguinis missionem: vt hac sci-
 licet ratione duæ tantùm ætates, puero-
 rum nimirum & senum, distinctione
 ipsa exemptæ essent, vt quibus detra-
 here sanguinem haud liceret. Sed po-
 test quidem senum ætas sub virium ver-
 bo complecti, quòd nullus sit in ea æta-
 te constitutus qui robustas vires habeat.
 Vtrunq; autem concedamus senes in
 virium verbo comprehendi posse,

non

*Senectus
 sub virium
 robore cõ-
 plectitur.*

Pueri non sunt uiribus imbecillis præditi. non possunt tamen pueri, quòd scilicet viribus sint validis præditi. Vt errare necesse sit eos qui iisdem nullum inesse robur affirmant. Nam ut lib. i. de Tuenda sanitate, cap. 5. Galenus testatur, in functionibus quas naturales appellamus, veluti auctione, cōcoctione, distributione, & nutritione, infantes planè ceteris ætatibus longè præstāt. In explicatione quoque eius sententiæ quā suprā citauit, sic scriptum reliquit: At certè pueri quanquam vitali facultate valēt, tamē neque hi sanguinis sustinēt missionem. Facile enim eorundem substantia tum ob humiditatem, tum tēperamenti caliditatem discutitur. Hæc ille. Vnde palam fit & vitale & naturalē facultates in pueris & infantibus esse admodum validas. Porro de ætatibus, & earundem numero diximus copiosè in enarratione Apho. 13. sectionis primæ. Ex ijs igitur perspicuum fit sanguinē esse mittendū tum vbi morbum magnum fore suspicio est, aut vbi iam adest eiusmodi morbus, aut incipit, modo vires robustæ sint, pueris tantum exemptis, quibus non obstante quòd vires robustas habent, propter causas expositas

fitas sanguinē detrahēre nō licet. Quare author suprà citatæ sententiæ, neq; enim Hippocratis est is liber, vt in præfatione eius disertè Galenus attestatur, haud perfectè dignotionis eius quæ ab ætatē fit mentionem fecit: iuuenum enim meminit, quos omisſiſſe cōſultius fuiſſet, & pueros ab oratione exemptos eſſe. Aut adoleſcētū & cōſtantis quoq; ætatis mentionem factā eſſe. Tres itaq; tantum ſcopi ad mittēdum ſanguinem ſufficiunt, morbi nimirum magnitudo, virium robur, & ætas. Nunc obiectionē quandam diluit de crudis humoribus. Poſſet enim quiſpiam aduerſus hæc quæ dicta ſunt in eum modum colligere: Crudorum humorum copia ſanguinis quoq; miſſionē impedit, quare ad hos quoq; medicum reſpicere oportet, & non tantū ad tres ſcopos comprehenſos. Reſpōdet itaq; Galenus, ſermonem habitum non poſſe propter crudos humores coaceruatos in corpore redargui, quòd ſub virium ſcopo ſint cōprehenſi. Nemo enim eorū qui crudos humores coaceruauit, viribus robuſtis eſſe poteſt. Id quod manifeſtè pulſus illorū,

*Quartus de
uictu acu-
torum mor-
borum li-
ber non eſt
Hippocra-
tis.*

Obiectio.

Reſpōſio.

*Crudis hu-
moribus re-
fertur robu-
vnā*

stas uires vnà cum colore totius corporis qui cru-
baud obti- dum sanguinē abundare monstrat (est
uent. autē is, vt ex sequēti capite patebit, plū-
 beus, aut ex pallido cādīdus) significat.

Quippe is in vehemētia & magnitudi-
 ne est inæqualis, atq; in ea inæqualitate
 pulsus debiles & parui superant. Quo-
 rum sanè vterq; facultatis & roboris im-
 becillitatē denotat. Cæterùm hoc lo-
 co mirificè est deprauiatus Aldinus co-
 dex Græcus: pro κωλύειναι enim malè le-
 git κελύειναι, & pro ἀκλῶντι non rectè
 habet ἀκλῶντι. Demiq; pro ἀνώμαλῳ
 ἢ. legendum erit ἀνόμαλῳ ἢ. Tum enim
 eum sensum adferēt Caleni verba quē
 in nostra conuersione expressimus. Cui
 etiam antiqui interpretis translatio suf-
 fragatur. Porro non esse in humorum
 crudorum copiam mittendum sangui-
 nem, Galenus copiosè admodum lib. 4
 de Tuenda sanitate, capite 4. ostendit.
 huc itaq; lectorem amandamus.

Tribus itaq; scopis mittendi sangui-
 nis definitis, magnitudine nimirū morbi
 aut præsente, aut imminēte, aut incipiē-
 te, uigente ætate, & robore uirium ex-
 tra puerorum ætatem, ad alias prædi-

Etas mittendi sanguinis notas, quas non pauci medicorū adiecerunt, accedamus, qui quātitatem quidē detractiōis, non ipsam sanguinis missiōē simul indicarūt. Proinde ē morbo, etate, & uiribus quòd mittēdus sit sanguis cognoscitur: quātitas autē uacuationis, non solum ex istis, sed & alijs deprehēditur. Hæc uerò sunt plethorica uocata syndrome, ambiētis nos aëris tēperatura, in tēpus & regionem diuisa, et quæ in antea cta uita circa ciborū tum qualitātē tū quātitatem acciderunt, excretiones item ac motiones aut factas, aut non factas.

COMMENTARIUS.

QVVM ex ijs quæ præcesserunt in hoc capite omnibus perspicuum sit tres esse in vniuersum sanguinis mittendi scopos, nempe magnitudinem morbi aut præsentem, aut imminensem, aut incipientem, vigorem etatis, & robur virium, exemptis tamen pueris, quibus, etsi viribus sunt robustis, sanguinem, ut comprehensum est, detrachere non licet: nunc quòd notæ quæ plethoricam *Nota quæ vocatā*

plethoricā vocatam syndromen constituunt quā
uocatā syn titatē detractionis sanguinis, nō ipsam
dromen cō sanguinis missionem indicēt, docet. Nā
stituunt, quum plethoram, adeoq; sanguinis re-
quantitatē dundantiam significant, quod multum
detractio sanguinis, modò per vires liceat, sit de-
nis sangui trahendum, ex illis colligitur, non autē
nis indicāt. quòd sit mittendus sanguis, quòd non
 rarò nulla in corpore existente plen-
 itudine sanguis nihilominus mittat-
 tur, quemadmodum copiosè antea est

Signa qui monstratum. Signa autem è quibus va-
bus uacua cuationis quantitas cognoscitur, & quæ
tionis quā plethoricam constituunt syndromen,
ritas co sunt aëris nos ambientis temperatura,
gnoscitur. quæ in tempus & regionem diuiditur.
 Nam hæc ipsa pro temporum & regio-
 nū varietate mutatur, quòd singula tē-
 pora, singuleq; regiones suas aëris con-
 stitutiones habeant. Item qualitas &
 quantitas ciborum antea ingestorum,
 excretionēs retentæ, motusq; ceu exer-
 citia neglecta, vt initio huius capitis su-
 sius est à nobis ostēsū. Quæ fa-
 nè omnia quantitatem va-
 cuationis demon-
 strant.

CAPVT X.

DE differentia quidem illorū paulo post uidebimus, de utriusque autem plenitudinis notis in presentiarum contemplabimur, num mittendus omnino sanguis sit, quando hæc in homine solita adhuc obeunte negotia apparuerint, aut necessarium non sit ubi nulla magni morbi fuerit suspicio. Porro quid hac de re sentiam, uobis perspectum est, ut qui sæpe adfueritis mihi sanguinis missionem suadenti aut podagricis, aut arthriticis, aut comitiali morbo obnoxiijs, aut melancholicis, aut ijs qui sanguinem antea expuissent, aut in thorace structurā ad id illū idoneam sortiti essent, aut uertiginosis, aut ijs qui crebrò corripī solēt, angina, uel peripneumonia, uel pleuritide, uel hepatitide, uel uehemēti ophthalmia, uel, ut summatim dicā, magno quopiam morbo. Quippe in ijs omnibus sanguinis missio nē necessariū esse præsidium arbitror, cōfestim adhibitam, post habitam uirium

Et ætatis rationē. Hæc si aliquando nō
 dicantur, subaudire tamen oportet. Ve-
 rùm ijs qui nihil tale antea perpeſſi
 ſunt, omniumq; corporis partium incul-
 patam habent conſtitutionem, geminam
 me uiam uacuationis proponere noſtis.
 Per ſanguinis quidem miſſionem, ſi in-
 uictus ratione fuerint intemperātes: ci-
 tra hanc, ſi temperātes. Licet enim &
 frictione multa, & balneis, & ambula-
 tionibus, alijsq; motibus, ad hæc unctio-
 nibus diſcutientibus, celeriter plenitudi-
 nem uacuare, modò tibi haud uideatur
 nonnūquam craſſi ſanguinis eſſe redun-
 dantia. Talis eſt maximè melācholicus,
 ut plurimū, ſanguis: rarò uerò crudorū
 uocatorū humorū. Atqui in melācholi-
 ca nominata redundantia ſanguinē mit-
 tere præſtat, aut omnino medicamento
 nigros humores purgāte uti. Crudis au-
 tem humoribus abundātibus, antequam
 egrotare incœperint, cautè uacuabis.
 Vbi uerò iam febricitant, ut antea dixi,
 nequaquam. Cæterum eorundem notam
 habe

habebis tum plumbeū colorē, aut ex pal-
lido albū, omniq; magis quā rubrū,
& pulsum inaequalitatē. Si uerò ad-
modum creuerit eiusmodi plenitudo, e-
tiam grauitas illis adest, & ad motus
pigritia, mentisq; tarditas, & sensuum
hebetudo. Contra uerò quibus ex reten-
tis haemorrhoidibus coaceruatus san-
guis fuerit, ijs audacter sanguinem mit-
tes, etiam si antea magnum morbum ex-
perti non sunt. fieri enim potest ut apti
sint ad eiusmodi aliquem, ceterum pro-
pter haemorrhoidum uacuationem non
dum perpeffi. Quod si uerò, aliqua il-
lorum partes prauam sortitae sunt stru-
cturā, potissimum quae in thorace sunt,
omnino eis celeriter sanguinem mittes.

COMMENTARIUS.

Hoc in capite Galenus quaestionē Nū si ple-
mouet, num homini solita negotia ad- nitudinis
huc obeunti sit mittendus sanguis si ple- nota appa-
nitudinis notae apparuerint, aut nō mit ruerunt ho-
tendus nisi magni, alicuius morbi futu- nini solita
ri sit suspicio? Et respondet quidem, ijs adhuc ne-

gotia obe- quibus adsunt plenitudinis notæ, & su-
unti, sit spicio est futuri alicuius morbi magni
mittendus etiã si adhuc obeunt solita negotia, mo-
sanguis. dō vires, & ætatis ratio permittant, esse
Idonea ad semper detrahendum sanguinē, ut nimi-
sanguinis rum hac ratione caueamus ne morbos
spuitionē qui è plenitudine nasci consueuerunt
thoracis sequantur. Sic se multos liberasse à po-
structura. dagra, articulorum doloribus, comitia-
 li morbo, melancholia, sanguinis sputo,
 per sanguinis missionē in tempore ad-
 hibitam ait. Idoneam autem structurā
 thoracis ad sanguinis spuitionem for-
 tiūtur quibus thorax angustus est. Quip-
 pe ij leuissima de causa ruptionis ve-
 narum quæ sunt in instrumentis respi-
 rationi seruientibus periculum incidūt.
 Et in omnibus qui prædictis morbis, &
 alijs etiam quos commemorat, angina
 nimirū, vertigine, pleuritide, peripneu-
 monia, hæpatitide, & ophthalmia seu
 lippitudine crebrō corripuntur, neces-
 sarium est ut sanguis confestim mitta-
 tur, viribus tamen & ætate antea confi-
 deratis. Quodd si etiam non adijcitur
 manifestē, subaudiendum tamen perpe-
 tuū erit. Cæterū si plenitudinis signa
 appar

appareant, nulla tamen morbi futuri suspicio est, quòd scilicet nihil tale unquam antea perpeſſi ſint, & omniũ corporis partium inculpatam habeant conſtitutionem, tunc quidem vacuandum, atqui nõ ſemper, vt in priori hypotheſi, per ſanguinis miſſionẽ. Per ſanguinis quidem miſſionem, vbi in victu fuerint intemperantes. Ita enim fit vt ex intemperantia magnã humorum plenitudinẽ coaceruent, quã nullo alio præſidio cõmodius quã per venæ ſectiõnẽ vacuari poteſt. Quòd ſi verò in victu non ita intemperantes fuerint, leuiora remedia uſurpanda erũt, vt ſunt frictio multa, balnea, ambulationes, alijquẽ motus, & vnctiões diſcutientes. Hęc enim celeriter plenitudinem exhauriunt, quẽ admodum Galenus lib. 4. Ther. metho. cap. 6. in hunc ſcribens modũ teſtatur: Nam, inquit, & alia ratione ſi quis etiãnum ſanus, nec adhuc quicquã læſus in Plethorico concurſu ſit poſitus, non ſtatim huic mitti ſanguinẽ eſt neceſſe: imò alij ſatisfacit inedia, alij cibi parcitas, alij ſoluta aluus, vel purgatio, vel frequentius balneum, alij ſola exercitatio,

consistit, ac odoris grauitate & lentore caret. Differtq; à pituita, vt quę frigida quidē est, non tamen crassa, vipote multa humiditate referta. Crudis itaq; humoribus abundantibus antequam egrotare cœperint cautē ac sollicitē vacuandum erit. Nam cōsiderandum tum erit num crudi humores copiosi sūt & bonus sanguis exiguus, aut contrā humores crudi exigui, bonus verò sanguis copiosus. Denique an crudi humores sint duntaxat in venis primis, aut habitu totius corporis, quēadmodum dilertē & copiosē Galenus libro 4 de Tuenda Sanit. capite 4. & sequentibus monstrat. Porro vbi iam homines febricitare cœperint, nequaquam vacuandum erit, vt suprà, capite nimirum sexto, dictū est. Vt autem medico perspectū planē sit quādo crudi humores in corpore abundēt, eius rei signa certissima recenset, calorem nimirum corporis plumbeum, aut ex pallido album: omnia enim potius alia quā rubeum colorem in hoc corpore conspicias, & pulsuū inēqualitatem, vt loco iam citato est commemoratum. Et si admodum plenitudo cru-

*Redundā
tis in cor-
pore humo-
ris signa.*

dorum humorū creuerit, grauitas quoque prædictis notis accedit, ad motum pigritia, mentis tarditas, & sensuum hebetudo. Hæc enim omnia symptomata cruditatē magnam sequi necesse est. Cæterum si ex retentis hæmorroidibus sanguis coaceruatus est, tūc iterum, id quæ audacter, sanguinem mittere oportet, etiam si antea magnum morbum nō inciderunt. Nam fieri potuit vt ad eiusmodi aliquem sint apti, tamen propter hæmorroidum vacationem hunc nō dum sint perpeſsi. Quippe hæmorrhoidū profluxus à varijs & multis morbis homines tuetur. quemadmodū testatur Hippocrates, qui libr. 6. Epid. par. 3. Aph. 9. in hunc modum scribit: Habentes, inquit, hæmorroidas neque laterum dolore, neque pulmonis inflammatione, neque depascenti vlcere, neque furunculis, neque terminthis, pariter neque lepra, neque alphis corripuntur. Hæc ille. Quod si aliquæ illorum quibus hæmorrhoides retentæ sunt partes prauam stricturam sortitæ sunt, potissimum hæc quæ sunt in thorace, omnino celeriter ijs sanguis mittendus erit, anteq

*Hæmor-
rroidū pro
fluuij com
moditas.*

antequam scilicet sanguis aceruatus in aliquam illorum partium irruat, illicq; morbū pariat grauem & periculosum. Vniuersę enim corporis partes, vt antea est demonstratum, sua superuacua ad partes imbecilliores deponunt.

CAPVT XI.

IDEM me sentire nostis etiam de mulieribus quibus menstrua est suppressa purgatio. Neque enim in ijs prorogare uacuationem oportet, quanquam uenam incidere non est necesse. Nam malleorum scarificationes ad uacuandum superuacuum sufficere possunt, quę et aliud habent commodum, nempe quod mensium motum concitant, quemadmodum etiam in malleolis & poplitibus sectę uenę. Quippe plenitudines à retentis menstruis natas, ex cruribus omnino uacuabis, siue uenam incidere, siue scarificare oporteat. Sanguinis enim ex gibbere missio, purgationes mulieres reuellere consuevit. Ceterū quę inter mulieres candidiores sunt, hæ san-

guinem magis tenuē coaceruare solēt: quapropter malleolorū scarification. maximē iuuantur. Atque nigriores sunt, secta uena curato: crassiorem enim & magis melancholicū sanguinē congregāt. Idq; magis etiā si magnas habuerint uenas. Hoc autē gracilioribus et nigrioribus accidit. Obesīs uerō & candidis, exiguae sunt uenae. In ijs quidem malleos scarificare praestat, quā uenā incidere. Nam uenas in cruribus hae exiguas habent. Proinde si etiam probē incidātur, mediocris tñ profluit sanguis.

COMMENTARIUS.

Quomodo in suppressis mēsisibus sit uacuandum. QVVM suprà Galenus exposuisset quid medico faciendū sit si ex retentis hæmorrhoidibus sanguis est coaceruatus, nempe audacter sanguinem esse mittēdum: nunc quomodo in suppressis mēsisibus sit vacuandum docet. Non esse autem in mulieribus quibus menstrua purgatio retenta est prorogandā vacationem, inquit, non tamen necesse esse venam semper incidere. Quippe vacuatio ea quæ fit per malleolorū scarifica

ficationē interdū sufficit ad id quod
 peruacuum est educendum, neque o-
 us est ex vena mittere sanguinē. Id ve-
 accidit vbi superuacua exigua fuerint
 æterū malleoli, Græci σφυρά vocāt, *Malleoli.*
 tuti extremæ & imæ ab utroq; latere
 biæ fibulæq; processuum partes, gib-
 e quidem & omninò exteriore parte
 ne vacantes, intrinsecus verò cauæ.
 os multi interpretum Galeni, veluti *Galenī in-*
 oruarius, & alij quidā falsò talos no- *terpretum*
 inant, qui Græcis propria voce ἀσπρά- *erratum.*
 xoi dicuntur. Sic passim multis anato-
 es, quæ ab omnibus propemodū con-
 mnitur, ignoratio imponit, varijsq;e
 roribus inuoluit. Mirum verò est tan-
 m, si Dijs placet, leonem in tantilla re
 m turpiter labi posse. Porro scari-
 catio malleolorum non tantū quæ
 dundāt educit, sed & mensium motū
 ncitant. Adeoq; non secus atque vene
 uæ in malleolis & poplitibus secātur,
 enstrua ciunt. Poples autem posterior *Poples.*
 enu pars est. Eius autem vena propter
 irurgorum imperitiam hodie incidi *Plenitudi-*
 esijt. Quocirca generale hoc præceptū *nes à sup-*
 t omnes plenitudines à suppressis mē *preßis mē-*

Sibus orta sibus ortas à cruribus esse vacuandas, si-
à cruribus ue vena sit incidenda, siue malleoli sca-
uacuanda. rificandi. Quippe sanguis ex gibbero
Gibberus. missus, purgationes menstruas fursum
 reuellit. Vt etiam lib. 2. ad Glauconem,
 cap. 7. & lib. 5. Ther. metho. cap. 3. Gale-
 nus copiosius ostendit. Est autem gib-
 berus processus posterior, & inferior vl-
 ne, quem Athenienses ὠλέκρανον, alij ve-
 rò Græci, Hippocrates præsertim & Ga-
 lenus ἀγκῶνα nominant. Interpretes Ga-
 leni non sine multa cōfusione legentiū,
 cubitū, cōuertunt. Quum itaq; menses
 retinentur vel crura sunt scarificāda, vel
Mulieribus candi- ex iisdem sanguis mittendus. Mulieri-
bus candidis crura bus autem candidis crura sunt scarificā-
scarificanda. da, propterea quòd sanguinem tenuem
 coaceruare solent, qui facilè per scarifi-
 cationes reduci potest. Quocirca illis
 maximè iuantur. Contrà nigrioribus,
 quia crassiore magisq; melancholicū
 sanguinē acervant, qui per scarificatio-
 nes educi haud potest, vena potius inci-
 denda, eaq; in cruribus erit. Hoc autem
 eo magis faciendum erit, quo maiores
Quæ mulieres maio- res habuerint. Habent autem maio-
res uenas habeant. res ceteris uenas quæ sunt graciliores &
 nigrio

griores. Contrà quę obese & cãdide,
 riguas. Hinc est quod lib. 2. de Téper.
 ap. 5. Galenus ita scriptum reliquerit:
 Quibuscunq; ait, latiores venę sunt, hi
 alidiores natura sunt. Quibus angu-
 iores, contrà magis frigidi. Caloris
 anq; opus est has dilatare, & extende-
 e. Ita rationabiliter in idem ferè reci-
 lit venarum angustia cum habitu pin-
 gui, & crassiore, habitus gracilis cū ve-
 narū amplitudine. Hęc ille. Obesas au-
 tem hoc loco diximus quę Calenus *ὑ-
 σάρκους*. Quippe *ὑσάρκους* vox apud Ga- *Obesæ*
 lenum & Hippocratem duo significat, *quæ*
 nempe obesum, & interdum etiam me- *ὑσάρκους*.
 diocri corporis habitu præditum, quem
 admodum multis exemplis id ipsum mō
 strauimus in nostris in Hippocratis A-
 phorismos commentarijs, in explicatio-
 ne nimirum Aphorismi septimi, sectio-
 nis quartę. Obesis igitur præstat malleo
 los scarificare, quàm venas incidere,
 quòd scilicet has ipsas in cruribus val-
 de exiguas habeant. Proinde si rectè e-
 tiam à medico inciduntur, tamen san-
 guis ne quidem mediocriter, propter ea-
 rundem angustiam, profluet.

Ceterum haud oportet nos contem-
nere sanguinis missionem ac si esset au-
xilium minimè reuulsorium, quum me
sepenumerò conspexeritis in sangui-
nis è naribus eruptione uehementi eo
remedio usum esse, & repentè effluxū
sedasse. Conuenit autem, uti uidiſtis, non
expectare donec ad extremum imbe-
cillitatis uires perueniant, sed ubi quod
moderatum est iam uacuatum esse uide-
tur, prorumpentisq; sanguinis impe-
tus ualidus permanet, secare in gibbero
uenam conuenit, dextra quidē nare san-
guinem profundente è dextra manu, al-
tera autem, è sinistra. Simul uerò cum
hæc agis, artubus iniicito uincula ex fa-
scijs, aut lanis: & hypochondrio quod
è directo supponitur cucurbitam affigi-
to. Hæc enim & nos quū faceremus, ut
noſtis, semper erumpentem ex naribus
sanguinem compescuimus, quum antea
experiremur medicamenta quæ scribūt
naribus esse inferenda, & fronti illinen-
da omnia infirma esse. Proinde ad ea
quæ

que suprà de sanguinis missione dicta sunt, & hoc quoq; rationem Menodoti conuincit, putantis plethoricam nominatam syndromen remedij nos admone re. Nam affectus qui nunc expositus est, plethoricæ syndromæ planè contrarius est. Vsurpamus autem in eo uenæ sectionem, non ut uacuatorium, sed ut reuulsorium præsidium.

COMMENTARIUS.

VENÆ sectionem esse reuulsorium remediū hoc in loco Galenus ostendit, adeoq; hortatur ne sanguinis missione tanquam præsidium quod in contrariū reuellere non possit contemnamus. Reuulsorium autem esse remedium venæ sectionem, sanguinis è naribus eruptio manifestissimè conuincit, vt quam sæpe numero repentè sedauerit. Quod certè efficere nunquam potuisset, si non in contrarium sanguinis impetum avertisset. Ceterum hîc animaduertendum erit non quouis tempore ijs quorum è naribus sanguis erumpit venam esse secandam, neq; enim tum quum iam ad

Venæ sectionio reuulsorium remedium.

Quando in profluvio sanguinis narium uena sit secanda.

extremū imbecillitatis vires illorū per-
 uenerint, sed tum potius vbi id quod iā
 vacuatum est non multū, & moderatū
 est, & vbi impetus prorumpentis sangui-
 nis adhuc validus & in gibbero venam
 incidere oportet. Neq; etiam quauis ex
 parte corporis sanguis est detrahendus:
 verū si ex dextra nare sanguis effluit, è
 dextra manu: sin ex sinistra, ex altera
 sanguis mittendus. Quæ singula clarius
 lib. 5. Ther. meth. cap. 3. Gale. docuit, in
 eum scribens modum: Quum è nari-
 bus sanguis erumpit, si æger adhuc reso-
 lutus non est, vena etiam in gibbero in-
 cidenda est qui profusioni è directo re-
 spondet. Vbi paululū, detraxeris, mox
 vnam horam intermittens, rursus detra-
 hes, pòst iterum atq; iterum pro laborā-
 tis viribus. Hæc ille. Porro quum hoc
 agis, simul etiam artubus, hoc est, mani-
 bus & pedibus iniijcito vincula, ex fa-
 scijs, aut lanis. Nam, vt loco iam citato
 Galenus ait, vincula valentius adducta,
 ijs quæ ad contrarium reuellunt reme-
 dijs adnumerantur. Porro vbi nos con-
 uertimus fascijs, Græcè enim est ταινίωμ,
 hic alius interpret ineptè admodū can-
 nabe

*Artuum
 uincula re-
 uellunt.*

*Gaudani
 erratum.*

nabe reddidit. Denique hypocondrio quod è directo supponitur cucurbitulas etiam affligere oportet. Quod clarior Galenus loco iam sæpius citato ijs verbis significavit: Eandem, inquit, ob causam quum è naribus sanguis erumpit, eum retinent maximæ in hypocondrijs defixæ cucurbitæ. Infigendæ autè sunt si ex dextra nare profluit sanguis, super iocinore: sui ex sinistra, super lie-
ne: si ab utraq; nare, super utroque sunt imponendæ viscere. Hæc quidem præsidia Galenus ad sanguinem erumpentem è naribus compescendum esse efficacia experiëntia cognovit, quum interim ea quæ naribus inseruntur, & fronti illinuntur omnia infirma essent, nec sanguinis erupentis impetum cohibere possent. Et ex hoc etiam loco ratio Menodoti, putantis plethoricam syndromen nos sanguinis missionis admonere, conuincitur. Nā affectus de quo iam diximus, nempe profluuium sanguinis è naribus plethoricæ syndromæ planè contrarius est. Quippe hæc ipsa ex retentis excrementis & superuacuis generatur. In sanguinis aut eruptione illa potius, & uti-

*Menodoti
ratio ut cō
uincatur.*

lia quoq; vbi inualuerit, vacuatur. Quapropter si nunquam nisi plethorica presente sanguis mittendus esset, ut Menodotus censuit, certe hoc affectu venæ sectioni locus haud esset, quum tamen plurimum illi cōferre & ratio & experientia testantur. Ut hinc labefactari Menodoti rationē omnibus sit perspicuū. Cæ-

Venæ sectione in profluuiio sanguinis ut reuulsorio præsidio utitur. terum in profluuiio sanguinis venæ sectionē usurpamus, atqui non ut vacuationū: neque enim vacuationem hoc malum indicat: sed ut reuulsoriū præsidium. Quocirca quum reuellere & in contrarium agere queat venæ sectio, non est temere, ut nonnulli factitarūt, cōtemnenda.

CAPVT XII.

Quantitas cuiusque præsidij artem coniectricem facit. **N**ihil æquè medicam artem in suis actionibus coniectricem efficit, atq; cuiusq; remedij quātitas. Quippe quum frequenter exquisitè sciamus tempus instare exhibendi aut cibi, aut potus, eiusq; aut calidi, aut frigidi: tamen quantū dandū sit, certò haud nouimus. Idem in purgantibus etiam medicamentis usuuenit. Nam quòd egrotati præb

præbendum sit medicamentum quod aut bilem flauam, aut atram, aut pituitam, aut serosa excrementa uacuet, exquisitò nouimus, cæterùm quântum dari oporteat ignoramus.

COMMENTARIUS.

DOCET hoc loco Galenus quid artem medicã, maximè coniectricẽ faciat, nempe cuiusq; remedij quantitas. Nã et si cõpertũ habemus tempus exhibendi cibi aut potus, eiusq; calidi aut frigidi instare, tamen quantũ dandum sit, certò scire non possumus. Sic sæpe accidit ut exquisitè noscamus dandum esse medicamẽtũ purgãs aut bilem flauam, aut atrã, aut pituitã, aut serosos humores, tamẽ quantũ eius dari oporteat, nescimus. Hinc est quòd lib. 3. Ther. meth. ca. 3. ita scriptũ reliquit Galenus: Nulla est, inquit, in arte medica nec res, nec medela quę specie dicibilibis nõ sit: sed quòd nec dici, nec scribi, nec omninò percipi potest, id quantitas in vnoquoq; particulari est. Et lib. 1. ad Glauco. cap. 8. ait: Singulorum quantitas nec scribi, nec scribi verbis vllò modo explicari potest. Proinde autem medicam coniectricẽ facit

Quantitas

nec dici,

nec scribi

potest.

lia quoq; vbi inualuerit, vacuatur. Quapropter si nunquam nisi plethorica presente sanguis mittendus esset, ut Menodotus censuit, certe hoc affectu venæ sectioni locus haud esset, quum tamen plurimum illi cōferre & ratio & experientia testantur. Ut hinc labefactari Menodoti rationē omnibus sit perspicuum. Cæ-

Venæ sectione in profluuiio sanguinis ut reuulsorio præsidio utitur. terum in profluuiio sanguinis venæ sectionē usurpamus, atqui non ut vacuatoriū: neq; enim vacuationem hoc malum indicat: sed ut reuulsoriū præsidium. Quocirca quum reuellere & in contrarium agere queat venæ sectio, non est temere, ut nonnulli factitarunt, cōtemnenda.

CAPVT XII.

Quantitas cuiusque præsidij artem coniectricem facit. **N**ihil æquè medicam artem in suis actionibus coniectricem efficit, atq; cuiusq; remedij quantitas. Quippe quum frequenter exquisitè sciamus tempus instare exhibendi aut cibi, aut potus, eiusq; aut calidi, aut frigidi: tamen quantum dandum sit, certò haud nouimus. Idem in purgantibus etiam medicamentis usuuenit. Nam quòd egrotanti præb

præbendum sit medicamentum quod aut bilem flauam, aut atram, aut pituitam, aut serosa excrementa uacuet, exquisitò nouimus, cæterùm quântum dari oporteat ignoramus.

COMMENTARIUS.

DOCET hoc loco Galenus quid artem medicã, maximè coniectricẽ faciat, nempe cuiusq; remedij quantitas. Nã etsi cõpertũ habemus tempus exhibendi cibi aut potus, eiusq; calidi aut frigidi instare, tamen quantũ dandum sit, certò scire non possumus. Sic sæpe accidit vt exquisitè noscamus dandum esse medicamētũ purgãs aut bilem flauam, aut atrã, aut pituitã, aut serosos humores, tamẽ quantũ eius dari oporteat, ne scimus. Hinc est quòd lib. 3. Ther. meth. ca. 3. ita scriptũ reliquit Galenus: Nulla est, inq̃t, in arte medica nec res, nec melada quẽ specie dicibilibis nõ sit: sed quòd nec dici, nec scribi, nec omninò percipi potest, id quantitas in vnoquoq; particulari est. Et lib. 1. ad Glauco. cap. 8. ait: Singulorum quantitas nec scribi, nec verbis vllò modo explicari potest. Proinde autem medicam coniectricẽ facit

Quantitas

nec dici,

nec scribi

potest.

*Medicina
cur ars cō=
iectrix.*

in primis cuiusq; remedij quantitas, deinde etiam actiones medentium & operæ. Hæ siquidem incertum euentum habent. Quapropter quum cuiusq; remedij quantitas exquisitè sciri non queat, neq; etiã finis medicæ artis semper attingatur, ideò ipsa coniectrix appellatur. Minimè autem propter ipsius præcepta, quæ certè sunt perpetua, firma & stabilia, vt copiosius Galenus in libro de optima secta, ad Thrasibulũ, ostēdit.

Verũ quod ita datũ est correctio=ne subinde nullã admittit. Nã quod semel in uētre ingestũ est medicatũ, quominus totũ deuoratũ sit fieri nõ potest: neq; licet ubi plus iusto iã purgatur homo partẽ eius quod oblatũ est auferre. At in sanguinis missione maximũ id bonum est, uacuationẽ ubi uoles posse sistere, ac rursus quo utiq; placuerit tempore, iterũ ut fluat pmittere, quoad rectè tibi habere uideatur. Quocirca præstat, si nihil urgeat, priã detractiõe parcius facta, iterũ auferre, imò si uolueris etiã tertio. In qbus igitur multa uacuatione

tione est opus, vires autē sunt imbeciliores, in ijs uacuationē recōdere cōuenit, quemadmodū nimirum & me in ijs qui crudorū humorū copia laborabant facere conspexistis. Nā pauco sanguine uacuato, protinus mulsam probē cōctā cum extenuantiū medicamentorū quopiam, aut hyssopo, aut origano, & nōnunquā calamintha, aut pulegio exhibeo: aut cū mulsā oxymeli, aut oxyglycy. Deinceps rursū sanguinē aufero, interdū quidē eodē die, interdū uerō postero, in quo rursū similiter praedictorum medicamentorū quodpiā exhibēs, iterum sanguinē detraho, ac tertio die similiter bis.

COMMENTARIUS.

VENAE sectionē purgationi, alijsq; *Vena se-*
 praesidijs hoc loco Galenus p̄fert, quōd *atio purga*
 scilicet purgatoria medicamēta, aliaq; *tionis pra-*
 remedia data nullā correctionē admit- *fertur.*
 tant. Quod enim semel est in ventrem
 ingestum medicamentū, quo minus totū
 sit haustū fieri non pōt. Neq; vbi plus
 iusto ab assumpto medicamento purga-

ἀμειύεσθαι, hoc est, recondere, aut in futu ταμειύεσθαι
 rum reponere oportet: neq; enim satis
 huius verbi proprietas Latinis verbis
 exprimi potest. Hoc est, non semel vni-
 uersum vacuare cōuenit, sed aliquid re-
 condendū ac relinquendū in corpore,
 quod in futurū & deinceps vacuetur. In
 ijs igitur in quibus crudorū humorum
 copia est, quandoquidē vires parū robu-
 stas habeant, vt suprà capite sexto est cō-
 memoratum, sanguis vitiosus non vna
vice vniuersus vacuandus erit, sed pri-
mū exiguo admodū detractō, deinceps
multum in qua hyslopū, origanū, cala-
mintha, pulegiū, & alia medicamēta quī
bus extenuādi crassos humores facultas
inest decocta sunt, dare oportet. Aut cū
 mulsā oxymeli exhibendū, quorū utrūq;
 in crassis & glutinosis attenuādis mirā
 efficaciam obtinet, quemadmodū Ga-
 lenus lib. 4. de Tuendā sanitate, cap. 4.
 & sequentibus aliquot, vbi ex pro-
 fesso de crudis humoribus agit, copio-
 sius docet. Neque alienum ab insti-
 tuto hoc erit, si quis cum mulsā oxy-
 glycy exhibeat. Est autem ὀξυγλυκὺ Græc ὀξυγλυκὺ.
 cis vox composita, nihilq; nisi acetum

dulce aut mustum significans, perinde atq; *ὄξύμειλι*, acetum mulsu. Componitur autem oxyglycy ex musco & aceto, adiecta etiam interdum aqua potabili cocta, veluti est apud Constantinū lib. 8. de Rustica. cap. 35. Nisi quis oxyglycy esse mixtionem quandam ex aceto & vino passo, quod Græcis *γλυκὺ* dicitur, contendat, quod tamen parum retulerit. Siue enim ex musto & aceto, siue ex passo & aceto mixturam intelligas oxyglycy, acetum dulce erit. Quippe etiam passum vinum est dulce, quod ex palsis solum vuis, & diutius in vite adu- stis fit. Cæterum post extenuatum me- dicamentorū vsum iterum sanguis aue- rendus erit, interdum eodem, interdum postero die. In quo tamen ante sanguinis detractionem rursus aliquid incidētium & extenuantium medicamentorū, de quibus plura Galenus in li. de Extenuante victu tradit, præbendum. Quod etiam die tertio, in quo similiter sanguis detrahatur, faciendum erit.

Porro ubi seruētis sanguinis copias, acutissimā accēdens febrē, meritis, cōfer-
tim

tim uacuare expedit, eamq; usq; ad animi deliquium educere tentandum, uirium inspecto robore. Proinde noui quibusdam sex detractas esse cotylas confestim, nempe secundo uel tertio, uel quarto die : nonnunquam primo quoq; die, quum febris noctis initio coepisset, aut medio, ac quæ pridie comederant rectè fuissent cōcocta. Quibusdam autem pridie inæqualitatem, aut sudorem, aut capitis dolorem, aut alterius cuiuspiam partis se sentire querentibus, ac propterea parcè uictitantibus, febricitare autem præcedente nocte incipientibus, primò die desinente sanguinem me detraxisse memini. In quibus enim tibi feruentis sanguinis copia apparet, quàm ocysimè ipsum uacuare cōnator, priusquam in principem aliquam partem cum impetu decumbat. Quocirca nec per noctem nonnunquam incidere uenam contēris. Quippe ridiculum est quod quidam faciunt à secunda diei hora ad quintam

aut sextam solummodo sanguinem mit-
tentes, alio autem nullo tempore: quos
nisi clysteribus, cibi oblatione, alijsq;
remedijs quocunq; tempore noctis uti
conspexissem, grauiter utiq; in eos in-
ueherer. Quum uerò omnia agunt non
præfinito horarum numero uno, & in
omnibus morbis communi, sed ut malū
utiq; iubet, in sola missione sanguinis
prædictum modò tempus semper ob-
seruant, maximè tolerabile est illorum
erratū. Sic itaq; affectis ægrotis, ut di-
ximus, ad animi usq; defectionem san-
guinem detrahere conuenit. Non enim
quosdam illorum ex animi deliquio ne-
cessariò esse refrigeratos, ac toto cor-
pore succedentibus madoribus alio so-
luta, celeriter morbo liberatos.

COMMENTARIUS.

In acutissi- In acutissimis febribus sanguinē usq;
mis febre- ad animi defectionē esse mittendū hoc
bus san- loco Galenus hortatur. Quod etiā facit
guis ad ani sectione 1. Aphoris. cōmentario 23, ubi
mi usq; de- ita scriptū reliquit: Ea igitur quæ fit ani-
fectionem mi defectio vacationis ratione nūc ab

Hippocrate dicta est, quòd sit mensura *mittendus.*
 vacuationis & in maximis inflàmatio-
 nibus, & in adurétibus febribus, & vehe-
 méntissimis doloribus. Hæc ille. In præ-
 sentia itaq; ait: Porro vbi feruétis sangui-
 nis copia acutissimã febrẽ accedit, con-
 fertim, hoc est vniuersim, nõ sensim & *Cõfertim.*
 paulatim, vacuare, atq; hanc sanguinis
 copiã vsq; ad animi defectionẽ educe-
 re conuenit. Et animaduertendum hoc
 loco Galenũ loq de ea vacuatione quæ
 animi defectionẽ affert & includit, ac
 minimè de ea quæ hãc ipsam excludit,
 quod nõnulli putãt. Id quod alius Ga-
 leni locus qui est in lib. 9. Ther. metho.
 cap. 4. manifestissimè euincit. Ibidẽ e.ñ
 sic scribit: Aufero itaq; ab hoĩe eousq;
 dei industria sanguinem quoad ani-
 mo linqueretur, ὡς λειποθυμία, ἵνα γε-
 νῆσθαι, vt animi deliquium succederet.
 Itẽ paulò pòst inquit: Noui ex ijs quos-
 dam necessario ἐπὶ τῇ λειποθυμίᾳ, ex
 animo deliquio refrigerates. Quæ iti-
 dem verba disertè docent eos animi
 defectionẽ incidisse, ita vt minimè di-
 cere liceat hanc fuisse exclusam. Verũm
 vbi eousq; vacuare voluerimus, virium *Quando ad*
 robur

animi def robur diligenter inspiciendū erit. Hinc
tionē mit loco paulò antè citato Galenus hanc
tendus san ipsam vacuationem quæ ad animi deli-
guis. quiū sit maximū planè, vbi valētes vires

sunt, cōtinentis febris esse remediū scri-
 bit. Quocirca in virium imbecillitate
 huic vacuationi locus reliquus non est.

Cotyla du
plex.

Attica.

Italica.

Quod dixit, Galen. exēplo, cōfirmat, se
 nouisse quosdā, inquiēs, quibus confe-
 stim sex detractæ sint cotylæ. Veteribus
 aut duplex fuit cotyla, quod alibi quo-
 que mōstrauimus, attica & italica. Atti-
 cavnicias mēsurales nouē, pōderales aut
 septē cum dimidia capiebat. Italica aut
 non fuit nisi libra mēsuralis, hoc est vn-
 ciæ mensurales duodecim, quod in no-
 stris annotationibus in quartū Gale. de
 Sanit. tuen. librū cōscriptis exēplis ali-
 quot ostendimus. Siue igitur atticā, siue
 italicā intelligamus in præsentiariū co-
 tylā, certè magna fuit eius quæ Galenus
 detraxit sanguinis copia. Quippe sex co-
 tylæ atticæ faciūt libras quatuor & se-
 missem. Italicæ verò, sex libras mēsur-
 ales. Ea autē copia, vt diximus, cōfestim
 fuit detracta, hoc est secūdo, vel tertio,
 vel quarto die: nonnunquā etiā primo,
 quum

quū scilicet febris initio noctis, aut media nocte cœpisset, ac quę pridie comederāt probè fuissent cōcocta: neq; enim crudis adhuc cibus in ventriculo existētibus, temere sanguis detrahi debet, ne scilicet crudi adhuc cibi ac parum rectē cocti rapiantur in venas, ac subinde in totū corporis habitū, Nonnullis autem qui pridie inēqualitatē, aut sudorē, aut capitis alteriūsve alicuius partis dolorē causabantur, ac propterea parcē comedebāt, febricitate verò pręcedēte nocte cœperūt, primo etiam die detractus est sanguis. Cuius quidē rei rationē Galenus hāc subiungit. Nisi enim feruentis sanguinis copia ocysimē vacuetur, metus est ne in partē aliquā principē cum impetu decūbat. Cæterū animaduertēdum hoc loco erit inēqualitatē, cuius paulò antè meminit Galen⁹, nihil aliud esse quā molestę cuiuspiā in nobis rei sensum, quo à nostra ipsorū natura immutatos nos esse conijcere possumus. Quippe tūc quidpiam in corpore sentimus à nobis prorsus alienū, quod tamē quale sit, haudquaquā satis exprimere possumus, vt copiosē admodū Galenus

cap.

*Crudis ad
huc cibi in
uentriculo
existenti-
bus sanguis
haud detra-
hendus,*

*Inaquali-
tas quid,*

ca. 7. lib. I. secūdi de Symp. causis ostēdit.
 Porro quū propter causam suprà cōme-
 moratā citissimè sanguis vacuandus sit,
 ideo noctu etiā interdū vena incidēda
 erit. Nec certè hac in parte ridicul^o quo
 rūdā error ne minus idipsum faciamus
 nos impediāt, qui à secūda diei hora ad
 quintā aut sextā vsq;,, sequentibus verò
 nequaquam, tantū abest vt nocte ve-
 nam incidere velint, sanguinē tantū
 detrahunt. Nam si clysteribus, ciborum
 oblatione, alijsq; remedijs quocūq; tē-
 pore, ijsdem quoq; medicis cōsentien-
 tibus, vt liceat, quare nō etiam sangui-
 nis missione? neq; enim vlla diuersita-
 tis ratio apparet. Hi sanè si reliqua o-
 mnia præsidia præsinito vno horarum
 numero, & omnibus morbis cōmuni, et
 non vt malum quodq; iubet, adhibēda
 esse statuerent, certè magnam mererentur
 reprehensionem. Nunc quum in
 vno tantū præsidio, nempe venæ se-
 ctione, præsinitū tēpus obseruent, tole-
 rabilior eorundē est error. Porro quòd
 veteribus duplices fuerint horæ æqua-
 les, & inæquales, copiosè admodum in
 annotationibus nostris in librū quintū

*Nocte etiā
 interdum
 sanguis
 mittendus,*

Galenus de Tuen. sanat. diximus. Hoc in loco de inæqualibus loquitur, quippe citra adiectionem verbi ἰσημερίων de horis verba facit. Cur autem ijs qui feruentis sanguinis copia laborant, sanguis vsq; ad animi defectionem sit mittendus, iam exponit Galenus, eiusq; rei *Quare ijs qui feruentis affert causas, quarum prima qui ijs sanguinis copia dem est, quod post deliquium corporis nis copia habitus refrigeratur. Altera quod totius laborant corporis sudores succedant, Tertia quod sanguis alius sua subinde sponte solvatur, usq; ad animi adeoq; æger ijs rationibus à morbo liberi defeberetur. Harum quidem causarum meminit etiam Galenus comment. 23. sectione mittendus.*

nis primæ Aphorismorum, ubi in eum scribit modum: In ardentissimis febribus, si vsq; ad animi defectionem sanguis mittatur, statim totius corporis habitus refrigeratur, & febris extinguitur, & plurimis etiam alius citatur, & sudores emanant, et quidam eorum sanitati sunt restituti, alij adiuti plurimum, vehementiam morbi absciderunt. Et lib. 9. Ther. meth. cap. 4. Aufero, inquit, ab homine eousq; de industria sanguinem, quoad animo linqueretur; maximum planè vbi valentes vires sunt,

sunt, cōtinentis febris remediū, id quod
 tum ratione, tum experientia didici.
 Primum nanq; in contrarium statū agi
 tur corpus, celerrimè ex animi defectu
 refrigeratum. Hoc verò nemo inuenire
 potest, neq; quod ipsis ægris, neq; quod
 naturæ quæ animantes gubernat, iucū-
 dius vtiliusve sit. Postmodū in eiusmodi
 corporib⁹ necessariò superuenit alui
 deiectio, nonnunquam etiam bilis vo-
 mitio. Quas res statim à toto corpore
 madores sudoresve excipiunt.

Bonum itaq; est pulsuū imminu-
 tioni attentum esse, tangentibus nobis
 eos sanguine etiamnum fluente, quem-
 modum in omnibus alijs quibus sanguis
 mittitur facere sum solitus, ne aliquādo
 nobis nil tale opinantibus pro animi de-
 liquio mors succedat, quod tribus sanè
 accidisse medicis noui. Vnus eorum mu-
 lieri febricitāti uenam incidit. Aliorum
 uterq; uiro, sed ad tantam duxere animi
 defectionem, ut refici amplius haud po-
 tuerint. Quocirca præstat confertas
 has uacuationes uitare ac fugere, nisi
 magna

magna quædam necessitas ut id faciamus iubeat. Quinetiam reuulsio ipsa, non leue existens auxilium, per sanguinis quoq; missionem sæpius facta, quanto maiorem in numerum particulares auxeris detractiões, tanto efficacior fit. Hæc itaq; præscisse melius est.

COMMENTARIUS.

PRAECEPTA duo admodum vtilia hoc in loco Galenus tradit. Quorū primum in omni venæ sectione, potissimū verò in ea quæ ad animi sit deliquium obseruari debet, vt scilicet pulsum imminutioni diligenter attenti simus, ne aliquando nobis nihil tale suspicantibus pro animi defectiōe mors ingruat. Quocirca in omni venæ sectione, potissimum verò quando ad defectiōē vsq; animi extrahere sanguinē annitimur, pulsus tāgere medicum oportet: vt hinc virtutis robur & imbecillitatē rectè deprehendere queat. Neq; enim vitalis roboris firmitudinem aut imbecillitatem rectius quàm ex pulsu, qui cordis motū denuntiat, scire licebit. Vt autem huic

*Pulsum imminutio
ni diligen-
ter attētus
sic medicus*

*Confertur
vacuationes
cauenda,
nisi magna
necessitas
arguat.*

*Sanguinis
missio sæ-
pius itera-
ta effica-
cius reuel-
lit.*

præcepto attentiores simus, trium me-
dicorum errata nobis ob oculos ponit;
vt horum temeritate moti, quod alterū
præceptum est, caueamus confertas has
vacuationes, nisi magna quædam neces-
sitas nos eis vti coëgerit. Tum enim, vt
in cæteris omnibus necessitati parendū
erit. Meminit autem duorum postero-
rum etiam lib. 9. Ther. cap. 4. ijs quidem
verbis: Duos nanq; in ipsis medicorum
manibus perire vidi, qui postquam ani-
mo linquerentur, nunquam recuperati
sunt. Et quod non nisi urgente neces-
sitate sanguis confertim sit vacuandus;
hinc etiam colligi potest, quod remis-
sio ipsa, & ad contraria loca tractio,
non leue multis in morbis præfidiū exi-
stens, efficacior multo sit, si particula-
res sanguinis detractiones maiorem in
numerum auctæ fuerint. Ita enim natu-
ra toties irritata, per particulares has de-
tractiones sanguinis quæ ad partem ma-
lè affectam confluunt maiori cum im-
petu in contrarium locum reponere ac
detrudere assuescit. Vt hoc nomine ne-
cesse sit auersionem quæ per sanguinis
missionem sæpius iteratā sit, multo esse
præstan-

præstantiorem,quàm eam quæ confer-
tim fieri solet.

CAPVT XIII.

R VRSVM uerò ab initio ad pro-
positam nobis speculationem re-
uertentes exponamus quæ summè esse
necessaria ijs qui semper sanguinis mis-
sione citra noxam uti uolent comper-
tum habemus. Primum quidem omnium
scire oportet dum prædicti huius præ-
sidijs scopis augentur, maiorem indicari
uacuationem. Imminutis uerò, tātum de
quantitate uacuationis detrahendum,
quantum illi imminuti fuerint. Morbi
igitur magnitudo unā cum robore uir-
tutis primi mittendi sanguinis scopi
fuerunt, ille quidem quæ facere opor-
tet indicans, hic uerò tanquam illum
haud impediens, quod simul indicare
nonnulli recentiorum medicorum uo-
cant. Interdum enim affectus ipse san-
guinem mittendum esse iubet, uirium ue-
rò imbecillitas prohibet. Ambobus au-
tem ijsce scopis præsentibus, constat

quidem, ut dictū est antea, nullam plenitudinem crudorum humorum tantam talemq; esse, ut hoc remedium impedire queat. Deinceps autem considerandum erit quale sit hominis naturale temperamentum. Nam amplas habentes uenas, mediocriterq; graciles, & minimè candidos, neque tenera carne præditos, liberalius uacuabis: eos autem qui contra se habent, parcius. Quippe sanguinem exiguum habent, carnemq; facile transpirabilem. Hac igitur de causa neque pueris sanguinem mittes usq; ad decimumquartum ætatis sue annum. Post hunc uerò, si sanguis multus coaceruatus appareat, tempusq; anni uerum fuerit, & regio natura temperata, pueriq; natura sanguinea, sanguinē eo magis auferes, si uel peripneumonie, uel anginae, uel pleuritidis, aut alterius acuti ac uehementis morbi periculum immineat. Primum autem, ut plurimū, cotylam auferes. Quod si postea tibi uires expendenti ualidae permanere uideā

tur, dimidium eius iterata detractiōe,
 adiicies. Didicisti uerò uehementi pul-
 sui cum æqualitate, tanquam certo &
 minimè fallaci robustæ uirtutis signo
 fidendum esse, ex abundanti autem etiā
 magno. Proinde & septuagenarijs, præ-
 dictis pulsibus præsentibus, quando iu-
 bet affectus, sanguinem mittes. Sunt e-
 nim nonnulli etiam in hac ætate multi
 sanguinis, unā cum ualidis uiribus, sicut
 et alij sicci, & pauci sanguinis, facile-
 quē quacunq; corporis parte percussi
 nigrescentes. Itaq; non numero solum,
 quod quidam faciūt, animum aduer-
 tes, sed & corporis habitui. Nam sunt qui
 sexagesimo ætatis suæ anno sanguinis
 missionem non ferunt, quum septuage-
 narij ferant. Atqui minus ijs utiq; au-
 feres, etiam si eundem affectum quem
 florens corpus habere uideantur.

COMMENTARIUS.

REVERTITUR hoc loco Gale. Quæ co-
 nus ad institutū, exponitq; breuiter ad-
 modum quæ cognitu necessaria sint ijs cessaria.

sint ijs qui qui semper innoxie sanguinis missione
innoxie vti volunt. Principio autem considerā-
semper san dos esse monet duos sanguinis mitten-
guinis mis di præcipuos modos, an scilicet illi ipsi
sionenti aucti, aut imminuti sint. Si aucti enim
uolunt. fuerint, maiorem indicant vacuationē.

Primi mit Sin contrā imminuti, tantum de quan-
tendi san- titatis vacuatione detrahendum, hoc est
guinis sco tanto minus vacuandū erit, quanto præ-
pi. dicti scopi minores euaserint. Sunt ve-

rò primi mittendi sanguinis scopi, vt
dictum est capite nono, morbi magni-
tudo, & virium robur. Cæterum mor-
bi magnitudo quid faciendum sit in-
dicat, nempe sanguinem esse mitten-
dum, vt loco iam citato copiosè admo-
dum est demonstratum. Virium au-
tem robur scopum primum non impe-
dit, sed illū potius iuuat. Viribus enim
robustis, largius etiam vacuamus. Non
prohibere autem nonnulli iuniorum
medicorum ἀντιενδύκνυσθαι, hoc est si-
mul indicare vocant. Quippe ἀντι Græ-
cis interdū ꝑ simul vsurpatur. Sic li. i. de
Tuēda sanit. c. vlt. ἀντιδιήρηται idē quod
simul diuisa sunt significat. Porro acci-
dit interdū vt affect⁹ ipse sanguinē esse
mittend

ἀντιενδύ-
κνυσθαι.

mittendum iubeat, viriū verò imbecillitas, utpote quæ sanguinis detractiōe non fert, prohibeat. Si itaq; vires robustæ fuerint, simul cum affectu sanguinem esse mittendum indicabunt. Ambobus itaq; scopis præsentibus, hoc est morbo existente magno, & virtute valida, audacter sanguis mittendus erit. Si quidem manifestum est, tum nullā esse crudorum humorum tantā talemq; plenitudinem, quæ sanguinis inisiōe impedire queat. Si enim crudorū humorum copia subesset, virtutem esse robustam haud accideret. Nam, ut cap. 6. est comprehensum, robur Virtutis à copia *Robur uir* sa cruditate exoluitur. Deinceps ei qui *tutis & co-* citra noxam venæ sectione uti vult con *pioſæ cru-* siderandum erit quale sit hominis cui *ditate ex-* detrahendus sanguis erit naturale tem *oluitur.* peramentum, atq; aded ætas ipsa, quæ hoc ipsum immutat. Naturale autē temperamentum est, quod ex quatuor elementorum commixtione, quam naturam Hippocrates & Galenus vocant, nanciscimur. Hoc quidem ideo cognoscendum erit, quòd ex eo num omnino sit mittendus sanguis necne, & an co-

piosè etiam aut parcè mittendus sit co-
 gnoscitur. Amplas nanq; venas habètes,
 eo quòd Galenus l. 2. de Temper. cap. 3.
 attestante, calidiores natura sunt, calo-
 ris enim opus est dilatare & extendere,
 & sanguine multo abundant, largius va-
 cuandi sunt. Mediocriter etiam graci-
 les, quippe vt loco paulò antè citato
 Galenus testatur, habitus gracilis cū vt
 narum laxitate incidit. Quibus autem
 latæ sunt venæ, his copia sanguinis, vr
 ibidem ait Galenus, & citra noxam ve-
 næ sectionem tolerant. Non autem te-
 merè adiectū est, mediocriter graciles:
 si enim vehementer graciles fuerint,
 copiosè vacuandi nō sunt. Habent nāq;
 & illi sanguinē exiguū. Nulla enim al-
 lia de causā sic vehemēter graciles eua-
 serūt, quā quòd copia sanguinis, adeoq;
 alimēto destituti sunt. Quapropter qui
 hac ratione sunt graciles, ij non laxas,
 sed potius angustas venas habent. Sic
 eos quoq; qui non sunt candidi, sed flo-
 rido potius colore, neque carne tenera
 præditi, largius vacuare oportet nulla
 alia de causā, quā quòd sanguine abū-
 dent. Cōtrā candidos, & tenera carne
 prædit

præditos, eo quòd exiguum habeant san *Pueris us-*
 guinem, parcius vacuare conuenit. Hac *que ad 14.*
 igitur de causa, quia uidelicet carnē te. *annum san-*
 nerā, ac facilè perspirabilē obtinēt, pue- *guis non*
 ris vsq; ad decimumquartum annū san *mittendus.*
 guis mittendus non est. Hinc est quod
 lib. 9. Ther. meth. cap. vlt. sic scriptū reli-
 querit Galenus: Puerorum, inquit, sub-
 stantia omnium facillimè discutitur ac
 dissipatur, propterea quòd omnium est
 humidissima. Nullius verò quæ frigidis-
 sima existit. Quo minus vacuantis præ-
 fidij eget, quum habeat ex seipsa vnde
 naturaliter vacuetur. Post annum verò
 decimumquartum, si peripneumoniæ,
 pleuritidis, angine, aut alteri⁹ acuti mor-
 bi periculū instat, præsertim si sanguis
 copiosus in ijs coaceruatus sit, tempus
 anni vernum, atque adeò temperatum
 fuerit, regio itidem temperata, & pueri
 natura sanguinea, sanguis ijs audacter
 mittendus erit. Nam morbi vehemētia,
 & ægroti natura sanguinea, sanguinis
 missionem requirunt, tempus anni, & re-
 gio temperata, ad sanguinis detractio-
 nem sine noxa sustinendam aptissima
 sunt. Principio autem, vt summū, ex-

Cotyla trahenda erit *cotyla* vna, hoc est mensu-
rales vnciæ nouē, aut ponderales se-
 ptem cum dimidia, si Atticam intelli-
 gas *cotylam*. Aut vnciæ duodecim, si Ita-
 licam accipias. Quod si post eā sangui-
 nis detractionem vires adhuc validæ
 fuerint, dimidium eius, hoc est mensu-
 rales vncias quatuor, & drachmas qua-
 tuor, aut vncias tres ponderales cum di-
 midia, adijcies, detractione scilicet ite-
 rata. Vt autem medicus sciat quando vi-
 res adhuc validæ sint, signa eius rei è pul-
 su sumenda esse hortatur. Vehemēs enī
 pulsus cū equalitate, & ex abūdanti ma-
 gnus, minimè fallax robustarū viriū si-
 gnū est, quē admodū suprā cap. 9. & in
 lib. de Causis pulsuum, copiosè & lucu-
 lenter ostendit Galenus. Quod si ita
 in septuagenarijs iam dicta pulsuum si-
 gna appareant, modò id ipsum iubeat
 affectus, ijs sanguinē mittere nihil me-
 tues. Porro vt nonnulli in ea ætate con-
 stituti multi sanguinis, & viribus robu-
 sti: ita alij contrā sicci sunt, & pauci san-
 guinis, & in partibus corporis percussi
 facilè nigrescentes. Sic enim legendum,
 quum in Græco sit *μελαίνόμενοι*, non are-
 scentes,

*Signa ua-
 lida uirtu-
 tis è pulsu
 cognoscen-
 da.*

scentes, vt alius interpres conuertit, qui
 legit *μαραινόμενοι*. Quam quidē lectio-
 nem etiam antiquus confirmat inter-
 pres, qui hoc loco conuertit faciliē ni-
 grescētes. His sanē cūm exigui sint san- *Nigredo*
 guinis & frigidi, sanguis non erit mit. *in percus-*
 tendus. Nigredo enim quæ in percussis *sis & affli-*
 partibus apparet certum est paucitatis *ctis parti-*
 caloris natiui, adeoq; sanguinis, qui il- *bus quid si-*
 lius quasi materia est, vt suprā cap. 5. o- *gnificet.*
 stendimus, signum existit. Nigredinem *Non nume-*
 verò facultatis vitalis extinctionem in- *ro tantum*
 dicare Galenus etiam libr. 2. Prognost. *annorum,*
 comm. 8. testis est. Quapropter non nu- *sed & habi-*
 mero solūm annorum, vt nonnulli me- *tui corpo-*
 dicorū faciunt, sed etiam corporis ha- *ris attentū*
 bitui attentū esse oportet. Quippe sunt *esse opor-*
 qui sexagesimo ætatis suæ anno sangui- *et.*
 nis missionem ferre non possunt, quum *Seniori-*
 tamen sint subinde septuagenarij qui *bus minus*
 illam citra noxam ferant, quod scilicet *quām florē*
 habitus corporis eorū sit eiusmodi qui *tibus ata-*
 ad detractionem sanguinis est idoneus. *te sangui-*
 Vtrunq; verò senioribus, propter cor- *nis extra-*
 poris habitū interdum sanguinē mitte- *hendum.*
 re liceat, tamen semper illis, et si eodem
 affectu laborent, minus quā ætate

florentibus est auferendum; sanguinis: quodd scilicet virtus eorundē sit imbecillior, minusque sanguinis habeant quam florentes ætate.

CAPVT XIII.

OPTIMUM quidē erit priusquā incidatur uena hæc omnia expendere, maximē de retentis hæmorrhoidibus, & purgatione muliebri. Quando igitur incisa uena sanguis effluit, mutationi eius, præsertim ubi iam phlegmone adest, & libascenti effluxionis robori, potissimum uerò mutationi pulsū, tãquā indicio nequaquā mēdaci animum attēdere oportet, cōfestimq; quiescere pulsu uel in magnitudine, uel in quauis inæqualitate mutato. Nā de mutatione in imbecillitatē quid attinet dicere? Quippe didicisti in huiusmodi qualitate certum ualidarum & infirmarum uirium fieri discrimen. In quibus autem prope sectam uenam ingens quēdā phlegmone est, optimum fuerit sanguinis & in colore, & in consistentia mutationem expec

expectare, quemadmodum etiam Hippocrates in libro de Victu acutorum de pleuritide uerba faciens significauit. Alius enim qui iuxta phlegmonem haeret sanguis est ab eo qui secundum naturam se habet, utpote plus calefactus. Si enim antea crudior erat, rubicundior & flauior fit. Sin eiusmodi prius erat, adustus in nigrum conuertitur. Quocirca Hippocrates de pleuriticis ita scriptum reliquit: Incidenda uerò in gibbero interna uena, nec cuncteris copiosè auferre, donec rubicundior flauiorq; multò effluat, uel pro puro & rubicundo liuidus, utrunq; enim accidit. Nam signum statuit aliquid sanguinis eius qui est prope phlegmonem in sectam uenam assumptum esse, in hoc quòd mutatio in eo appareat. Non tamen omni ex parte hanc expectare oportet, uerum accidit interdum ut antequàm hac fiat, cessandum sit, duabus de causis, quòd uidelicet imbecilla sit uirtus, aut phlegmone maligna. Nonnunquam

enim nihil concedit, sed uehementer im-
 pactus est sanguis. Si itaq; uirtus ua-
 cuatione nondum exolui uideatur, pul-
 sum iam ipsorum attingens, ubi is cui
 sanguis mittitur etate uiget, mutatio-
 nem expectare conuenit. Idq; magis
 si ambiens temperatus fuerit.

COMMENTARIVS.

Tria si- EXPEDITIS ijs quę in mittēdo san-
gna quib⁹ guine diligenter sunt medico expēden-
quo tēpo- da, nūc quibus signis intentū esse opor-
re sangui- teat medicum, ut quādo in detractiōe
nis efflu- sanguinis sit interquiescendum, cogno-
xur sit co- scat, luculenter admodum docet. Sunt
hibendus autem tria potissimū signa quibus co-
cognosci- gnoscimus quo tempore sanguinis ef-
mus. fluxus sit cohibendus, mutatio nimirū
 sanguinis, labescens effluxionis robur,
 & pulsum quod ad primum quidē si-
 gnum attinet, in quibus prope venam
 quę secta est, ingens fuerit phlegmo-
 ne, sanguinis & in colore, & in cōsisten-
 tia mutationē expectare oportet, quem
 admodū etiam Hippocrates lib. 2. Vi &
 acut. morb. Aphor. 10. ubi de pleuritide
 verba facit, nobis significauit. Disertē
 enim

enim ibidem asserit incisa in gibbero interna vena non esse desistendum à sanguinis detractiōe, donec rubicundior flauiorq; multo quàm fuerat initio effluxionis, aut pro puro & rubicundo lucidus effluat. Quippe sanguis qui iuxta phlegmonem hæret alius est ab eo qui in reliquis corporis partibus secundum naturam se habet, vtpote à vehementi ac præter naturã qui in phlegmone est calore plus calefactus. Quapropter, si antea sanguis qui in totũ spargitur corpus, pituitosior ac crudior erat: rubicundior sanè & magis flauus euadet qui in eo quod phlegmone obsidetur latere cõtinetur. Quodd si verò sanguis in corpus totũ diffusus rubidus fuerit, is proculdubiò qui ad phlegmonem est, adustus, affatusq; in nigrum permutabitur. Liuidus autem in ea quæ fit à rubido ad nigrum transmutatione, mediũ obtinet. Coloris igitur mutatio, sanguinis *Non semper* ex particula inflammata translationem *sanguinis* sufficienter demonstrat. Quanquam ve *in calorẽ* rò coloris mutatio modum & mensurã *mutatio* vacuationis indicat, non tamen oportet *expectan-* hanc semper expectare, sed interdũ *anda.*

tequam hæc apparet à sanguinis detractione erit desistendum: idq; duplici de causa. Primùm quòd virtus sit imbecilla, nec tantam vacuationem quam coloris sanguinis mutatio sequitur ferre queat. Secundò quia phlegmone maligna est, nec quicquàm de se sanguinis concedit, utpote qui illi vehementer sit impactus. Tum igitur potissimùm sanguinis in colore mutatio expectanda erit, quando virtus est valida, quod expulso, qui tangendus medico erit, ut paulò pòst latius dicemus, deprehenditur, ægerq; ætate viget, & aër sit temperatus. Hæc enim singula ad sanguinis commodam missionem non parum conferre partim antea demonstrauimus, partim in sequentibus docebimus. Alterum quod nobis monstrat quando sanguis secta vena sit cohibendus, est labascens effluxionis robur. Si enim sanguis minori impetu quàm antea effluat, signum est satis iam eius esse detractum. Tertiū signum, atque inter alia minus mēdax, pulsum est immutatio. Quapropter pulsum mutationi diligenter animus attendendus est, & confestim quiescendum

Quando sanguinis mutatio expectanda.

Labascens effluxionis robur.

Pulsum immutatio

dum à sanguinis detractione, vbi vel in magnitudine, vel in quauis alia inæqualitate pulsus mutatus fuerit. Est enim in hac qualitate, hoc est specie pulsus, vehementis nimirum & languidi, certa validarum & infirmarum virium discretio. Quippe hoc genus pulsum à viriū robore sumitur, vt copiosè admodum Galenus in lib. de differen. pulsum de mōstrauit. Quapropter immutatio pulsus in imbēcillitatem certissimum est indicium sanguinis effluxum esse cōhibendum.

*Qualitas
idem quod
species, si-
gnificat,*

Duo enim hæc sunt propter quæ maximè coniecturalis in hoc præsidio uacuationis quantitas efficitur, nempe quòd qualis sit laborantis natura nobis exquisitè cognoscere nō liceat, & ambientis temperamentū quale sit à missione sanguinis futurum. Quando enim febrilis calor multū sanguinis discutit, æger uerò tenui utitur uictu, necessariò breui illū alimentū ex sanguine deficit, interimq; uirtus exoluitur. Absumitur autē ob ægrotantis temperamentum, si-

quidem calidum & humidum existat,
 quale etiam est puerorum. Propter ue-
 rò ambientem, si regio ualida, & hora
 æstiuæ fuerit. Quocirca minus detra-
 himus quàm plenitudo imperat, per æ-
 tates quidē, in pueris: per corporis ha-
 bitus, in ijs quibus mollis teneraq; est ca-
 ro, & candidis, quales sunt, Galli. Per
 tempus autem, sub Cane. Similiter uerò
 per regiones & temporū constitutio-
 nes. Alia autem ratione, ut antea est cō-
 prehensum, in contrarijs, hoc est in fri-
 gidis rei temporibus & regionibus, lar-
 gan sanguinis uacuationem, propter se-
 quentē nimirum refrigerationem. Qua
 propter unum in uno quoque dictorū
 scripto definire uacuationis modū haud
 licet. Noui enim quibusdam sex libras
 sanguinis detractas abundē fuisse, ut fe-
 bris confestim extingueretur, nec ulla
 uirium sequeretur afflictio. Nonnullis
 uerò sesquilibrā, haud citra leue saltem
 aliquod uirium detrimentum. Quibus
 si quis duas uacuasset, summē utique
 laxisset.

lesiſſet. Proinde noui etiam quibus unā
utiliter detraxi libram, & hac nonnun-
quam etiam minus, idq; à uenis gibberi,
poplitis, & tali. Nam ex uenis quæ ad
magnos sunt oculorum angulos, aut sub
lingua, nihil effatu dignum effluere so-
let: ſicuti nec ſi quis in pedibus, aut
ſumma manu incidat uenam, quemad-
modum qui lienem curari arbitrantur
à uenæ quæ ad ſecundum paruorum
digitorū eſt ſeſtione, de qua fuſius de-
inceps dicetur.

COMMENTARIUS.

Dvo eſſe hoc loco docet Galenus Duo ſunt
ppter quæ quātitas vacuatōis per uenæ ppter quæ
ſeſtione maximè coniecturalis efficia. quātitas ua-
tur, laborātis nimirū naturā, & ambiētis cuatōis
tēperamentū. Qualis eī ſit ægrotantis per uenæ
natura nemo exquiſitè ſcire pōt. Per na ſeſtione cō-
turā autē hic intelligere oportet nō ſo iecturalis
lūm hominis temperaturā quæ ex com efficitur.
mixtione quatuor Elementorū conflatur, ſed etiā p-
tates quæ illā ſequun-
tur. Quapropter quum naturā ægrotā-
tis medicus exquiſitè cognoscere non
pōſſit, cōiecturis certè illi utendum erit.

talibus, quæ illum quoad fieri potest ad eius cognitionem proximè ducât. Pari modo fieri non potest vt quale futurū fit aëris nos ambientis temperamentū à seſta vena exquisitè ſciamus. In horas enim ſingulas interdum aërem mutari accidit. Plurimū igitur ſitum eſt in eo, vt qualis ſit ægrotantis natura, & qualis etiam à vena ſeſta futurus ſit aër cognitum habeamus. Nam ſi æger febre vehementi laboret, fieri non potest quin calor febrilis multum ſanguinis diſcutiat. Quum verò vt tenui quoque in febre vtatur victus ratione neceſſarium ſit, quæ vires, vt teſtis eſt ſeſt. i. Aphoriſmo. commenta. quarto Gale-

Quæ diſſo- nus, comminuit, vt breui illum alimen-
lutionis ui- tum ex ſanguine deficiat, virtusq; in-
rium cau- terim exoluatur neceſſe eſt. Quæ vt ci-
ſa. tius diſſipetur & abſumatur ægrotantis
Tempera quoque & ambientis temperamentum
mētū agro efficit. Si enim temperamentum ægro-
tantis cali- tantis ſit calidum & humidū, quale eſt
dū & hu- puerorum, vt citò diſcutiatur aptiſſimū
midum. erit. Puerorum nanque ſubſtantiā o-
Ambiens mnium facilimè diſcuti & diſſipari, pro
calidus. pterea quòd eſt humidiffima & calida,

Galen

Galenus libr. 9. Ther. metho. cap. vlti. & supra cap. 13. copiosius monstrauit. Pari modo si ambiens fuerit calidus, vt accidit in regione calida, & æstate, citius etiam vires exoluuntur. Quapropter nõ raro fit vt minus nobis sanguinis sit detrahendum quàm plenitudo suadeat ac iubeat: idq; vel propter ætatē, vt in pueris: vel propter habitum corporis, vt in ijs quibus est caro mollis teneraq̃ue, & candidis, quales Galli sunt, vt supra quoque, capite nimirum sexto huius libri dictum est. Gallos autem hîc intelligere oportet eos qui Galeno alijsq; Græcis *κίλτοι* dicuntur. Quae quidē voce veteres Græci & Gallos & Germanos significabant, quemadmodum in nostris annotationib. in lib. 1. de Tuend. sanit. Galeni fusius docuimus. Præterea minus detrahimus propter tempus anni, vt sub Cane. Atq; hinc est quòd Hippocrates etiam dixerit: Sub Cane, & ante Cane purgantium medicamentorum vsus molestus est. Minus quoque detrahimus sanguinis propter regiones, & temporum anni constitutiones, vtpote quæ vires corporis etiam dissoluunt. Cæterum

*Tempus
anni & re-
gio.*

4. Aph. 3

alia ratione largam sanguinisvacuationem vitamus in contrarijs, hoc est frigidi tēporibus & regionibus, nempe propter eam quæ sequitur refrigerationē, vt capite sexto dictum est. Quare quū non liceat in vnoquoq; prædictorum scripto definire vnum, adeoq; certum vacuationis modum, perspicuum omnibus sit, vacuationis quantitatem in sanguine mittendo esse cōiecturis quibus

Sex libræ sanguinis quibusdā detractæ. dam colligendam. Fuerunt enim quibus sex libræ sanguinis detractæ nihil viribus incōmodarunt, sed cōfestim potius febrē extinxerint. Atq; ex eo Gale-

Veteres plus sanguinis q̄ hodie fit detraxisse. ni loco palàm est, veteres in suis venæ sectionibus multò plus quàm hodie solemus sanguinis detraxisse, vt illas adeò parcas & exiguas, quibus vulgò hodie Medici vtuntur, sanguinis detractiones vix scarificationis nomine dignati fuissent, quemadmodum plenius sectio. 3. Aph. Hippocratis com. 31. monstrauimus. Sunt autem alij quibus vix vnā cum dimidia libram, citra saltem leue virium detrimentū, detrahere possis. Quibus si duas auferres, summè quidem læderes. Sunt denique quibus vna

tantum libra vtiliter vacuatur, & interdum minus, idq; ab ijs venis quę in gibbero sunt, poplite, & talo. Ex nonnullis enim venis, vtpote ijs quę ad magnos oculorum angulos, aut sub lingua sunt, nihil effatu dignum, vt quę exiguę sunt, effluere potest. Sicut certę accidit vbi quis in pedibus aut in summa manu incidat venam, vt faciunt qui in lienis affectibus venam quę ad secundum paruum digitorum, seu annularę est aperiant, de qua fusius cap. 16. dicemus. Admadvertendum autem hunc locum prorsus explanari ab ijs quę Galenus lib. 3. de Anatomic. administra. scribit, dum inter cętera ita inquit: Reliqua pars venę quę paruum auriculare in uicem digitum adit, dum obliquum cubiti appendicem perreptat, exilem quandam ad posteriorem medij digiti sedē transmittit. Post hęc bifariā scissā, altera quidem parte mediam & annularem digitum regionē ingreditur. Quam sanē venam nonnulli in sinistra manu secantes, finentesq; ex ea fluere sanguinem quousq; sua sponte sistatur, lienem ex tali vacuatione iuuari asserunt. Altera aut parte

venæ humiliore, rursus in eam regionem quæ est inter annularē & parvū digitū media fertur. Hæc ille. Vnde certè omnibus palàm fit olim in lienis affectibus. uena quæ inter annulare & annularē est venā, ut hodie passim fieri cernimus, sed eā potius quæ inrer annularē & medium digitum est fuisse sectam.

Olim in lienis affectibus. uena quæ inter annulare & medium digitum est secabatur.

CAPVT XV.

SI IGITUR quæcunq; à Medicis de hoc consilio dicta sunt scribere uellem, libro mihi opus esset magno, & per se perfectio. Quemadmodū uerò in alijs quæ hucusq; definita sunt meā uobis sententiam exposui, qui eam in artis operibus probari conspexistis: ita nunc quoq; faciā, initio sermonis ab ijs quæ quotidie in laborantibus manifestè uidentur sumpto, quæ primus Hippocrates diligenter obseruans scripsit. Est uerò eorum unū & primū caput. Quæcunq; sanguinis eruptiones κατ' ἴξιν fiunt, maximam egrotantibus commoditatem afferre. Quod uerò κατ' ἴξιν uocat secundum rectum, omnibus confectum

festum est, quòd ipse manifestè hac uoce
 κατ' ἑξῆς se penumero in hoc utatur si-
 gnificatu. Quæ uerò cōtrà sanguinē ex-
 cernunt, nihil iuuare, aut etiam nocere,
 quòd scilicet interdum citra mali leua-
 men uires exoluant. Neque enim liene
 magno existente è dextra nare sanguis
 erumpens, neq; in iecore è sinistra ullā
 adfert utilitatē: sed reuulsio quidem
 quæ in rectum fit manifestam utilitatē
 celeriter ostendit, in quibus autem con-
 trā accidit, nequaquam. Dextra igitur
 nare sanguinem effundente, ad dextrum
 hypochondrium affixa cucurbitula san-
 guinis eruptionem clarè celeriterq; si-
 stit: perinde atq; ad sinistrum, sangui-
 nem excernente sinistra.

COMMENTARIUS.

OSTENDIT initio huius capitis Ga-
 lenus se non posse hoc loco singulorū
 medicorum de vacationis quantitate
 cōsilia atque opiniones scribere, quòd
 scilicet si hoc præstare conaretur sibi
 magno, & qui per se perfectus esset, lib.
 opus foret. Quàm variæ enim fuerint

Variæ ut-

terum de de hac re Medicorū sententiæ, in lib. de
uacuat *nis quanti-* Sanguinis missione aduersus Erasistrā-
tate opi- tæos nō nihil significauit, vbi ita scriptū
niones. reliquit: Fuerunt nonnulli Med. qui va-

cuationis quātitatē quibusdā signis de-
finierūt, veluti si vel color, vel tenor, vel
sanguinis fluxio mutetur, aut pulsus tē-
pore subtractionis ex debilitate collabū-
tur, ac sudores prorūpāt, aut ea quę aliq-
labores vocāt, aut deniq; vomitus vehe-
mētiores exuperātēsve alui deiectiones
appareāt. Alij etiā vīq; ad animi defectio-
nē, producēdā vacuationē putāt. Aliqui
itē tum coloris in toto corpore permu-
tatione, tum pulsuū alteratione com-
moderatam subtractionē cōiectantur.
Nec defuerūt quidam qui constitutam
etiam quandā mensurā illius propone-
re auderēt, proinde quasi duabus coty-
lis atticis, aut paulò plus minúsve mode-
rata subtractio circumscriberetur: quū
ex commoderata pportione adhibitis
ad id & ætate hominū & natura, & tem-
pore anni, & regione, nos ipsi maius mi-
núsve cuiq; quadrās inuenire possimus.
Hæc & alia multa ibidem Galenus per-
censet, quę in præsentia omittere statuit,
& ea

& ea quæ adhuc restant de venę sectione dicenda potius definire pergit, initio sumpto ab ijs quæ quotidie in ægrotantibus apparent, & ab Hippocrate diligenter sunt obseruata, quorum sanè hoc primum est caput. Eruptiones excretionēsve sanguinis κατ' ἴξιν factæ, maximā ægrotis cōmoditatem afferunt. κατ' ἴξιν, κατ' ἴξιν
autem Hippocrati nihil aliud, nisi κατ' ἴξιν, quid Hip-
ὁρθό, hoc est in rectum, aut è directo, pocrati si-
vel ἐνθυωρία, id est, rectitudinem si- gnificet.
gnificare hoc in loco, & multis alijs testatur Galenus. Quippe lib. 1. de Victu acut. morb. com. 29. ita scriptū reliquit: εἰσμεν ὅτι πᾶν ἴξιν ὡς καὶ πολὺ μὲν ἐνθυωρία λέγεται ὑποκράτης. Quod est, scimus quod Hippocrates ἴξιν, vt plurimum, rectitudinem dicit. Et libro 2. de Curandi ratione ad Glauconem, capite 7. in eum scribit modum: Quod κατ' ἴξιν ab Hippocrate dicitur, hoc ipsum est secundū rectitudinem, è directōve. Rectitudinem autem non mathematicam, sed do-
naturalem, quæ secundum fibras & filamenta staminave fit venarum & arteriarum Hippocrates intellexit. Quippe venę fibris contextæ sunt rectis & trans

Fibra quid

transuersis, quibus actiões suas motusq;
 obeunt. Rectis nanque attrahunt. Trā-
 uersis verò excernendi functionem
 obeunt. Non est autem fibra nisi pars
 substātię tenacioris solida, gracilis, ob-
 longa, filoq; persimilis, quæ motui in-
 seruit. Hanc sanè fibrarum rectitudinē
 atq; consensum Hippocrates in spon-
 taneis sanguinis eruptionibus medico
 diligenter esse obseruandū passim hor-
 tatur. Si enim natura in excernendo san-
 guine rectitudinem illam obseruat, ma-
 ximam certè ægrotantibus commodi-
 tatem affert. Si verò contrā sanguinem
 excernit, nihil iuuat, aut etiam nocet,
 quia scilicet nonnunquam vires exol-
 uit, vacuato nimirum sanguine bono,
 vitioso autem & inutili intus relicto,
 morbumq; nihil leuat. Neque enim
 quicquam hac lege à loco laborante
 excernitur sanguinis noxij. Hinc est
 quòd lieni malè affecto sanguinis ex
 dextra nare eruptio nullam adferat vti-
 litatem, & iecori è sinistra nare erum-
 pens sanguis nihil commoditatis affer-
 re solet. Quod confirmant etiā ea, quæ
 lib. 3. de Crisibus, ca. vltimo, scribit Ga-
 lenus

lenus, inquit. Dextra hypochondria ex dextra nare bonam iudicationē afferunt: sinistra verò, ex sinistra. Atque hunc quidē naturę motū medicus quoque in suis reuulsionibus, vtpote fidelis minister, sequi debet. Si igitur per reuulsionem in contrariū nve attractionem sanguinis eruptionē sanare expedit, vt in rectum fiat curare debet. Ea enim reuulsionis ratio celeriter manifestam vtilitatē ostēdit, contraria verò nequaquā. Quapropter q sanguinis ex naribus profluuiū curare recta ratione cupit, is sanguine ex dextra nare emanante, dextro hypochondrio cucurbitulā affigat: ex sinistra verò nare si erūpat, sinistro. Sic enim clarē & celeriter sanguinem erumpentem sistet. Quod libro quoq; 5. Ther. Meth. cap. 3. Galenus docet, ita scribens: Quum ē naribus sanguis erumpit, eū retinent magnæ in hypochondrijs defixa cucurbitulæ. Infingendæ autē sunt, si ex dextra nare profluit, sup iocinore: si ex sinistra, super liene: si ab vtraque nare, super vtroque sunt imponendæ viscere. Quodd si resolutus adhuc eger nō sit, etiā vena in gibbero

bero incidenda est, qui profusioni è directo respōdet. Ceterum animaduertendum hoc loco erit, postremā huius capituli partem de reuulsionibus medici in Græcis codicib⁹ esse mirificè deprauatā

Græcus ac mutilā. Tamē ex antiquo interprete
Aldinus satis colligi pōt ita prorsus esse legēdū:
codex emendatus. ἀλλ' ἡ ἀντίσπασις μὲν ὑπὸ τοῖς κατ' ἐυθείαν ἀντισπῶσιν ἐναργῆ πλὴν ὠφέλειαν ἐν τῷ χειρὶ λεκνύει. Quorū quidē verborū is sensus erit, quē in nrā cōuersione expressim⁹.

CAPVT XVI.

PORRO si in eruptionibus sanguinis quæ in rectum fiunt reuulsionis gratia sanguinē mittas, mox cōspicuum uidebis utilitatem. At si contra uenā seces, nullum sequetur commodū. Sic itaq; liene laborante incisio eius uenæ quæ ad annularem est digitū sinistrae manus iuuat æquē, ac si internam quæ in gibbero est secueris. Siquidem multum iuuat lienem malè affectum sanguinis ex sinistra manu uacuatio. Præstat autē non semel quod conuenit uacuare, sed in duas partiri dies. Scire nequeo quā
 de cau

de causa medici lienosis mittere sanguinem neglexerint. Ego enim semper magnam sequi utilitatē cognoui, si etiā libram unā uacuassent. Verūm uacuationis quantitātē ac mensurā ex prædictis scopis conijcere oportet. Quinetiam pleuriticis quæ è directo laborantis lateris facta est uenæ sectio, euidētissimā sæpe utilitatē ostendit: quæ uerò ex manu contraria, aut omninò obscurā, aut longo pòst tempore. Adhæc oculorum uehementissimos dolores persæpe intra horæ unius spatium humerariæ uocatæ uenæ sectio compescuit.

C O M M E N T A R I V S.

UT præcedenti capite inter expulsiōnes excretionēsve naturæ eas quæ in rectum fiunt cæteris prætulit, utpote meliores, ita hoc loco medicum hortatur, ut in missione sanguinis reëstitutionem, siue reuulsionem, siue deriuationem moliatur, non negligat, sed diligenter obseruet. Quum enim is naturæ minister sit, debet in suis uacuationibus hanc ipsam rectè operantem sum-

In missione sanguinis reëstituendo obseruari debet.

moimitari studio. Sunt autem vacuationis modi quatuor. Prior enim retrahit materiam, & hæc quidem Græcis ἀ-
 τίστασις, Latinis retractio, & reuulsio
 dicitur. Neque enim aliud est reuulsio,
 quàm humoris fluxuri, aut iam fluentis
 retractio. Altera verò ad latus trahit seu
 deriuat. Hæc Græcis παραχίτευσις, La-
 tinis deriuatio nominatur. Quippe per
 eam humor particulam laborantem ob-
 sidens, ex parte propinquiore sana edu-
 citur. Quod testatur Galenus, qui lib. 6.
 Epide parte 2. comment. 3. deriuationē
 ita describit: Deriuationē, inquit, appel-
 lare consuevit Hippocrates, quum hu-
 mor aliquis vacuatione indigens, neq;
 per conuenientem locum fieri cœperit,
 neque tamen valde procul à conueniē-
 te, neque ad remotissimum. Tertia ex
 ipsamet particula malè affecta vacuat.
 Et hæc simplex vacuatio commodissi-
 mē appellabitur, eo quòd vacuet tan-
 tūm, neque reuellens, neque deriuans.
 Quarta est quæ retrahit simul & deri-
 uat. Prioris vsus erit inter initia statim
 morbi, dum adhuc confluit humor. Al-
 terius, vbi iam humor partem obsedit.

Tertiæ

*Vacuatio
 in quatuor
 modi.*

*Retractio
 Deriuatio*

*Vacuatio
 simplex.*

*Vacuatio
 re trahens
 & deriuans.*

Tertiæ, quando malum iam est inuete-
 ratum. Quartæ, vbi pars humoris ad-
 huc fluit, pars iam locum obsidet. His
 præmissis facillimum erit quæ hoc in ca-
 pite Galenus tradit intelligere. Semper *Semp san-*
 enim, etiam si reuellere per venæ sectio *guis è dire*
 nem animus est, sanguinem è directo *cto mitten*
 mittendum esse docet, dicens: Si in eru *du.*
 ptionibus sanguinis in rectum factis re-
 uulsionis gratia venam seces, mox ma-
 nifestam vtilitatem conspicias. At si cō-
 trā sanguinē mittas, nulla sequetur cō-
 moditas. Sic sanè sanguine ex fini-
 stra nare erumpente, rectè feceris, mo-
 do nihil obstat, si reuulsionis gratia ve-
 nam in manu sinistra secueris. Cuius e-
 quidem venæ sectio, siue in gibbero, si-
 ue ad annularem vocatum digitū fiat,
 alios quoque lenis affectus iuuat. Pari
 ratione pleuritidis etiam è directo la-
 borantis lateris vena secanda erit, quod
 scilicet euidentissimam sæpe vtilitatem
 adferat. Contrā verò quæ ex manu con-
 traria haud secanda, quod obscuram, &
 non nisi longo post tpe, vtilitatem præ-
 beat. In oculorum deniq; vehementis-
 simis doloribus per sæpe humerariæ ve-

*Rectitu-
do.*

*Quæ uena
in pleuriti
de secāda.*

na quæ in rectum est sectio plurimum
commodi attulit, & dolores intra vnus
horæ spatium sedauit. Rectitudinē ve-
rò & contrarietate hinc intelligere oportet eā quæ ex fibrarū quæ in venis sunt consensu aut dissidētia sumitur, vt etiā capite præcedēti monuimus. Quod vt iterū moneamus. necesse est ppter eos, qui fortè Galenum hoc loco & alibi de mathematica rectitudine & contrarietate loqui existimant, adeoque docere quòd semper ex latere, quod situ & positu in rectum est sanguinem auferre oporteat, quod planè absurdū foret. Nā ita in omni pleuritide sinistri lateris ex interna eiusdē lateris gibberi vena sanguis detrahendus foret, quod tamē anatomes ratio non permittit, quæ nobis fibrarum in venis rectitudinem ob oculos ponens, & clarissimè demonstrans, illam magis quàm mathematicam esse nobis obseruandam monet. Quam rem vt lector rectius intelligat, animaduertendum quòd in pleuritide costarum tam superiorum trium quàm inferiorū nouem dextri lateris, semper ex dextra axillari est mittendus sanguis. In sinistra

nistra autem lateris pleuritide, nō perpetuò ex sinistra axillari sanguinem auferre oportet. Sed tum tantum, quando in tribus eiusdem lateris costis superioribus phlegmone constiterit: quod scilicet huic venæ cum iam dictis costis consensus & rectitudo sit. Quod si verò in inferioribus costis sinistri lateris phlegmone fuerit, tum axillaris dextra, non sinistra incidenda venit, eo quod hæc costæ à vena coniuge carente, ac par-

*Vena pa-
ris experr.*

ris expertem, ἀνυμ Græci vocant, nutriatur. Si quidem ita appellari meruit, quod ex latere opposito nullam sibi respondentem venam sortiatur. Oritur autem hæc à dextro cavæ venæ postq̃ cordis inuolucrum transcendit latere, ac deorsum ad quartæ propemodū thoracis vertebræ corpus contorquetur, & declivis secundum dextrum vertebrarum latus, porrecta, utrinq; ad inferiorum novem costarum intervalla-

ramos has enutrientes emit.

tit, ut ex isto schema

te omnibus evidē

tissimum,

fit.



IN hac rudi figura A' litera significat venam axillarem dextram: B verò sinistram, C & D ambas venas ad anteriora thoracis sub pectoris osse perreptantes, E venulam nutrientem tres costas superiores dextri lateris. F venam alentem tres elatiores costas sinistri lateris. G venę caux truncum dissectū, vbi dextram cordis auriculam caua tangit, atque in dextrum cordis signum ingreditur. H venam sine pari ex caua enatam. I. I. & C. nouem ramos venę paris expertis, nutriētes nouem costas dextras inferiores. K. K. & C. propagiēes eiusdem venę humiliores costas sinistras alentes indicanti.

Porrò quòd Galenus lib. 2. Vict. acut. commeu. 10. venam paris expertem sub corde emergere tradit, non alio factum est nomine, quàm vt is Hippocratis sententiam, qua in inferiorum costarū inflammationibus venę sectionē non admodum probat, honesta aliqua ratione regeret, & excusaret. Summa enim quæ potuit moderatione se nunquam ferè non repressit, vnicequē studuit vt quàm minimum ab Hippocratis præceptis recederet. Quantūvis autem Hippocrati

Quare Galenus uenā paris expertem sub corde emergere tradit

contradicere religiōsissimè cauerit, a deoque aliquam rationem, nempe venarum distantiam, comminisci studuerit, qua Hippocratis sententiam, qui sanguinem non esse mittendum, sed purgante potius medicamento vtendum, quum dolor ea quæ sub septo sunt petit, statuit, tamen tandem hanc rationem parum esse efficacem perpendens, venæ sectionem in omni pleuritide, ea etiam in qua ad hypochondrium finitur dolor, purgante medicamento securiorem esse disertè subiicit: idq; rectissimè. Nam si Hippocrates arbitratus fuisset à vena siue coniuge per venę sectionem nihil educi posse, aut eam longius ab axillare distare, quàm vt hæc aut alia quęuis, illius gratia incidi posset, quomodo interim in pulmonum, cordis, iecoris, ventriculi, lienis, & renum malis, venam in gibbero alibi secandam esse docere potuisset? Ceterum ex ijs quę de rectitu-

Dextra cū dine paulò antè diximus omnibus per-
sinistris e- spicuum sit, dextra cum sinistris etiam
tiam recti interdum habere rectitudinem, non ta-
tudinē ha- men mathematicam. sed naturalem, quę
benē. est secundum venarum fibras. Hinc est
 quod

quod Galenus lib. 13. Ther. meth. cap. 5. altero crurum malè habente reliquum esse scarificandū, aut ex altero esse mittendum sanguinem doceat, quòd scilicet secundum fibrarū rectitudinem hæc venæ sectio fiat, quod ex venarum schemate, multoq; magis ex anatome ipsa satis liquet. Huc etiā respexit haud dubiè Cornelius Celsus, qui libr. 2. cap. 9. scribit ex altero brachiū mittendū esse sanguinem, si quod vitium in humero fuerit. Nam in ea quoque venæ sectione seruatur fibrarum rectitudo & consensus. Quam sanè rectitudinem Hippocrates quoque respexit, dum lib. 5. Aph. 68. ait: Dolenti partem capitis posteriorem, in fronte recta incisavena prodest. Quæ omnia copiosius ante me prosecutus est singulari eruditione & humanitate præditus Andreas Vuesalius, vir de ætate nostra plurimum meritis, vt qui anatomes rationem ita illustrauerit, vt nemo alius ante illum. De quo sanè viro eiusq; excellenti ingenio & doctrina alio & magis conueniente loco fusiùs dicemus. Satis sit nos hoc loco. cum sua defraudare laude noluisse. Porro quum

*Andreas
Vuesalius*

nam quæ sit vera rectitudo quam in ve-
Rectitu - na secunda obseruare oportet demon-
do in pleu strauerimus, reliquū est vt rationes cur
ritide cur hanc ipsam hoc in loco Galenus in pleu
obseruāda. ritide esse obseruandam tam diligenter
 monuerit, afferamus. Est autem harum
 hæc certè præcipua, quòd hoc modo per
 petuus rectarum fibrarum cōsensus, at-
 que aded venarum communitas obser-
 uetur. Quibus equidem obseruatis, me-
 lior ac facilior sit humoris ad ægrā par-
 tem confluentis aut cōfluxuri reuulsio
 ac deriuatio, rectis nimirum fibris tra-
 hentibus, ac veluti exugentibus. Venæ
 enim ad sanguinis versus impactū, ipsis
 vulnus, & dolorificam ligationem fri-
 ctionemq; , aut calentem aquam, attra-
 ctionem, suis rectis fibris plurimūm au-
 xiliantur. Hinc est quòd Galenus lib. 2.
 ad Glauconem, cap. 7. tam reuulsionem
 quàm deriuationem per communes fie-
 ri debere de sententia Hippocratis præ-
 cipit venas. Communes enim venæ sunt,
 quæ perpetuò recti aut oblongi filamē-
 ti ordine cōnectuntur. Secūdo in pleuri-
 tide ideo est obseruāda rectitudo incisa
 interiore gibberi vena, quòd hoc ipsa
 sit

*Cōmunes
 venæ.*

fit laboranti parti proximior & commu-
 nis. Quare per hanc sanguis vitiosus cō-
 modissimè variatur. Hinc est quod ab
 Hippocrate dictum sit: Dolorum pro-
 ximam cavitatem incidere oportet. Et *6. Epidi.*
 à Galeno in lib. de constitutione artis. *parte 6.*
 Ex proximioribus & communioribus *Apho. 7.*
 malè affectæ partis venis, vacuatio fit o-
 ptima & facillima. Optima quidem, eo
 quod sanguis, qui in laborante est par-
 te, per eam educitur, bonusq; in corpo-
 re relinquitur. Facillima verò, propter
 cōsentum, vt dictum est, fibrarum. Ter-
 tiò competit prædictæ venæ sectio in
 pleuritide, quia, vt testis est libr. 2. vict. *Vacuatio*
 acut. comm. 10. Galenus, à laborante par-
 te magis & citius repellit & deriuat, sen *uoce*
 vacuat. *Galenus* Vacuationis enim voce Galenus *interdum*
 interdum pro deriuatiōe vtitur. *Renel.* pro deriua-
 lit, eo quod fluentem sanguinem ad cō-
 traria ducit & vacuat. *tione uti-*
 Deriuat, qā etiā *tur.*
 sanguinem qui laborantem partem ob-
 sedit vacuat. Vnde satis constat per vnā
 & eandem venam sectam fieri posse re-
 uulsionem & deriuationem, non tamen *uenam se-*
 eodem tempore. Nam quando initio is *ctā reuul-*
 sanguis qui ad laborantem partem fluit *sio fit &*
 deriuatio.

è vena educitur, reuulsio fit. Dum verò
 ad laborantem partem dimissus sanguis,
 & qui iam illis hæret ex eadem vena in-
 cisa profluit, deriuatio fit. Diuersis itaq;
 temporibus reuulsionem & deriuatio-
 nem fieri necesse est. Ex ijs verò abundè
 patet eos hallucinari, qui reuulsionem
 fieri censent quando à laborante parte
 per venam quæ alit costas sanguis educi-
 tur. Deriuationem verò, quando ex am-
 pla & communi vena, interna nimirum
 gibberi quæ in rectum est, vacuatur. Re-
 uulsionem enim deriuationem, & con-
 trà deriuationem reuulsionem non re-
 ctè nominant. Cæterùm debent hæc duæ
 vacuationes vna venæ sectione perfici,
 vbi egri vires valide fuerint. Quod Hip-
 pocrates maximè significauit li. 2. Vi-ct.
 acut. Aphor. 10. dum educendum esse in
 pleuritide sanguinem præcipit, quoad
 coloris mutatio apparuerit. Non enim
 apparet, nisi sanguis qui iuxta partem la-
 borantem continetur educatur, quem-
 admodum suprà cap. 14. est à nobis co-
 piosè monstratum. Vbi autem vires im-
 becilliores fuerint, partiri vacuationes
 oportet, primumquæ reuulsionem dun-
 taxat,

xat, idq; fluēte adhuc sanguine, dein ve-
 rō post temporis interuallum, deriua-
 tionem fieri cōuenit. Quapropter quū
 neque celeriter, neq; similiter ex omni
 vena sanguinis vacuatio fiat, in pleuri-
 tide ea vena secunda erit, quæ celeriter
 & reuellit & vacuat. Nam vt Galenus lo-
 co suprā citato ait : Id vnicum nostrum
 studium esse debet, vt à parte phlegmo-
 ne laborante celeriter reuellamus & de-
 riuem⁹. In pleuritide igitur interna gib-
 beri quæ in rectum est vena incidenda,
 vt quæ celeriter & reuallat & deriuat, vt
 dictum est. Ex ijs quæ dicta sunt perspi-
 cuum esse iudico reuulsionem ac deri-
 uationem tum esse adhibendas, quando
 morbi pars quædam iam genita est, pars
 autem in gignendo. Sin adhuc in gene-
 ratione est, sola reuulsio sufficit, vt quæ
 sanguinem ad laborantem partē fluen-
 tem in cōtrarium trahat & vacuet. De-
 bet autem fieri per venam paulò antè di-
 ctam communem & proximam. Quòd
 si à morbo qui futurus est præseruare
 animus sit, ex distantibus, obseruata ta-
 men rectitudine, vacuare licebit, quòd
 tum nō sit vllus metus ne vitiosus san-
 guis

*Que in
 pleuritide
 secunda ve-
 na.*

*Quando ex
 proximis
 uenis ua-
 cuanduna.*

*Quando ex
 distantio-
 ribus.*

guis, quemadmodū vbi pars morbi iam facta est, intus relinquatur. Hinc est quod ijs qui comitiali morbo laborare consuevere, verno tempore venam vt, suprà, cap. nimirū 7. est cōmemoratum, non tamen in gibbero, sed potius in cru ribus, incidamus. Quod Hippocrates etiam lib. 2. de natura humana, & in 3. de Ossium natura libro ijs verbis significa re voluit: Danda est opera, inquit, vt q̄ longissimè à locis vbi dolor est, & san- guis cogi didicit, venarum incisiones fiant: sic enim haud magna repentè mu- ratio fiet, & consuetudinem mutaueris ne amplius eò loci sanguis coëat. Quā do igitur morbus in generatione est, re uulsio quidem fieri debet, sed non ad- distantissima, quēadmodum in eo qui adhuc futurus est morbo. Fit itaq; re- uulsio semper ad contraria, atqui non semper ad distātissima, vt copiosius li. 2. Paradox. capi. 4. & in Apologia nostra aduersus Brachelium mōstrauimus. Cæ terum nunc cuius promptum est scire, cur in pleuritide vena in contrario la- tere non sit incidenda. Primum enim huic venæ cum parte laborāte nulla est fibra

*Reuulsio
semper ad
contraria
fit, non ta-
men semp
ad distan-
tissimā.
Cur i pleu-
ritide in cō*

fibrarum rectitudo, nec aliquis consensu *trariolatus*.
 sus. Dein per venam in contrario latere *re uena* non
 sectam neque reuulsio, neque deriuatio *sit inciden*
 tio fit, quarum tamen vacuationum *utra* da.
 que in internis phlegmonibus necessa-
 ria est. Quocirca non temerè Galenus
 lib. 2. ad Glauconem. cap. 7. utrunque va-
 cuationis iam dictæ genus, per commu-
 nes venas fieri debere præcipit. Secta
 enim in contrario latere vena à laborā-
 te parte nihil attrahit: quod scilicet non
 nisi per rectas fibras attractio fiat: vel
 parum saltem, vbi nimirum copiosissi-
 ma fuerit. Hinc accidit ut sanguis dun-
 taxat bonus per eam venam educatur, vi-
 tioso in laborante parte relicto. Qui ut
 paulatim subinde in locum boni san-
 guinis vacuati succedat, ac reliquum
 sanguinem bonum corrumpat, necesse
 est. Proinde æger ob eam venæ sectio-
 nem nihil leuatur à morbo, ac periculū
 imminet transitionis morbi in alterum
 latus. Quod si verò deinceps vena quæ
 in rectum est incidatur, ut plerique re-
 centiorum medicorum, non sine maxi-
 mo errore, facere soliti sunt, tum iterum
 pars vitiosi sanguinis aliò translata, ad

inflammationis locum partemq; labo-
rantem retrahitur. Quid multa? ex ve-
Incomoda na contrarij lateris sectione multa, eaq;
quæ ex cō grauia sequuntur incommoda. Quippe
trarij late- sanguis melior vacuatur, & prauus inuti-
ris uenæ se lisque intus relinquitur. Vires præterea
ctione se- probo vacuato sanguine collabuntur,
quantur. & ex vna pleuritide non rarò geminæ
Auicēna fiunt, vt fusius in Apologia nostra ad-
pernicios- uersus Brachelium monstrauius. Ex
simum de prædictis omnibus euidentissimum est
uena secan- quàm perniciosum, quàmque omnibus
da præce- detestandum sit hoc Auicennæ præce-
ptum. ptū, quod tradit Fen. 10. can. tertij, trac.
5. ca. 1. de curatione communi apostema-
tū partiū pectoris & pulmonis, in eū scri-
bens modum: Ex rebus cōmunibus est
phlebotomia, sed in principio ex latere
diuerso. Et magis festina de saphena op-
posita in longitudine. Et post ipsam de
basilica opposita in latitudine. Et post
ipsam de nigra opposita in latitudine.
Si autem non appareat, tunc non opor-
tet vt dimittatur phlebotomia cephal-
icæ, quamuis sit eius iuuamentum mi-
nus, & tardius. Deinde post aliquot dies
ex latere cōueniente in latitudine. Hęc
ille.

Ille. Quibus utique verbis in Pleuritide quatuor venas esse incidendas docet. Vnam malleoli, quam ipse Saphenā vocat, eiusdem lateris, vel ut ipse ait, oppositi in longitudine. Alterā internā gibberi oppositi in latitudine. Tertiam mediam eiusdem lateris contrarij. Quartā internam lateris laborantis. Sed, pro Deum immortalem, quis tam robustus, quis tam validis ac constantibus est viribus, ut toties sibi sanguinem auferri sustineat? Quid quæso ex malleoli eiusdem lateris sectione commodi sentiet æger? Nullum meherclè, sed maximum planè incommodum. Sanguis enim bonus ex hac vena solùm vacuatur, & pravius in laborante parte relinquitur, aut in communem venā transfertur, in qua, ut paulò ante dictum est, eum qui de bono reliquus est vitiat & corrūpit. Eodē aut certè maiore incommodo ex contrarij seu oppositi brachij venis bis sanguis aufertur. Quum enim humorū tractus per rectas fibras fiat, ut comprehensum est, is sanguis potissimū vacuatur, qui in eius venæ quæ secta est parte continetur. Remanet autē vitiosus, qui vei

in laborante parte relinquitur, vel in communem venam, vt commemoratū est, transfertur, nouamq; illic parit pleuritidem. Sic sanè Brissotus vir nō vulgaris eruditionis scribit se in vna Parisiorum vrbe obseruasse vno anno pleuriticis propemodum ducentis morbum ab vno latere ad alterū transiuisse. Verū obstat hīc aliq; dicēs, quomodo trāferetur in alterum latus cū illic nulla sit fibrarum reſtitudo? Respondeo duplici de causa. Primo quidem vacui ratione: quippe necesse est in vacuati sanguinis locum, vicinis saltem venis vehemēter vacuatis, alium succedere. Trahētib; itaq; venis in parte contraria, laborantes partes promptē concedent, vt pote quibus sanguis non tantū copia, sed & mala sua qualitate molestus est. Et si non sua sponte concederent, aut a se detruderent, tamen vt trahētib; partib; vt pote fortiorib; aliquid concederent, planē cogerentur. Trahit enim perpetuō ab imbecilliore pars fortior. Secundō, quia expultrix facultas, quæ suam functionem per transuersas fibras obire solet, ocysimè in oppositā

contr

contrariamue partem iam vacuatā, atq;
adeo vacui ratione, & quia validior est,
trahentē, trāsfert. Sed instabit hīc iterū
inquiēs: Quī fit vt nō potius à reliquis
partibus in quib⁹ probus est sanguis tra-
hant? Respōdeo, quia non possunt. Hæ-
nanq;, vtpote ijs validiores, eisdem ni-
hil cōcedent. Trahit enim id quod est
valentius, Galen. li. 3. de Nat. fac. teste,
vacuatur aut quod est imbecilli⁹. Nihil
igitur mirū etiam si nulla est fibrarū re-
ctitudo, ab vno in alterū latus pleuriti-
dem trāsferrī. Cæterū quartā & ultimā
ab Auicenna præscriptā venę sectionē,
quæ sola ex omnibus in tēpore adhibi-
ta cōmoda erat, vires, vtpote iam ppter
copiosi sanguinis ablationē prorsus re-
solutæ, ferræ haud possunt. Sed esto sa-
tis etiānum validæ sint, tamē eius venę *Venę se-*
sectionis hoc tēpore nullus vsus esse po-
tērit. Nam à phlegmone ipsa nihil edu- *ctio quæ in*
citur, quod inibi sanguis vitiosus, vt su- *rectum fit*
prà cap. 14. dictū est, fortiter impactus *tanto est*
sit, ita nulla ratione euelli queat. Proin- *præstan-*
de venę sectio quæ in rectū fit tanto est *tior, quāto*
præstātior ac cōmodior, quanto morbi *morbi ini-*
initio est vicinior. Tum enim nulla ad *nior.*

*Auicēna
homines iu-
gulare do-
cet.*

huc materia vehemēter est affixa, adeo-
quē per eā omnia quæ sunt præter natu-
ram facilē auferūtur. Quapropter verif-
simē quidā dixit, Auicennam iugulare,
non curare homines. Dignus siquidem
propter hoc vnū saltem horrendum &
exitiosum dogma cui à studiosis medi-
cinæ parū fidei habeatur, quiq; è scholis
Medicis tanquā carnifex, & is qui mul-
ta falsa & pernicioſa præcepta tradat
explodatur; penitusquē proſcribatur.
Atq; hæc in præſentia de venæ ſectiōe
quæ in rectum fit dixiſſe ſufficiat. Por-
rò præſtat non ſemel, quod ſuprà quo-
que, cap. nimirum 12. Galenus monuit
quod cōuenit vacuare, ſed in duos par-
tiri dies, propter cauſam ibidem expoſi-
tam. Tandem Galenus peruerſam quo-
rundam ſententiā notat, qui lienofiſ
non eſſe detrahendum ſanguinem dixe-
runt. Quippe quotidiana experiētia te-
ſtatur eos ex venæ ſectiōe, etiam ſi vna
duntaxat libra detracta fuerit, magnam
conſequi vtilitatē. Sed quātitas & men-
ſura vacuatiōis ex prædictis cap. 14 ſco-
pis, nempe magnitudine morbi & viri-
bus ægrotantis eſt coniicienda.

*Lienofiſ
ſanguis uti-
liter mitti-
tur.*

Conari uerò in omnibus malis præstat, ut post mediocrem sanguinis mis-
sionem factam, iteratò sanguis auferatur: interim quidem eodem die, quando
sic facere expedit, interim postridie, nisi
ubi, ut antea dictum est, ad animum usq;
defectionem uacuare conemur. In oculorum itaq; doloribus tum humeraria
uocata uena, tū quæ ex ea deriuata est
in gibbero incisa, manifestū celeriter cō-
modum adferunt. Laborāte autē latere,
aut pulmone, aut septo transuerso, aut
liene, aut iecore, aut uentriculo, ea quæ
per alas ad gibberi iuncturā pertingit.
Secūda uerò tum maxime interior erit.
Quòd si non, ea quæ ab ipsa deducta in
iuncturæ flexura apparet. Cognouisti
sanè paulò ante ab humeraria uena di-
duci prædictam, connectentem ipsam.

Tres enim hi sunt mittendi ex gibbe-
ro sanguinis loci, interior, exterior, me-
dius. Interior igitur in quib. partes quæ
infra collū sunt, laborāt, utilis est. Ex-
terior uerò quib. ptes quæ supra collū

Sunt, ut facies, aut caput, male afficiuntur. Medius locus interdum utraq; habet diductas uenas, in anteriorem manus partem protensas, ac deinde hic coeuntes: interim uerò statim in ipso iuncturae flexu in unum mutuo cōgredientes nonnunquam manifestā earum alteram, obscuram uerò alterā. Proinde ubi uena laborāti parti propria obscurior existit, & ad mediarum aliquā accedis, conare eā quæ à propria deriuatur potius incidere. Accidit autem ubi & quæ inferiores sunt gibberi iunctura, eas nimirum quæ in cubito sunt, secare nihil impediat, non apparentibus ijs quæ in gibbero sunt: atq; harum quidē eas quæ in rectum sunt laborantium partiū. Porro tam perspicuam sepe celeriter utilitatem quæ in rectum fiunt laborantium partium uenæ sectiones afferunt, ut & qui laborant, & familiares ipsorū sepe penumero obstupescant.

Iterandam
esse sanguinis
missio-
nem.

COMMENTARIUS.

HORTATUR hoc loco Galenus in
omnib

omnibus corporis malis hoc esse conandum, ut post primam eamq; mediocrem sanguinis missionem, iterum sanguis auferatur: idq; interim eodem die, ubi ita expedire videbitur, interdum postridie, quemadmodum supra, capite 12. est dictum. Nisi ubi ad animi usque defectionem vacuare conabimur, tum enim una vice vniuersum detrahendum erit. Dein iterum ad præceptum de re. *Præceptum de fibrarum re. titudine* fibrarum redit, eiusque miram esse in morbis profligandis utilitatem docet. Siquidem in doloribus oculorum humeraria, quam hodie facientes medicinam cephalicam vocant, aut quæ ex ea in gibbero diducta est, hoc est media nominata, si incidantur, manifestum celeriter adferunt commodum, propter causas paulò antè expositas. Sic etiam latere aliquo, aut pulmone, aut septo transuerso, aut liene, aut iecore, aut ventriculo laborante, ea in. *Vena axillaris, gibberis interior, & iecoraria eadem,* cidenda vena erit, quæ per alas ad gibberis iuncturam pertungit. Hæc autem axillaris, & gibberis interior, inq; dextra manu iecoraria, in sinistra verò lienaria appellatur. Qui hodie medicinam

exercent, Basilicam nominare solent. Quòd si tamē interior hæc gibberi incidi nō potest, ea quæ ab ipsa in iuncturæ flexu diducta est, id est media, secetur. Hæc quidem ab humeraria deriuatur, & ipsam axillarem per ramū ab ea diductū sibi connectit. Vnde omnibus perspicuū fit tres esse in gibbero locos vnde sanguis mittitur, nēpe interiorē, exteriorē, & mediū. Interior locus tum cōmodissimē inciditur, quando partes quæ infra ceruicem sunt, verbi gratia latera, pulmo, & aliæ quæ paulò antè nominatæ sunt, laborant. Exterior autem, quando partes quæ supra collum sunt, verbi gratia facies, aut caput, malè afficiuntur. Medius locus vtrasq; interdum venas, humerariam nimirum & interiorē, diductas, in vltiorem partem manus protensas, ac deinde hīc coeūtes habet. Interdum verò statim in ipso iuncturæ flexu in vnum mutuò congregiētes. Nonnunquam etiam altera earū venarū manifesta, altera verò obscura est. Neq; enim eodem semper modo ramos diffundunt. Cæterū si vena laboranti parti propria obscurior est, nec apparet,

Tres in gibbero loci unde sanguis mittitur.

Interior.

Exterior.

Medius.

Quæ uena incidenda, si ea quæ parti laboranti propria est nō apparet.

ret, & ad mediarum aliquam accedis, curato ut eam quæ à propria venâ diducitur seces, verbi gratia, si lienarem dictâ venam in lienis affectibus, quia nusquâ rectè in gibbero apparet, incidere non licebit, mediani nominatam secabis, sed eam quæ à lienari, non autem eam quæ ab humeraria diducitur incidito. Nonnunquam etiam licebit ut eas venas quæ infra gibberi iuncturâ sunt secemus, ubi nimirum quæ in gibbero sunt haud apparent. In ijs verò incidendis rectitudo fibrarum vnicè nobis obseruanda erit. Quippe tam perspicuam sæpe, id quæ celeriter, utilitatem venæ sectiones quæ in rectum sunt afferunt, ut & ipsi ægotantes, & horû familiares sæpenumero obstupescant. Et certè nemo est medicorum qui hoc ipsum non quotidie etiam accidere videat. Ut meritò ab ijs qui ad gubernacula Reipub. sedent publico edicto contraria venæ sectio inhienda esset, propter multa & varia quæ hanc ipsam sequuntur incômoda & pericula.

EG o itaq; rogatus sum aliquando à diuite quopiam uiro in suburbio Romanæ urbis habitante, ut suarū rerū œconomum inuiserem, cui cæcitatis imminebat periculum, hoc enim ipse dicebat, uehementer dolentem, idq; prope modum diebus uiginti. Erat autem familiæ diuitis illius præfectus medicus Erasistratius, studiosè semper uenæ sectione abstinens. Vbi igitur laborantem inspexissem, iuuenemq; esse multi sanguinis, oculosq; nondū exulceratos habere deprehendissem, cæterum phlegmonem, fluxionemq; maximam, & in ambabus palpebris densitatem, in altera etiam asperitates iam quasdam, à quibus obtenebratione orta magis dolebat, & phlegmone defluxioq; ipsa exacerbabatur: ijs inquam cōspectis, cognitaq; omni curationis qua medicus ille usus erat ratione, me quidem non posse assiduè in suburbium uenire dicebam, ex usu uerò esse ut homo triduum, ut minimum,

breui

breuibꝯ interuallis à me inspiciatur. Permitte igitur illum, inquam, mihi per hosce tres dies. Imò uerò, ait, hoc ab te contendo, gratiamq; habebo: quin iam hominem ad ædes tuas abduc. Venit autem horam circiter quintam, ac prima statim detractiõe sanguinis libras tres exhausti, dein hora nona aliam extraxi. A quibus plurimũ leuatus, postridie leuiũ quopiã collyriorum, cui admixtum erat id quod ex uino cõficitur, inunctus est, ueluti in eiusmodi facere cõsueuimus, inunctione sub palpebris per summum cuspidis specilli facta. Id autem primũ mane factum est, dein hora tertia, postea nona, à quibus inunctionibus sub occasum solis lotus est. Postero deinceps die palpebris extrà uersis bis inunctus est, maiore copia collyrij illius quod uinum recipit molli collyrio admixta: postea ad uestperam lotus est. Sequenti die mane diuiti illi obuiam factus eò loci ubi è uehiculis descendere solent, salutauit illum oculis apertis,

phlegmoneq; ac fluxione liberis, qui ante biduū palpebras præfluxione ac dolore aperire non potuit. Quapropter res incantationi cuidam similis uisa est, ita ut & ille ipse curationis celeritatē admiratus exclamaret, omnesq; qui cū eo erant similiter in clamorē prærumperent, quum nos haud magnum quippiam fecissemus, nisi comparatione medici eius familiaris, qui propter metum uenæ sectionis maximū malum attulerat. Porro opus erat laboranti ut ex palpebris extirgerētur tum densitates, tum asperitates: id quod citra mordax medicamētum fieri haud poterat. Tale autē nihil ferre potuit, nisi prius uacuat^{us} foret. Dictum enim iam, & sæpe nobis demonstratum est, omnia acria medicamenta partibus quibusdā admota, nisi uniuersum corpus uacuū fuerit, & exquisitè excrementorum expers, fluxionem attrahere, phlegmonemq; efficere. Percontatus igitur est tum diues, quænam incantatio curationis fuisset, & cum

cum omnia quæ facta sunt audiuiſſet,
 ab eo tēpore Eraſiſtratiū illum medi-
 cum ſanguifugū nominauit. Hæc itaq;
 narratio utriuſq; indicationē continet,
 tum quòd in eiufmodi affeētibus ſanguī
 nem mittere oportet, quod in præſenti
 ſermone nobis propoſitū non erat: tum
 quòd in rectum laborantium partium
 ſecare uenā conueniat, & quòd hume-
 rarias uenas, ubi partes thorace ſupe-
 riores laborant incidere oporteat.

COMMENTARIUS.

IN pſixa admodū hui⁹ capitis hiſtoria,
 quēadmodū metipſe in fine ei⁹ memin-
 tria potiſſimū Galen⁹ docet, nepe quòd
 in dolorib⁹ oculorū ſit mittēd⁹ ſanguis,
 et quòd ex uenis quę ī rectū ſunt partiū
 laborātiū, neq; tū è quauis, ſed humera-
 ria vocata. Præterea Eraſiſtrati & ſuorū *Eraſiſtra-*
 ſequaciū notat demētiā, eò quòd ī nullo *ij ſanguē*
 vnquā affeētū ſanguinē miſerūt, ideoq; *fugidicti.*
 meritò ἀμοφόβους et ſāguifugos aut mit-
 tēdi ſanguinis timidos eſſe appellatos.
 Quo ſanè nomine uſus eſt et Galenus
 lib. 9. Ther. Met. ca. 5. Ceterū quū hæc
 hiſto

historia longa sit & satis perspicua, nihil attinet singula eius verba explicare. Sufficiat itaq; nos ea tantum quæ difficultatem aut obscuritatem aliquam præ se ferunt, exposuisse. Proinde sciendum

Δασύτης.

primum per *Δασύτητα*, hoc est densitatem hîc non aliud esse intelligendum, quam palpebrarum crassitiem rubicundam, à sordibus contractam, quod ex sequentibus fit manifestum. Paulò enim post ait, ad pellendam extergendamve densitatem mordaci medicamêto opus esse, quod de sordium crassitie esse intelligendum clarum est, & minimè de hirsutia aut pilositate, ut antiquus con-

τριχιάσις.

uertit interpretes, quam Græci *τριχιάσις* nominant: malum nimirum in quo inutiles & oculos pungentes pili in palpebris nascuntur. Dein habet hæc historia exem-

*Exemplum
quantitatis
extracti
sanguinis.*

plum quantitatis extracti per venæ sectionem in sanguinis, nempe tres libras, & paulò post iterum unam. Ita ut uno die libras quatuor eduxerit Galenus. Quare si eam cum nostris venæ sectionibus, & hodie usitatis contuleris, vix scarificationis nomen, ut alibi copiosius diximus, merebuntur. Per horas autem quin-

tam

tam & nonam inaudiendę veniunt inę-
 quales, quod scilicet sine adiectione ac
 vlla determinatione loquatur, quemad-
 modum in annotationibus nostris in
 quintum Galeni de Tuenda sanitate li-
 brũ scriptis fusiꝯ docuimus. De molli- *Mollia*
 bus leuibꝯve collyrijs, quorum in hac *collyria*
 historia mentio fit, plura habet Galenꝯ
 lib. 4. de Cõpos. medic. localium, cap. 1.
 & sequentibus. Nonnulla quoque de ijs
 annotauimus in lib. 6. de Tuend. sanit.
 cap. 11. vbi etiam de specillõ multa & ad
 institutum facientia diximus. Collyriũ
 autem ex vino describit Paulus libro 7.
 capite 16. Porro Romanos senatores & *Roman*
 diuites vsos fuisse vehiculis notius est *senatores*
 quàm vt dici à nobis copiosius debeat. *uehiculis*
 Ad quẽ sanè morem hoc loco Galenus *usi.*
 respexit, dum ait, œconomum diuiti il-
 li obuiam factum eð loci vbi ex vehicu-
 lis descẽdere solent. Fuit autem is haud
 dubiè locus vbi multitudinis sex quoti- *Acria me*
 die Romanis ditioribus salutatum oc- *dicamenta*
 currebat, id quod matutino tempore *non sunt te*
 fieri consueuerat, vt ex illo Martialis *mercè par-*
 satis liquet: *tib. corpo-*
 Prima salutãtes atq; altera suscipit hora *ris ad mouẽ*
 Exercet

Et ante u- Exercet raucos tertia cau fidicos.
cuationē. Habetur etiam in hac historia salubre
 præceptū summoq; studio medicis ob-
 seruandum, quòd scilicet acria medica-
 menta non sint temerè partibus corpo-
 ris admouenda, nisi vniuersum corpus
 prius vacuatum fuerit, adeoq; excre-
 mentorum expers, alias enim fluxionē
 attrahunt, ac phlegmonem ea in parte
 cui adhibita sunt excitant. Reliqua hu-
 ius historiæ clara sunt, ideo vberiore
 explicatione non egent.

CAPVT XVIII.

QUE M A D M O D V M omnes
 prædictæ partes uenæ sectione
 in gibbero facta, ut dictum
 est, iuuantur: ita quæcunq; ijs inferiores
 sunt, eorum quæ in poplite & malleo-
 lis inciduntur. Sunt autē prædictis infe-
 riores: quæ iuxta coxam, uesicam, &
 uterum sunt. Renes autē ancipites sunt,
 siquidem inferiores sunt ijs quas prius
 recensuimus: superiores autem ijs quas
 secundo loco commemorauimus. Qua-
 propter uenæ sectionibus in gibbero
 factis

factis interdum auscultant, quando nimirum phlegmone recens fuerit, & sanguinis redundantia affuerit. Qui uerò affectu illo laborant quem propriè Nephritin nominant, eam quæ in poplite est tum incidere oportet, aut omninò eas quæ sunt in malleolis uenas.

C O M M E N T A R I U S.

QVOD partes quæ sunt infra thoracem à sectione venarum quæ in poplite, aut malleolis sunt inuentur plurimum, nunc Galenus ostendit dicens: Quemadmodum omnes partes prædictæ, superiores nimirum thorace, & in ipso thorace contentæ, sectionibus venarum in gibbero inuantur: ita quæ thorace inferiores sunt, earum quæ in poplite & malleolis inciduntur. Inferiores autem quas dicat metipse nominatim exprimit, coxam uidelicet, uterum & vesicam. His itaq; partibus laborantibus quæ in poplite, & malleolis sunt venæ incidendæ, quòd cum illis communitatem quãdam obtineant.

Partes infra thoracem quarum sectione inuantur,

Renes

Renes autem in numero prædictarum
& inferiorum thorace partium non cō-
plectuntur, sed planè ancipites sunt,

Renes an- ancipites sũe partes. *ἰσαμφοτέρησι*, in vtranque partem ver-
gunt, mediam naturam habent, & inter
duo genera ita intercedunt, vt in nullo

ἰσαμφοτέ- ῖσι istorum planè censeri queant: id enim
Græcis propriè est *ἰσαμφοτερίζειν*. Infe-

riores enim sunt renes partibus quas
prius recensuimus, collo scilicet & tho-
race. Superiores autem ijs quas secundo
loco commemorauimus, coxa nimirũ,
vetro & vesica. Quum itaq; ancipites
esse renes constet, fit vt interdum venæ
sectionibus quę in gibbero sunt auscul-
tent, vbi videlicet phlegmone recens
est, copiaq; sanguinis affuerit. Quia tũ
reuulsione tantũ humorum ad renes
confluentium opus est, & nequaquam
deriuatione: nulla enim adhuc humo-
rum pars, effatu saltem digna, renes ob-
sider. Ceterũ qui affectu quẽ propriè
νιφρίτιμ Græci vocant, laborare depre-
henduntur, ijs ea quę in poplite est ve-
na, aut omninò quę in malleolis incidẽ-
da erit. Quippe tum retrahendum si-
mul & deriuandum erit, humoris enim
pars

pars adhuc fluit, & pars locum laboran-
tem obsidet. Non possunt autem hæc
commodius fieri quàm per iam dictas
venas, idè incidendæ præ cæteris ve-
niunt. Sciendum etiã hoc loco erit ne- *Nephritis*
phritin vocem Græcis bifariam accipi. *quid.*
Vno modo generatim, pro quouis vitio
renum. Altero priuatim seu propriè
pro renum phlegmone cum vehementi
dolore, quandoq; verò & vrinæ difficili
transitu, in qua fibrosa & arenosa cum
modico sanguine excernuntur. Eius
quod diximus testis est author Introdu-
ctorij seu medici, & Definitionũ libri.

Porro uteri phlegmones magis quã
renum, à uenis in cruribus incisis iuuantur.
Vacuationibus enim quæ in gibbe-
ro fiunt, aliud etiam quoddam accedit
malum, quippe menstruas purgationes
supprimunt, cò quòd sanguinem ad su-
periora corporis reuellunt. Quæ uerò
ex cruribus fiunt, nò solùm reuellūt, sed
& menses euocare solent. Ac quando
hoc facere uolueris, prope tempus con-
sueti mulieri circuitus, tribus aut quæ-

tuor diebus anteuertas, aut uenam inci-
dens, aut mallculos alterius cruris sca-
rificans, parum uacuato. Dein postri-
die eodem modo ab altero crure iterum
similiter uacuato, ut tamen unà istis die-
bus in quibus ita uacuas, & ante hos a-
lijs quatuor aut quinque de extenuate ui-
ctu prospicias. Scriptus est autem à no-
bis seorsum unus liber de extenuate ui-
ctu. Verum mulieribus etiam citra hu-
iuscemodi uictus rationem menses abun-
dè prouocant & calamintha, & pule-
gium. Dare uerò ea oportet in mulsæ co-
cta, & arida tusa, cribroque subtili trās-
missa, ac rursus in mortario trita ut pol-
linem refrant mulsæ insperge. Tempus
uerò potionis optimū est à balneo, in-
uolutis adhuc linteo. Hæc itaque mitia
sunt medicamenta. Vehementiora autem
sauina & dictamnū: cæterum usus præ-
dictis similis. Datur uerò hoc etiā tem-
pore medicamentum quod propriè a-
marum nominatur, centum habens dra-
chmas mixtas aliorum medicamentorū
cuiusque;

cuiusq; sex. Optimum autem est quando Cinamomum acceperit. Hæc quidem obiter dicta sint, quanquam à re ipsa non aliena, eò quòd delationi sanguinis ex utero auxiliantur, cum uacuatione quæ ex cruribus fit, siue malleolis scarificatis, aut incisa quæ ad talum est, aut in poplite uena.

COMMENTARIUS.

Quæ ratione quibûsve auxilijs mēstrua sunt euocanda hoc loco Galenus docet. In primis verò vteri phlegmonem magis à venis quæ in cruribus secantur iuari ait quàm renū, quòd nimirum maior illis cum vtero quàm renibus sit cōmunitas. Venę enim quę ad vterum pertingunt à venis crurum oriuntur. Hinc est quòd venę crurum nō solū ab vtero reuellant, sed & menses euocēt. Quæ propter prædictarum venarum sectione non solū reuulsio, sed & deriuatio fit, ideoq; in vteri inflammationib⁹ incisio eius optima est, vt quę non tantū retrahat, verumetiam deriuet, quod in internis phlegmonibus, vt suprà est ostensum, maximè necessarium est. Proinde

Quæ ratio-
ne quibûsque
auxilijs mē-
strua sunt
euocanda.

Theodori
ci Gauda-
ni erratū.

Sanguinis minus rectè Theodoricus Gaudanus
missionem hunc locum ita conuertit: Quæ verò ex
ex uenis cruribus fiunt, tantùm abest vt retrahât,
poplitis et vt etiam menses promoueant. His enim
malleoli iã verbis negat per sectionem venarũ quæ
retractio - in cruribus sunt fieri retractionẽ, quod
nem, iã de- sententię Galeni plurimum aduersatur,
riuationẽ vt qui disertè dicat has venas non solùm
uocat Ga- reuellere, sed & menses euocare, adeoq;
lenus. deriuare. Atq; hinc fit, vt sanguinis mis-
Quaratio- sionem ex ijs uenis iam retractionem, vt
ne menses hoc loco, iam deriuationem, vt lib. 2. ad
euocãdi, et Glauco. cap. 2. nominet, inquit: Deri-
quo tempo uabis autẽm si quę in poplite sunt venas
re secanda diuiseris. Contrà sanè quę in Gibbero
uena. fiunt venę sectiones ab vtero tantùm ad
 superiora retrahunt, & non deriuant,
 ideo menstruas purgationes non pro-
 mouent, vt dictum est suprà ca. 11. sed po-
 tius supprimunt. Ceterũ quod ad mē-
 sium euocationẽ attinet, sciẽdum quã-
 do hoc nomine venam in poplite, aut
 malleolis, scilicet internis, quas Sa-
 phenas hodie vocant, quæq; vteri malis
 abigendis idoneę sunt, secare volueri-
 mus, hoc sanè faciendum triduum aut
 quatrimum ante consuetũ mulieri cir-
 • cuitũ,

cuitum, hoc est, tēpus vbi purgatio muliebris appetit. Tum enim naturam nobis adminiculantem, vt quæ per id tempus purgare mulierē per vterum soleat, habebimus. Primumq; in altero crure secanda vena. Postero die ab altero crure eodem modo, vt antea, vacuādum erit, ita tamen, vt istis diebus quibus vacuamus, & alijs quatuor aut quinque hos ipsos antecedentibus, victum extenuantem præscribamus. De quo quidem victu scriptus est seorsum liber vnus à Galeno. Atqui hac in parte Aldinus Cræcus codex mutilus & deprauatus est. Restituendus autem in hunc modum erit:

γέγραπται δὲ περὶ τῆς λεπτοῦς διαίτης ἐν ἰδίᾳ βίβλῳ. Ἀλλὰ ταῖς γυναιξὶ καὶ χωρὶς τῆς τριᾶύτης διαίτης ἱκανὰ προῖσθαι κατὰ μὲν

*Græcus
Aldinus
codex emē
datus.*

rum autem verborū is planè sentus est, quem in nostra conuersione expressimus. Ait enim mulieribus citra etiā extenuantē victum abundē posse prouocare menses calamintham & pulegium, propter peculiarem vim incidēdi & extenuandi crassos humores quam obtinent. De Calamintha verò, qua crebri-

*Calamintha idonea
ad menses
prouocandos.*

vsus est Galenus sect. 5. Apho. cōmē. 36:
 ita scribit: Epota medicamenta quæ in-
 cidunt, & humorum crassitudinem ex-
 tenuant, quale est quod ex Calamintha
 fit, quo nos assiduè vtimur, sæpe ciere
 solent tardantes mensium purgatio-
 nes. Duplici verò ratione calamintham
 & pulegium exhibebis. Primò enim in
 mulla cocta bibenda dabis. Et si ea ra-
 tio minus placebit, alteram arripe, nem-
 pe prædictas stirpes aridas tufas, & per
 cribrum subtile transmissas, & iterū in
 pollinem tritas, mullæ insperge, & bibē
 das præbe. Optimum verò tempus hanc
 potionem offerēdi est à balneo statim;
 vbi mulier adhuc linteis est inuoluta.
 Tum enim omnes corporis meatus la-
 xiores adhuc existunt, adeoq; vis medi-
 camēti epoti promptius ad vterum per
 venas peruenire potest. Atq; hæc mitia
 admodum sunt medicamenta. His autē
 validiora sunt sauina & dictamus Cre-
 tica, de quibus in lib. Simplic. Galenus
 & Dioscorides multa. Quòd ad vsum
 autem illorū spectat, à prædictis nihil va-
 riant, sed simili ratione sunt exhibenda.
 Dandum etiam hoc tempore hiera pil-
 cra

*Exhiben-
 di calamin-
 thā & pu-
 legium ra-
 tio.*

*Tempus
 propināda
 potionis.*

*Validiora
 medicamē-
 ta.*

*Hiera pi-
 cra Galeni.*

cra Galeni, quæ tamen sit eiusmodi, vt ad aloës drachmas centum, reliquorum cuiusq; conijciantur drachmæ sex. Hæc enim est picra quam olim omnes, vt testis est Galenus lib. 6. de Tuenda sanit. cap. 9. Romæ præparabant. Optima autem est si Cinamomum accipit, vt ibidẽ etiam scribit Galenus. In penuria tamẽ cinamomi, ponendum pro eo esse optimẽ casie duplum statuit. De compositione Hierẽ picrẽ plura habes apud Galenum in lib. 7. Ther. Metho. cap. 11. Hec quidẽ quæ hætenus dicta sunt euocationi menses vnã cum vacuatione quæ ex cruribus fit, malleolis aut venis quæ in poplite sunt pertusis, non parũ auxiliantur. De mensium verò prouocatione plura diximus in libro nostro 3. de Medendis morbis, cap. 53.

Scio & Ischiadas uno die uacuatione ex cruribus sanatas esse, quæ scilicet non ex frigore, sed à uasis quæ in coxa sunt sanguine impletis factæ erant. Quo circa sic affectis sanguinis missio à uena poplitis, quàm in malleolis commodior est. Scarificatio autem illos mani-

festè haud iuuat.

COMMENTARIVS.

ABSOLVTA vna parte quę infra thoracé est, vtero nimirum, ad alteram, nempe coxam ipsam progreditur, docetq; quę ea laborante & doloribus vexata sit incidenda vena. Nam si Ischias malum oriatur non quidem à causa externa, frigore scilicet, sed propter copiã sanguinis quę in venis coxę cõtinetur, *Poplitis uenæ sectio* poplitis vena incidenda erit. Eius enĩ sectio, ob vicinitatem ac communitatem cum coxa, plus auxilij affert, quàm eius, quę in malleolis est. Fit enim ex vicinis venis, Galeno in lib. de Artis constitutione teste, vacuatio melior. Tamen vbi poplitis vena, qua hodie secari ferè desijt, commodè incidi non potest, ea quę in malleolo exteriori est, quam hodie Ischiaticam, vel barbara admodum voce Sciaticam, nulla alia de causa, quàm quòd coxę doloribus prodest, nomināt, secari potest. Has autem venas secandas esse in Ischiade Galenus etiam libr. 10. de compos. medicam. localium, cap. 2. docet, scarificatio autem malleorum ischiat

ischiatricos non man ifestè iuuat, minus enim educit, quàm opus sit in ista sanguinis copia. Ceterùm coxa nihil aliud est, Galeno etiam capite 21. libri de Ossi *Coxa.* bus authori, nisi os quod amplos cōtinet sinus in quos femorum capita inferuntur. Non meminit autem malorum vesicę, quam tamen in partium diuisione nominatim expressit, quòd scilicet malorum eius, quod ad sanguinis missionem attinet, eadem quę vteri sit ratio. Eundē enim situm vesica & vterus in corpore, Galeno in libello de vteri dissect. teste, obtinent.

CAPVT XIX.

CAeterùm ut summam dicam incipientes phlegmonas reuulsorię uacuare oportet: quę uerò diuturnę sunt, ex ipsis, si fieri potest, laborantibus partibus. Sin minus, ex ea quę ijs maximè uicina est. Incipientibus enim, id quod influit auertere conuenit. In diuturnis autem ipsum tantum quod laboranti parti impactum est uacuare oportet. Vacuabitur uerò id optimè per ut-

nas coeunt cum ijs quæ in partibus
 ipsis sunt sitæ. Huic ræioni experien-
 tia quoq; ipsa testimonio est. Quocir-
 ca ijs quæ in faucibus & arteria uehe-
 menti laborant phlegmone, in princi-
 pio quidem quæ in gibbero est, post hæc
 quæ in ipsa lingua magnificè auxilia-
 tur, ambabus nimirum quæ in ea sunt
 uenis incisæ. Sic etiam in oculis indura-
 tas phlegmonarum reliquias uena quæ
 ad magnum est angulum secta iuuat:
 quemadmodum capitis grauitates, &
 diuturnos in eo à plenitudine dolores,
 uena in fronte incisa manifestè leuare
 solet. Incipientes autem & uigentes, re-
 uulsio per cucurbitam in occipite, in-
 terim quidem ipsam solam, interim etiã
 cum scarificationibus appositã. Verum
 uniuersum corpus antea uacuatum esse
 oportet. Eadem ratione dolores in po-
 steriore capitis parte incipientes & ui-
 gentes, uena in fröte secta iuuat. Quip-
 pe reuulsiones cum uacuatione magis
 fluxionibus incipientibus fieri oportet.

Que

Quæ uerò ab ipsīs laborantibus partibus, aut illis uicinis uacuāt, in phlegmonibus iam ueluti induratis.

COMMENTARIUS.

QUANDOQVAM suprà capite decimoquinto Galenus abundè in qua corporis parte vena sit incidēda docuit: tamen ut hanc rem discantium animis altius infigat, hoc loco iterum, idq; summatim, quæ venæ laborantibus iam corporis partibus sint incidendæ monstranda. re pergit, inquiens. Si pars aliqua phlegmone laborare incœperit, reuulforiè vacuandum erit. Siquidem fluentem ad partem humorem in contrarium trahere, & auertere oportet. Et sunt qui ex hoc Galeni loco inter initia phlegmonum ex oppositis seu cōtrarijs, & distātiſsimis partibus reuellendum esse docere contendunt, quasi uerò reuulsio non fiat nisi ex contrarijs partibus aut maxime distantibus. Parum itaque memores sunt qui in absurda ista opinione versantur, quid alibi, nempe in libro 2. ad Glauconē, scribat Galenus. Ibidem enim disertè utrunq; vacuatiōis genus, *Quæ uenæ laborantibus iā partibus corporis incidenda.* *Confutatio quorumdā nō rectè intelligentium Galenum.*

hoc est tam reuulsionem, quàm deriuationem, per communes venas, id est met ipso intérprete, quæ κατ' ἑξιν, hoc est in rectum sunt, fieri debere tradit. Quod clarius lib. 13. Ther. metho. cap. 9. in eum scribens modum docuit: Satiùs igitur sit, inq̃t, vbi partes quæ in ore sunt phlegmone laborare incœperint: φλεγμαίνοντες ἀρχαίνωνται: derivare ad nares. Pari modo venam quoq; vbi hæ partes sic laborant, incidere humeralem in manu. Si ea non cernitur, mediã. Vbi iecur, thorax, pulmo, aut cor sic afficiuntur, internam. In angina, primas in manibus, secundas eas quæ sub lingua habentur. At ijs quæ in occipite sunt sic afflicti, etiam eam quæ in gibbero est, necnō eam quæ habetur in fronte. Renibus verò & vesica, pudendo & vtero sic habetibus, eas quæ in cruribus sunt sitæ: ac potissimū quæ circa poplitem sunt. Sin minus, eas quæ iuxta malleolum. Perpetuò verò in omnibus, quæ in rectum sunt. Iecore quidem inflammatione laborare incipiente, quæ in dextra sunt manu: liene verò, cōtrā. Hæc ille. Quem sanè locum ideo lubentius subieci, quòd multis quæ hîc dicun

dicuntur lucem afferat, & quòd perspi-
cuè doceat vacuationem reuulsoriã in-
ter initia phlegmonum, atq; ex ijs venis
quæ in rectum sunt, faciendã esse. Porrò
in diuturnis phlegmonib⁹ vbi nihil am-
plius ad laborantem partem affluit, va-
cuãdum quod parti phlegmone obses-
sæ impactum est. Id quod bifariam fieri
potest. Primò, si ex ipsis laborantibus
partibus vacuamus: id quod simpliciter
vacuationem, vt suprã cap. 16. est dictũ,
nominamus. Nam vacuat tantũ, neq;
tamen reuellit, neque deriuat. Quum
enim iam remissus sit dolor, & fluxio re-
stiterit, reliquũ est hoc solũ, vt id quod
in laborante adhuc hæret & impactum
est vacuetur. Ea autem non semper vti-
mur, sed tum solũ, vbi scalpello partẽ
laborantem attingere, & ea scarificata
sanguinem extrahere licet. Addimus au-
tem præter partis sectionem aliquando
hirudines, cucurbitulas, aut earum vi-
ce cornua, aut vitra cum igne. Idq; non
alia de causa, q̃ vt ea quæ in parte labo-
rãte coaceruata sunt educamus. Quòd
si verò ex parte laborante vacuare adeo
quæ prima ratione vti nobis minus sũt

*Vacuatio
simplex.*

integrum, ad alteram nobis progredien-
dum erit, quæ scilicet ex ijs quæ maximè
vicinæ sunt partibus laborantibus venis,
hoc est, ijs quæ coeunt & uniuntur. Id
enim est *συνκείμενων* Græcis: cum his ve-
nis quæ in laborante sunt particula, va-

Deriuatio cuat. Ea autem vacuationis species de-
riuatio propriè, ut loco paulò antè cita-
to ostensum est, dicitur. Prædicta præce-

Phlegmo-
ne fauciu. pta Galenus exemplis aliquot illustrat:
quorum primū est de phlegmone fau-
ciū & arteriæ, hoc est angina, in qua prin-
cipiò vacuandum erit ex gibbero, id est
humerali vena. Dein ex venis quæ sub
lingua sunt, ut patuit ex verbis quæ pau-
lò antè ex Galeni The. methodo citauimus,

φάρυγξ, hoc loco erit per *φάρυγγα*, fauces esse in-
telligēdas, non obstante quòd interdū
etiam guttur significet. Nam quum si-
mul etiam asperæ arteriæ, cuius quidem
guttur pars est sumēda, mentio hīc fiat,
ne eandem partem bis nulla alia inter-
ueniēte nominasse videatur, per *φάρυγ-*
γα, fauces accipiendæ erunt, utpote in quibus
Phlegmo-
ne oculorū. perinde atq; in gutture angina fieri
solet. Alterum exemplum quod affert

Galen

Galenus, est de phlegmone oculorum, in qua itidem initio humeralis inciden-
da erit, dein verò vbi reliquæ phlegmo-
nis induratae fuerint, quum non liceat
ex ipsis oculis vacuare quod ijs infixum
est, ex maximè vicina vena, vt est illa
quæ ad magnum eius angulum existit,
vacuabimus. Hæc enim vnita est venis
quæ in oculo sunt, Tertium est de capi-
tis grauitatibus, & à plenitudine natis
doloribus diuturnis, in quibus frontis
venam sectam manifestè ait iuuare. In-
cipientibus autem & vigentibus dolori-
bus reuulsio per cucurbitã in occipite
appositam vel se solam, vel cum scarifi-
cationibus, prodest. Ceterum antequã
cucurbita vsus fueris, præstat totum cor-
pus per humeralis vocatæ venæ sectionē
vacuatum esse. Cuius quidē rei causam
reddit Galenus, ca. 95. Artis medicæ, in-
quiēs: Si vniuersum corpus plus æquo
plenum fuerit, per laborantem partem
minimè vacuandū. Nā si scarificationi-
bus aut sectionibus sensibilibiter vacuabi-
mus, plus ratione excitati doloris attra-
hemus. Si verò calefacientibus disperge-
re tentabimus: plus erit id quod vi calo-

*Dolor ca-
pitis.*

*Ante cu-
cubitæ
usum cor-
pus vacuã-
dum.*

*si corpus
erit plenum
vnde & la-
borante parte
non erit u-
acuandum*

ris ad partem adtrahetur, quàm disper-
sum. Quòd si in eo elaborabimus, vt
quod influxit retrocedat, corpus plenū
non admitteret. Adhęc igitur ambo totū
corpus vacuare oportet, aut omnino ad
contraria loca, quod laboranti parti in-
fluit, attrahere. &c. Pari ratione, corpore
nimirum prius vniuerso vacuato, dolo-
res in occipite incipientes, aut vigen-
tes, vena in fronte secta iuuat: iuxta
hoc Hippocratis. Dolenti postero-

3. aph, 68. incisa prodest. In cuius sententię explica-
tione in nostris commentarijs plura ad
institutū facientia reperient studiosi. In
fine huius capituli iterum generale prę-
ceptum de vacuationibus, cuius ab ini-
tio meminit, repetit, dicens: Fluxioni-
bus incipientibus esse retrahendum cū
vacuatione: hoc est reuulsione & deri-
uatione vtendum. Neque enim hoc lo-
co vacuatio aliud quàm deriuationem
significat. Qua quidem in significatio-
ne nō rarò hac voce vtitur Gale. Nem-
pe lib, 2. Vict. acut. morb. com. 10. vbi in-
quit, Venam in gibbero secare oportet,
quę sanguinem à laborante parte & ma-

gis &

*Fluxioni-
bus incipi-
entibus re-
uulsione et
deriuatione
vtendum.*

gis & velocius tum reuellere, tū vacua. *Vacuatio*
 re possit. Et lib. 13. The. meth. cap. 9. vbi interdū idē
 in eum scribit modū: Ergo pariter tum quod deri-
 reuellendus, tum vacuandus qui ad, ie. *uatio signi*
 cur fluit sanguis est, interna in dextro *ficat.*
 gibbero secta vena, propterea quòd in
 rectum sita sit, & ampla via cum vena
 quæ caua dicitur, societatem habet. Por-
 rò vbi diuturnæ fuerint phlegmones ab
 ipsis partibus laborantibus, & illis ma-
 ximè vicinis, vt comprehensum est, va-
 cuandum erit.

In quibus autem corporibus nulla
 dum particula laborat, ceterum Vere
 ineunte uacuationem anteuertimus, in
 ijs, si quidem homo ille quotannis æsti-
 uo tempore febribus morbis capi con-
 suevit, dum redundātiā eorum, quæq;
 morborum generationi opitulantur, ua-
 cuare studemus, quæuis pars ad sangui-
 nis detractiōem eiusdem conditionis
 & sortis est, quemadmodum utiq; si
 arthriticus fuerit omnibus articulis la-
 borans. Quibus uerò pars quæpiā nisi
 prius uacuati fuerint præcipuè in se-

statur, haud æquè ex quauis particula
 uacuationem moliri oportet, sed per=
 inde atq; in ijs quæ iam laborare inci=
 piunt. Quocirca podagricos ex gibbe=
 ro uacuabis: comitiali autem morbo &
 uertigini obnoxios potius ex cruribus.
 Si uerò propter retētas hæmorrhoidas
 sanguinē miseris, si quidē cohibere has
 uoles, eas quæ in manib. sunt, sin elicere,
 quæ in cruribus sunt uenas secare opor=
 tet. Verum in ijs quibus suppressa sunt
 menstrua, semper quæ in cruribus sunt.
 Non enim ut in hæmorrhoidibus quidā
 liberari eiusmodi uacuatione uolūt, qui=
 dam uerò habere cupiunt: ita quoq; in
 menstrua purgatiōe res se habet. Quip=
 pe uacuatio per hæmorrhoidas susce=
 ptæ est, ne in tantam euadat immodera=
 tionem, ut aut hominem protinus interi=
 mat, aut omninò hydropicum, aut ma=
 lo corporis habitu præditum reddat. At
 per uterum purgationibus, ut quæ natu=
 rales sunt, tale nihil accidit. Euenit tamē
 aliquando ut etiam ex utero propter
 erosi

erosionem sanguis erumpat, in quibus non idem est curationis scopus. Non enim effluere sanguinem, ut in menstuis, sed planè sistere consilium est. Communis igitur in ijs omnibus qui Vere ineunte ad sanguinis missionem ueniunt hæc ratio est, si quidem præcipuè infirmam aliquam partem habeant in quam quæ coaceruatur plenitudo decubat, reuulsoriè ut uacuemus. Si uerò tale nihil sit, unde cuique magis placebit, excepta tamen hæmorrhoidis, aut mensium suppressione, ut paulò antè definitum est.

COMMENTARIUS.

Quæ venæ secundæ sint partibus corporis nondū laborantibus hoc loco Gassecundæ sint lenus docet. Nam si Vere ineunte, quo potissimum tempore vacationi studendū dum laboratibus, in corporibus quorum nulla adhuc particula laborat vacatione anteuertere morbos cupimus: ut si homo quispiam æstiuo tempore singulis annis febribus capi cōsueuit: dum redundantiam eorum, quæque morborum generationi opitulantur: nam id ipsum

χειρῖα. vox χειρῖα significat, ut paulò post
latius dicemus: vacuare conamur, quæ-

*Qui vacua-
tur nulla
parte labo-
rante mi-
hil refert
in qua par-
te uena se-
ces*

uis pars ad sanguinis detractionem eius-
dem est conditionis & sortis: hoc est
nihil refert tum qua in parte venam se-
ces. Perinde atq; si quis omnibus parti-
bus, ut arthritici, laboret, Nam quum o-
mnes ex æquo laborent, parū refert qua
ex parte sanguinem mittas. Si verò pars
quæpiam, nisi prius vacuemus, præcipue
infestatur, tunc non æquè ex quauis par-
ticula vacuationem molimur, sed sicut
in ijs quæ iam laborare incipiunt pluri-
mum refert quam venam feces, ita etiā
tum ubi vna aliqua præcipuè infestabi-
tur. Quapropter podagrici ex gibbero
vacuandi sunt, quòd hac ratione hu-
morū ad pedes defluxio & impetus in
cōtrariū trahatur. Comitiali autē mor-
bo & vertigini obnoxios, ex cruribus
candē ob causam vacuare oportet. In re-
tentis hæmorrhoidibus, si eas ita reten-
tas seruare ac cohibere studemus, venas
quæ in manibus sunt, quòd humorū flu-
xum in contrariū agent, incidemus. Si
verò hæmorrhoidas elicere cōsiliū est,
eadem de causa quæ in cruribus sunt ve-

nas incidere oportet. Menstruis autem *Menstruis*
 suppressis, perpetuò venas quæ in cruri- *suppressis*
 bus sunt secabimus. Cuius rei hæc ratio *perpetuò*
 nem reddit Galenus: Nemo enim, inquit, uenæ quæ
eiufmodi vacuatione quæ per mēses fit in crurib.
perinde atq; ab hæmorrhoidibus libera sunt secan
ti vult, utpote quæ naturalis sit, & cor. da.
pius ab omnibus excrementis expurget.
 Quod autem nōnulli ab hæmorrhoidi-
 bus liberari velint, hæc ratio est. Quip-
 pe metus est ne aliquando hæmorrhoi-
 dum vacuatio in tantam euadat immo-
 derantiā, ut hominem vel protinus in-
 terimat, virtute nimirum prorsus extin-
 cta, vel aquæ inter cutem, vel malo cor-
 poris habitui, ob iecur per hanc vacua-
 tionē immoderatam refrigeratum, ob-
 noxium reddat. Hinc est quod Galenus
 li. 3. de Laboratibus partib. ca. 6. ita scri-
 ptū reliquerit: Proinde ratioi magis cō-
 sentaneum est, ut ob visceris refrigera-
 tionē cibus distributus in sanguinē trās-
 mutari non possit. Quinetiam refrige-
 rantur cum ipso vniuersi corporis venæ,
 idq; maximè ubi nullo plerunq; tumore
 in iecore apparente, laborans aqua in-
 ter cutē molestari videtur, vitio existē-

te vel in liene, vel ieiuno, vel tenui intestino, aut mesenterio, vel pulmone, vel renibus. Aut etiam ubi plurimus per hæmorrhoidas sanguis excernitur. Hæc ille. Quum verò in purgationibus quæ per uterum fiunt naturalibus nihil tale accidat, ideo nemo ab ijs vult liberari. Caterum accidit interdum ut sanguis ex utero erumpat, non quidem naturæ ratione, quæ per hunc uniuersum expurgaret corpus, sed propter erosionem venarum. Et tum planè is sanguis per commodam curationem, & ijs medicamentis quæ erosionem sanant, suppressendus erit. In fine huius capituli Galenus quæ iam dicta sunt summatim perstringit, inquit: Communis igitur in omnibus qui Vere ineunte sanguinem mittunt hæc est ratio, ut si vnâ aliquâ præcipuè infirmam partem habeant in quam quæ colligitur plenitudo decumbat, reuulsorie vacuetur, atque interdum ex distantissimis. At si nulla pars præ cæteris plus affligatur, ut ex quacunque parte magis placebit vacuemus, excepta tamen hæmorrhoidum & mensium retentione, in qua vacuandum perpetuo erit

erit ea ratiōe quæ paulò suprâ est, definita & exposita, licebit. Quod ad vocē χορηγίαμ attinet, sciendū hāc Græcis nihil aliud significare nisi δόση, hoc est dationem, contributionem, suppeditationem ūe. Vsus est itaque ea hoc in loco Galenus μεταφορικῶς pro redūdātia quæ ad morbi generationē suppeditatur. Vt enim alicui ad vitæ sustērationē necessaria suppeditātur, ita quoq; corpus plenum ad morbi generationē redūdantē materiā, quā χορηγίαμ nominat Galen⁹, suppeditat. Præterea in Aldino codice Græco dictio vna, nēpe κατασκήπει desideratur. Legēdū igitur hoc modo erit ἰφ' ὃ τὸ ἄθροισμένον πλῆθος κατασκήπει: in quā coaceruata decūbit plenitudo.

*Aldinus
codex græ-
cus emen-
datus.*

CAPVT XX.

DE hoc quidem in superioribus potestate dictū est. Veruntamen præstat & nunc omnia percurrere, omnibus quæ antè dicta sunt in unū hūc sermonem coaceruatis, & unā definitis quæ minus sunt distincta. Igitur in summa hoc sciendū primum, quòd in sanguinis missione dierū numero non sit

attendendum, quemadmodum nonnulli scripserunt, & quidam utique admodum ridiculè post tertij diei acceſſionē, quando uidelicet, ut aiunt, iam dignotionem aliquam habemus qualis ſit forma & morbus, totaq; ſua natura morbus. Alij uerò extremum terminum mittendi ſanguinis quartum definiunt diem, intra quem utique ut ſanguis mittatur in acceſſionum interuallis, quando libuerit decernunt. Alij uerò auferre feſtinant, quibus ſanguinis detractiōe ex uſu eſſe definiunt, eo etiamnum tranſſuente, & nondū in aliqua parte ſuperuacua recipiente firmiter retento: unū ſolummodo cōſiderantes, num cibi in uentriculo cōcoquendi corruptio aliqua facta ſit, aut tarda cōcoctio, aut etiam cibi ab eo amplectantur. Quòd igitur maturandū ſit in quibus uacuatio ex uſu eſt, niſi ubi prius cibos, & in primis uenis ſemicoctos humores cōcoqui oporteat, rectiſſimè dicunt, eiſq; credendum eſt. Verum quoniam ſæpe poſtquàm aliquis

dies

dies iam quinque; aut sex agrotauit ad curationē accersimur, expedit utique sanguinē mittere etiā si huius remediij prima occasio sit prætermissa. Quocunque enim die mittendi sanguinis scopos in agrotante inueneris, in eo præsidium hoc adhibeto, etiam si uigessimus ab initio morbi dies fuerit. Quis nam uerò fuerūt hi scopi? Magnus morbus, uirium robur, excepta ætate puerili, & ambiente nos aëre admodum calido. Quoniā uerò tēporis progressu in plurimis morbis uirtus exoluitur, ideò mittendi sanguinis occasio dierū numero amittitur, nō quòd idipsum primariò efficiat, sed interueniente aliquo, priusquā scilicet uirtus dissoluatur. Proinde ubi altero à principio die aliquādo uirtus exoluta uidetur, à missiōe sanguinis abstinebimus.

COMMENTARIUS.

PERCVRIT hoc capite Galenus, & summatim perstringit quædam in superioribus potestate dicta, ijsq; exquisitiorem distinctionē adhibet. Docet autem

In sanguinis missione non esse prima-
nis missio- rio attendendum numero dierum, quē
ne non esse admodum nonnulli fecerunt, quod nō
primario rarō dierum numero occasio ipsa, quæ
attenden- præceptum est, Hippocratis etiam testimo
dum nume- nio, amittatur. Porro qui in sanguinis
ro dierum. missione dierum numerum observaue-

runt, inter se non conueniebant, quod
 scilicet nonnulli fuerint qui ridiculè ad-
 modum non nisi post diei tertij acces-
 sionem sanguinem esse mittendum sta-
 tuerunt, ijq; Diatritarij dicti sunt, quod
 ante tertiū diē neq; cibū neq; medica-
 mētum ullū exhibuerint. Ante diē enim
 tertium nullā medicum habere posse di-
 gnotionem qualis sit morbi forma, aut
 qui eiusdē mores, & quæ sit vniuersi ei⁹
 natura censebant, quemadmodum mul-
 tis in locis, præsertim autem lib. 8. Ther.

Accessio.

metho. cap. 3. Galenus monstrat. Per ac-
 cessionem autem hīc deterius tempus
 totius circuitus, hoc est principiū, au-
 gmentum, & vigorem intellige. Exclu-
 ditur itaq; remissio & intermissio, vt
 quæ totius circuitus tempora sint me-

Forma morbi. liora. Forma autem quam ἰδιὰν vocat
 Galenus, nihil est nisi species aut diffe-
 rentia

tentia morbi, vt testatur libro 1. Epide.
 const. 3. com. 1. Galenus. Nihil itaq; re-
 fert siue differentiam, siue speciem, siue
 formam *πρόπον* Græci nominant, dicas. *πρόπ* Θ.
 Mos verò morbi non est nisi eius boni- *Mos mor-*
 tas aut malitia. Hinc morbus qui mini- *bi.*
 mē malus est, Græcè *ἐνθήης* dicitur, vt est
 apud Galenū lib. 3. Progn. com. 2. Mor-
 bi autem mos ex eius maximē sympto-
 cernitur. Alij verò extremum terminū
 mittendi sanguinis definierunt diem
 quartū, ita vt à quarto die nulli esse inci-
 dendā venā putauerint. Intra quartum
 autem diē concedebant mittendū esse
 sanguinē, idq; in accessionū interuallis
 seu remissionibus quādocūq; libuisset.
 Interuallū autē remissiōne, Græcis *Αιά-* *Interuallū.*
λεμμα dicitur, est Gale. lib. 1. de Iudicijs
 teste, quādo accessio in quietē febre va-
 cantē defluit. Et notandū quidē hoc lo-
 co Aldinum codicem, esse mutilum &
 deprauatum, legendumquē in hunc *Aldinus*
 modum, antiquo confirmante in- *codex em-
culatus.*
 terprete, erit: *ἐνιοι δὲ ἄρ μὲν ἐσοχάτα*
τομ ὄρον τῆς φλεβοτομίας εἶναι πλὴν τετάρ-
την ἡμέραν ὀρίζουσι, ἐφ' ἧ ἄρ φλεβοτομήν
ἐν τοῖς τῶν παροξυσμῶν διακλίμμασι.
 &c.

&c. Alij fuerūt qui festinauerūt sanguinem detrahēre ijs quibus ex vsu esse cē-
suerūt eo adhuc transfluente, & nondū
in parte aliqua firmiter retento, vnum
tamen considerantes, num scilicet cibi
in ventriculo corruptio aliqua facta sit,
aut tarda concoctio, aut etiam cibi ab
eo amplectantur. Quando enim ven-
tricus non probē amplectitur, aut nō
tantisper donec concoctio perficiatur,
ventriculi actionem lædi necesse est.
Quandocunq; igitur vnū ex iam dictis
accidebat, prædicti medici, etiam adhuc
transfluente sanguine, venam non inci-
debant. Atq; hæc quidem veterū quorū-
dam medicorum qui dierū numerum
in mittendo sanguine obseruandum
esse statuebant fuerunt sententiæ. De
quibus quid sentiat Galenus nunc ex-
plicabimus. Quod, inquit, festinādum
sit in ijs quibus vacuatio competit, nisi
vbi cibi crudi, aut semicocti in primis
venis, hoc est ijs quæ iuxta iecur & me-
senterium sunt (ita enim metipse Gale-
nus lib. 12. Ther. metho. capite 3. inter-
pretatur) humores sunt, rectissimè di-
cunt, eisq; credendum est. Nam crudi-

*Primæ ve-
næ quæ.*

tate existente in ventriculo, & in primis
venis existentibus humoribus semico-
ctis, incidenda vena non erit. Incisa enim
vena crudos aut semicoctos humores in
totum, ut copiosius lib. 4. de Tuend. sa-
nit. cap. 5. Galenus docet, corpus attra-
bit. His vero malis non presentibus, fe-
stinandum ut primo quoque tempore, ijs
quibus ex usu est sanguinis detractio,
vena secetur. Iuxta consilium quidem
Hippocratis, qui ita scriptum reliquit:
Quum morbi incipiunt, si quid moue- 2 Aph. 19
dum videtur, moue. Ceterum in eo ve-
teres errauerunt, quod extremum ter-
minum mittendi sanguinis statuerunt
quartum diem, & quod non nisi etiam non
transfluente sanguine, & nondum in ali-
qua parte fixo venam esse secunda pre-
ceperunt. Sepe enim accidit ut medicus
ad ægrotum ante quintum vel sextum
diem non accersatur, ita ut ex illorum pre-
scripto sanguinem mittere haud possit.
Expedi tamen nihilo secius sanguinem
mittere, etiam si huius presidij prima oc-
casio, reuellendi scilicet, sit pretermissa.
Derivationis enim humoris qui ad la-
borantem partem confluxit occasio non
dum

numerus. Nam si statim altero à principio morbi die virtus exoluta videtur, à missione sanguinis abstinemus, tantum abest ut dierum numero certo, quarto nimirum diei, hoc sit acceptum referendum. Quapropter potentia etiam in scopis venæ secandæ præcipuis, de occasione dictum est. Amisso enim robore virtutis, amittitur una mittendi sanguinis occasio. Et hoc loco Græca in Aldino codice depravata sunt. Legendum enim ita erit: *οὐ πρῶτον τὸ πρῶτον ἰσχυρὰ μὲν, ἀλλὰ ὅτε μὲν* &c. Id est, non primo hoc efficiente, scilicet numero dierum, sed per medium, nempe priusquam virtus dissoluatur.

*Aldinus
græcus co
dex emen-
datus,*

CAPVT XXI.

QUOD uerò in ipso rursum die in quo sanguinem mittimus obseruare oporteat febris inclinationem, notum esse arbitror. Quamquam quibusdam non est cognitum, qui mane tantum uenam secandam esse præcipiunt, aut quod longissimum est, usq; ad quintam aut sextam horas. Verum

Verum si quis memoria tenet quæ ante toto hoc libro dicta sunt, nihil in ijs errabit, quauis utiq; dici noctisq; hora, modo respiciat in febrientibus particularium accessionum declinationem, sanguinem mittens. In quibus uerò uel propter lippitudinem, uel aliud eiusmodi citra febrem hoc auxilio opus est, non declinationem omninò non existentis febris, sed magnitudinem doloris, aut phlegmones, aut totius affectus in quo sanguinis missione opus est, inspicere conuenit.

COMMENTARIUS.

In febribus Quid in mittendo sanguine sit obser-
quo tēpore uanda seu expectanda accessionis de-
mittendus clinatio ab initio huius capituli Galen⁹
sanguis. monstrat. Nam ut in ipsa accessione da-
aph. ii. re cibū, Hippocrate teste, non oportet,
et 4 uict. ne naturam à morbi concoctione auo-
acu. 34. cemus: ita quoq; reliqua præsidia, san-
Accessio. guinis nempe missionem, purgationē,
 & id genus alia hoc tempore non sunt
 adhibenda. Per accessionem uerò dete-
 rius totius circuitus tempus intelligen-
 dum

dum erit. Quare neq; in principio, neq;
 in augmēto, neque etiam in vigore ac-
 cessionis sanguinem mittere oportet.
 Hæc enim deteriora sunt tempora: sed
 in declinatione potius febris. Hinc per-
 spicuum fit omnibus Theodericū Gau-
 danum hunc locum pessimè ita conuer-
 tisse, cauenda est febris declinatio. Non
 enim vult Galenus vt declinationem ca-
 ueamus, sed hanc potius obseruandam
 atq; expectandam planè esse (id enim
 significat vox ἐπιτηρῆσαι) præcipit, imò
 hoc verè doctis notum esse ait. Sunt ta-
 men quidam qui hoc ignorant, vt qui
 perpetuò mane secandam esse venā, aut
 quod longissimum est, vsq; ad quintam
 aut sextam horam, hoc est ante meridiē.
 Loquitur enim Galenus hoc in loco de
 horis inæqualibus, quibus Iudæi olim
 etiam vsi sunt, diem & noctē partibus
 horis inæqualibus distinguētes. Quo-
 ties enim sine determinatione, vt alibi
 etiam monstrauius, Galenus horarū
 meminit, semper inæquales intelligen-
 dæ veniunt, quarum certè prima orien-
 te sole incipiebat, sexta verò semper me-
 ridies, vt duodecima occasus solis, fuit.

*Theodori
 ci Gauda-
 ni erratū.*

*Horæ inæ-
 quales.*

Putauerunt itaque prædicti medici matutino tantum tempore secundam esse venam, vel certe ante quintam & sextam horas, hoc est planè ante meridiem. Neque id sanè sine maximo errore, quòd scilicet non rarò in id temporis febris accessio incidat, in qua sanguis detrahendus nunquam erit, siue vespertinum, siue matutinum tempus fuerit. Quapropter qui memoria tenet quæ supra capite nimirum duodecimo, dicta sunt, is utique quavis diei noctisque hora sanguinem mittens nihil errabit, modo in ijs qui febri citant particularium accessionum declinationem respiciat. Hoc est, medicus non errat mittens sanguinem in febribus quacunque diei aut noctis hora id faciat, modo illa sit extra accessionem, & in tempore declinationis febris. Cæterum in alijs affectibus qui vacant febre, Galenus solam magnitudinem in mittendo sanguinem esse considerandum hortatur. Quapropter in lippitudine, & id genus alijs malis in quibus, venæ sectione opus est, non declinatio febris, quandoquidè ægrotantes febre vacent, nullaque adsit, sed doloris, aut phlegmones,

nes, aut totius affectus magnitudo inspicienda erit, vt supra ca. 9. fusius diximus.

Quum uerò nihil eiusmodi urgeat, aut prohibeat, præstat mane uenam secare, non confestim à somno excitis, uerū horam circiter unam iam antea uigilantibus. dictum est autem quòd & uti balneo quibusdam expedit. Quòd si uerum est, & præeunte quoq; deambulatione uti nonnullis utile est. Cæterum quibus Vere ineunte uenam incidere conamur propter febris metum, aut alterius cuiuspiam affectus, quibusdam etiam post quam solitorum operum quipiam obijssent, siue in ludo literario, siue in officinis, siue in foro, siue in ædibus misisse me sanguinem noui. Iteratæ tamen detractionis, in quibus utique simpliciter uacuare studemus, tempus eodem die esto. At in quibus reuellere conamur, si uel duobus deinceps diebus fiat, melius fuerit. In omnibus uerò his laborantis uires te attendere oportet, manu illius arterias contin-

gentem: Sunt enim quidam quorum vires tam facile laborant, ut confertam uacuacionem ferre non queant. In quibus reſecto primo die egrotante, ſecundo detractiōem iterare conuenit.

COMMENTARIUS.

Matutinū QVANDO nihil eorum quæ pauld
tēpus quā. antè dicta ſunt vrget, aut prohibet, tunc
do aduenā Galenus conuenientiſſimum ſecandæ
ſecandā cō venæ tempus, matutinum eſſe ait, non
uenientiſſi quidem conſeſtim nobis à ſomno exci-
mum. tis, ſed antea horam circiter vnam vigi-
 lantibus, & corpus ab excrementis tum
 per vrinam, tum per aluum expurganti-
 bus. Quæ ſequuntur in cōtextu in Græ-
Quibus bal cis codicibus deſiderantur, ex veteri au-
neo ante ue tem conuerſione ſunt reſtituta. Dicit ve-
na ſectio. rō expedire quibusdam vt balneo vtan-
ne ſectio. tur, ijs nimirum quibus venæ procul à
ne ſectio. viſceribus diſtātes ſecantur, & qui craſ-
pedit. ſiorem in venis obtinent ſanguinem. Is
 enim balnei calore liquatus ac diſſolu-
 tus, promptius eſfluit. Quo ſanè nemi-
Nonnullis ne, nempe vt incaleſcat corpus, deambu-
ante uenæ latione quoq; vti nōnullis vtile eſt. Cæ-
ſectionem terùm ſubdit Galenus ſe nōnullis qui-
 bus

bus ineunte Verino tempore, propter *uti deam-*
 metum febris in æstate futuræ, aut alte. *bulatione*
 rius cuiuspiam affectus venam inci. *utile est.*
 dere conatus est, sanguinem misisse,
 postquam solita munera in ludo litera
 rio, vel officinis. vel foro, vel domi ob-
 iissent. Vt hinc etiam clarum sit inter-
 dum etiam longius quàm horam vnam
 à somno excitis sanguinè detrahi pos-
 se. In fine huius capituli de iterata sangui-
 nis detractiōe præcepta affert, nempe *De itera-*
 in quibus simpliciter vacuare & citra re- *ta sangui-*
 uulsionem studemus, ijs eodem die san- *nis detra-*
 guis iteratò mittendus erit. In quibus *ctione præ-*
 autem reuellere conamur, melius est *cepta.*
 detractio duobus deinceps diebus fiat,
 quemadmodum suprà quoq; cap. 12. do-
 cuit, reuulsionem inquit eò fieri effi-
 caciorem, quò maiorem in numerū par-
 ticulares detractiōes auctæ fuerint. Na-
 tura siquidem toties irritata ea quæ ad
 partes laborantes confluunt maiori cū
 impetu in contrarium locum depellere
 assuescit. Hinc etiam est quod lib. 4. de
 Tuenda sanit. cap. 8. ita scriptum reli-
 querit: Idcirco detractiōem sanguinis
 etiam secundo die iteramus. Aliquando

verò & in tertio, vbi videlicet & reuelle
re, & ex alijs in alia transferre visum est
conducere. Tamen medicū esse pruden
tem in ijs vacuationibus, ac diligenter
laborantis vires attendere oportet, ma
nu sua sanguine adhuc effluente arte
rias contingentem. Sunt enim nonnulli
viribus tam imbecillis, vt confertam va
cuationem ferre nō queant, tantū ab
est vt iteratam sanguinis detractionem
tolerare possint. Illis igitur, primo die
conuenientibus cibis reſectis, adeoq; vi
ribus firmatis, secundo sanguinis detra
ctionem iterare decet. Atq; hæc dixisse
de venæ ſeſtione ſatis ſit.

CAPVT XXII.

QUOD autem ueteres arterias ap
pellant uenas, & à nobis alibi de
monſtratum eſt, & ante
nos alijs conſeſſum fuit. Ob hoc igitur
ipſum, & præterea doctrinæ affinitatē
melius eſſe mihi uiſum eſt haud ſcribe
re alium de arteriarū ſeſtione librum,
ſed orationi de uenæ ſeſtione adnecte
re, & hoc ipſum in ea parte in qua cō
ſiderem

sideramus quas uenas in quibus laborantibus partibus incidere oporteat. Vt enim alias uenas in alijs partibus secandas esse monstrauiamus: sic utiq; & quæ in temporibus sunt arterias, & quæ post aures, medici incidere consueuerunt. Eas quidem quæ in temporibus sunt, in defluxionibus ad oculos tum calidis tum spirituosiss. Post aures uerò in uertigine laborantibus potissimum, & ijs qui diuturnis capitis calidis & spirituosiss doloribus infestantur. Iam uerò & propter alia mala in capite consistentia diuturna nonnulli arteriarum post aures sectione usi sunt, non tamen in alia aliqua parte laborante hoc usi sunt remedio, tametsi multi sunt quibus eo magis quàm uenæ sectione opus est. Vbi enim calidus sanguis & spirituosus in arterijs coaceruatus infestat, hîc communibus laboranti parti sectis arterijs opus est. Verùm quòd arteriæ difficulter compescantur, ideò medici eas incidere non audent. Quum etiam si

qui secantes uenam uulnerarint arteriam, ægrè confestim sanguinis eruptionem sistant, ac ubi res optimè cadat ad cicatricem perducta diuisione, tamen aneurisma fiat.

COMMENTARIUS.

DE arteriarum sectione, propter doctrinæ affinitatem, in hoc cap. agit Galenus, docetque initio veteres arterias *Veteres arterias appellauerunt uenas.* appellasse uenas, id quod in li. 6. de Placitis Hippocratis & Platonis, & in eo cui titulus est, *Quod animi mores sequantur temperaturam corporis*, & multis alijs locis copiosius monstrauit. Sufficiat autem eius rei vnum saltem exemplum ex Hippocrate protulisse. Is enim lib. 6. Epid. parte 6. Aph. 2. disertè venam pro arteria accipit, dum ita scribit: *ἐν θερμότητι τοῦ φλέβιον αἵματι πλείθει ἀνίσχη τὸ καυσῶδες.* Hoc est, arteria sanguinis copia ubi calidissima fit, fuliginosum quid oritur &c. Vide nostros in hanc sententiam conscriptos commentarios. Doctrinæ autem ratio planè requirebat, ut hoc in libro, in quo id potissimum docetur in qua parte laborante sit

fit secanda vena, ageret etiam de arteriarum incisione, ne sibi subinde nouus *Quæ arte-*
 aliquis liber exarandus foret. Docet *ria incidē*
 etiam hoc in capite Galenus quæ arte-
 riæ, & in quibus corporis malis sunt
 incidendæ. Eas siquidem quæ in tem-
 poribus sunt, & post aures Medici seca-
 re consueuerunt. Et eas quidem quæ in
 temporibus sunt, quando defluxio ali-
 qua calida & spirituosâ fertur in ocu-
 los. Eam enim tum vniuersum hac secta
 arteria exhauriunt. Quæ verò post au-
 res sunt tum secant, quum vertigo ali-
 quem, aut diuturnus capitis dolor à ca-
 lido & spirituosâ sanguine natus infe-
 stat. Quod autem vertigine vexatis ve-
 teres arterias post aures secuerint, testâ-
 tur ea quæ lib. 3. de laborantibus locis, *In vertigi-*
 cap. 8. in eum scribit modum: Quamob- *ne arteriæ*
 rem, inquit, nonnulli vertigine laboran- *post aures*
 tium ab arteriarum sectione præsidium *secandæ.*
 petierunt, arterias pone aures ad tantam
 scilicet altitudinem secantes, vt medius
 inter duas partes locus cicatrice indu-
 ceretur. Sed constat non omnes huius au-
 xilij beneficio curari. Etenim aliæ arte-
 riæ ijs maiores ad cerebri sustentamen-

tum per retiformem vocatam membranam ascendunt, per quas huiusmodi malum fieri rationi consentaneum est, elato p ipsas vaporoso calidoq; spiritu atque implente cerebrum. Hæc ille. Cæterum fuerūt qui etiam in alijs diuturnis capitis malis arteriarum post aures sectione vsi sunt. Tamē in nulla alia parte laborante hoc remedio, tametsi eo magis quā venæ sectione indiguerint laborantes, vti voluerunt. Nam vbicunq; calidus & spirituosus sanguis in arterijs coactus molestat, hic sectione arteriarū quæ cum laborante parte communitatē habent, opus est. Par verò est sanguinē in arterijs esse calidiorem, feruentiorē, & magis spirituosum, quòd scilicet ex corde oriantur arteriæ, quòd natiui caloris, & vitalium spirituum fons & origo est, vt in lib. de Formatione fœtus, & lib. 6. de Placitis Hippocratis & Platonis Galenus fufius docet. Porro in fine capitis causam affert quare Medici incidere arterias metuerint, nēpe quòd difficile compescatur & constringatur ex ijs effluens sanguis: id em̄ est quod ait, *διὰ τὸ δύσκολον χεῖρ.* Præterea si secantes venam

Quare Medici incidere arterias metuerint.

venam simul etiam vulnerent arteriam præter id quod ægrè sanguis sistitur, raro rectè glutinantur arteriæ, & si res ad cicatricem perducta arteriæ diuisione optimè cadat, tamē fit ἀνεύρισμα. Quod adapertæ arteriæ malū est, ac fit vbi in ἀνεύρισμα. cumbens ipsi arteriæ cutis ad cicatricē quidem peruenit, manet autem vulnus, arteria nec coëunte, nec glutinata, nec carne obturata, quemadmodum in lib. de tumoribus præter naturam Galenus scribit.

CAPVT XXIII.

QUIM & interiisse quosdam nouimus à sectione arteriæ interiori in gibbero uenæ subiectæ. Nonnullos autem confestim ob uinculum iniectum, Medicis errantibus, ut sanguinis eruptio in gāgrēnā trāsiret: alios postea in chirurgia aneurismatis trucidatos. Necesse enim est hīc funiculo uasculum complecti. Effatu igitur dignas ac maiores arterias propterea medici refugiunt, paruas autem tanquā haud plurimū conferre potentes. Quā

quam & ipsæ sæpius haud exiguum no-
bis attulisse, commodum uisæ sunt, cum
eo quod sine aneurismate cicatricem
contraxerunt. Quin etsi maior est ar-
teria, & ipsa quoq; citra aneurisma ci-
catrice clauditur, tota scilicet, dissecta:
idq; ipsum multoties quod ex sangui-
nis eruptione imminet periculum su-
stulit. Manifestè enim apparet quum
tota per se totam transuersim præcidi-
tur, reuulsis retractisue utrinq; aniba-
bus partibus, unam quidem sursum, al-
teram deorsum concedere. Atque id e-
tiam uenis accidit, sed arterijs semper
magis quam uenis.

COMMENTARIUS.

*Pericula
quæ sectas
arterias se-
quuntur.*

ALIQUOT pericula quæ ex sectis
arterijs acciderunt huius capitis initio
commemorat Galenus. Quosdam eni
se nouisse scribit qui propter sectionē
arteriæ quæ internæ in gibbero; venæ
subiacet mortui sint. Quare accurata
opus est chirurgis & medicis opera ac
diligentia dum internam gibberi venā
secant, ne simul etiam huic vene subie-
ctam

Etiam arteriam vulnerent. Nonnullos au-
 tem esse mortuos quibus propter vincu-
 lum seu funiculū, in eius iniectione, er-
 rantibus medicis, sanguinis eruptio in
 gangiēnā euasit, Galenus ait. Est autem
 Gangræna ubi pars aliqua corporis pro-
 pter inflammationis magnitudinē emo-
 ritur. Tamen nō significat iam cōfirma-
 tam mortificationē, sed quæ etiam nū-
 fit, quemadmodū lib. 7. Aph. cōmen. 31.
 Et lib. 2. de Laborā. locis ca. 2. Galenus
 copiosius docet. Facile autem accidit ut
 ex vinculi parum recta, & vehementer
 stringente coarctanteq; iniectione fiat
 inflammatio, quam tandē gangræna se-
 quitur. Variat verò hoc loco Græci codi-
 ces Galeni, alij enim, ut Aldinus, legunt
 σφαλισάντων, eritq; sensus quē in nostra
 cōuersione expressimus. Alij sic scribūt,
 ἰδεαλισάντων τε τῶν ἰατρῶν ἐπὶ χερσὶν αἰ-
 μορροαγίαν; hoc est volentibus medicis si-
 stere sanguinis fluxum. Et ita legisse cō-
 stat antiquum interpretem, qui hūc sen-
 sum ad verbum expressit. Quē quidem
 Galeni locū Auicēna quarta primi cap.
 xx. ita retulit: Aliqui etiā ob vehemen-
 tem dolorem ligaturę cuius strictura va-
 lida

Gāgræna.

*Græci co-
dices ua-
riāt hoc lo-
co.*

lida queritur ad prohibendum fluxum sanguinis arteriæ, ita ut membrum ad perditionem deveniret, mortem subierunt. Hæc ille. Posterior lectio Galeni mentem certius ob oculos ponere videtur.

Quare magne arteriæ non secantur.
Cur parva. Parva arteriæ secata nonnūquam non contemnendam utilitatem adferunt.
 Quosdam etiam senovisse ait Galenus qui postea dum chirurgia curaretur aneurisma, trucidati sint. Proinde quum in maioribus arterijs sectis semper præsens adsit periculum, medici eas incidere noluerunt. Exiguas quoque secare neglexerunt, quod ex harum incisione exiguum, aut nullum commodum speraverint. Quanquam in eo non parum errauerunt. Parvæ enim arteriæ sectæ, sæpe etiam non contemnendam utilitatem adferunt. Accedit quod cicatricem citra aneurisma contrahant, quod in maioribus non fit. Possunt tamen & illæ ipsæ citra aneurisma cicatrice claudi, si totæ transversim dissecentur. Nam ita fit ut utrinque ambæ earundem partes retrahantur, una sursum, altera deorsum concedente. Quod in venis etiam, rarius tamen quam in arterijs accidit. Porro arteriarum præcisio sæpe etiam periculum quod ex sanguinis eruptione imminet, è med

Arteria cur tota diffecanda.
 1.

in medio tollit. Vt itaque in magnis arterijs factis discrimen aneurismatis, ac eruptionis sanguinis euitare queat medicus, præstat eas totas transuersum præcidere.

Ego uerò qua ratione impulsus sum ut arteriam secuerim iam tibi narrabo. Monitus per quædam somnia, quorum duo mihi euidenter uisa sunt, ueni ad dextræ manus inter indicem & pollicem sitam arteriam, permisiq; ut flueret, donec sua sponte sisteretur sanguis, sic quidem iubente somnio. Effluxit autem non tota libra. Cōfestim uerò diuturnus qui in illa maximè parte, qua iecur septo transuerso committitur, fixus erat dolor, desijt. Hoc quidem mihi etate adhuc iuueni accidit. Minister autē Dei Pergami diuturno lateris dolore liberatus est per arteriæ in summa manu sectionem, ex insomnijs quoq; monitu illud aggressus. Porro alteri cui ex malleoli uulnere dissecta arteria fuerat, sanguinis effluxus haud cessauit, donec ego uoca-

tus totam præcidi, ac medicamento ex aloë, & manna, ouorum albo pilis leporinis excepto usus sum: uulnusq; citra aneurisma curatum est, osculo arteriæ carne obducto. Homo autem ille omnis iam quatuor ex interuallis paruis coxæ dolore uexatus, deinceps perfectè sanus erat. Hæc itaq; mihi persuaferunt ut multoties in summis artubus, imò etiam in capite, arterias in omnibus doloribus à calida & spirituosa substantia natis, incidrem, & maximè in membranis, quarum dolor punctorius est, sensimq; expanditur, punctorio quidem sensu in una parte, tanquam in centro laborantis loci, facto, tensionis uerò sensu circumcirca centrum uniuerso percipiente musculo.

COMMENTARIUS.

Somnijs impulsus Hoc in loco primum qua ratione
est Galen⁹ impulsus sit ut arterias secaret Galenus
secare arte ostendit. Monitus enim fuit ut idipsum
ris. faceret per quædam somnia, quorū duo
 illi euidenter admodum uisā sunt. Primū
 illi

illi quidem occasionem dedit vt arteriã dextrę manus inter indicem & pollicẽ sitam incideret, sineretq; effluere sanguinem donec sua sponte sisteretur. Effluxit verò nõ integra libra. Ab istius arterię sectione cõfestim diuturnus dolor qui ea parte erat qua iecur septo trãverso committitur, sedatus est. Copulatur autem iecur ea parte non solùm septo transverso, sed etiam cordi per septum. Quare locus ille vulneratus, celerem affert mortẽ, quemadmodũ copiosẽ admodum Galenus lib. 4. de Vsu part. cap. 14. monstrat. Hoc quidem primum somnium Galeno adhuc iuueni visum est. Alterum somnium eum monuit, vt ministro Dei Pergami, quod *Pergamũ* Galeni patria erat, quum diuturno late *Galeni pa-* ris cruciatu molestaretur arteriam in *tria.* summa manu secaret, & statim eo dolore *Dissecta* re est liberatus. Dein quo pacto arteria *arteriaquo* dissecta sanguis sisti queat, & qua ratio *modo san-* ne vulnus arterię citra aneurisma cura- *guis sistẽ-* ri possit docet. Sistitur autem sanguinis *du.* effluxus arteria tota præcisa. Hac enim rione Galenus affluentem ex arteria sanguinem qui nullis alijs præsidij con-

Vulnus ar stringi potuit, cōpescuit. Quare autem
teriæ citra ista præcisione sanguis constringatur,
aneurisma paulò suprà est expositum. Vulnus ve-
quomodo rò arteriæ citra aneurisma commodissi-
sanandum. mè curatur ex medicamento quod con-
stat ex aloë, manna, seu polline thuris,
& quorū albo, leporinis pilis excepto.
De quo utrique medicamento sic libr. 3.
The. meth. cap. 4. scriptū reliquit. Opti-
mum omnium quæ noui medicamento-
rum, quo etiam ad cerebri membrana-
rum sanguinis, effluxum tutissimè ute-
mur, est quod nunc subiiciam: Thuris
pars vna, aloës partis vnius semissi mi-
scetur. Mox quum vtēdi tempus instat,
tantum huius cum oui candido subigi-
tur, quantum mellis reddat. crassitudi-
nem, hoc dehinc lepori mollissimo pilo
excipitur. Deinde tum vasi ipsū, tum
ulceri toti liberaliter imponitur. Al-
ligandum autem id forinsecus, fascia
est ex tenui linteo. Hæc ille. Hoc qui-
dem medicamentum osculo arteriæ car-
nem obducit, ideoq; citra aneurisma cu-
rat. Homo verò ille cui in malleolo se-
cta est arteria, dolore coxæ, quo iam to-
tis quatuor annis ex paruis temporum
inter

interuallis, vexabatur liberatus omninò
 est, vt deinde perfectè sanus fuerit. His
 itaq; somnijs & euentu rerum Galeno
 p̄suasum fuit, vt in extremis artub⁹, hoc *Artus.*
 est summis manib⁹ & pedibus, adde etiã
 in capite arterias, in omnibus doloribus
 à calida & spiritiuosa substãtia ortis, sub
 inde incideret: idq; maximè in mēbra-
 nis, quarũ dolor punctorius est, paula-
 timq; expanditur. Nã punctorius sen-
 sus in vna parte, veluti in centro labo-
 rantis loci fit. Sensum verò tēfionis vni-
 uersus musculus circũcirca centrũ per-
 cipit. Porro quòd punctorius vocatus
 dolor ad mēbranas potissimũ perti-
 neat, alibi quoq; nimirũ lib. 2. de Labo-
 ran. locis, cap. 1. testatur Galenus in hũc
 modũ scribens: Punctorius dolor circa
 membranas potissimũ cõsistit. Pathe-
 matis quidẽ veluti radix in eo quod pũ-
 gitur videtur esse fixa. Verũm dolor cir-
 ca locũ punctũ ad magnum spatiũ ex-
 tenditur. Hactenus Galenus. Quæ qui-
 dem verba præsentem locũ pulchrè ex-
 plicant, vt non opus sit plura adijcere.
 Atq; hĩc Commētarios nostros in libel-
 lum de curandi ratione claudemus.

*Punctori⁹
 dolor.*

CLAVDII

GALENI PERGA-

meni de hirudinibus, Reuulsio-

ne, Cucurbitula, & sca-

rificatione Libellus.

De conbarto Fur-

chisio inter-

prete.



HIRVDINES nonnulli
uenantes includunt, eisq; ad
multa utuntur. Siquidem hæ
cicurate carnes facile ap=
prehendunt. Eas autem quæ recens ca=
ptæ sunt, diem unum asseruare oportet,
exiguo sanguine in pastū exhibito. Sic
enim quod in ipsis est uirulentum ex=
primitur. In usu uerò pars cui hirudi=
nes admouebuntur, nitro prius perfri=
cetur, ungaturq; , aut unguibus scalp=
tur, promptius, enim apprehendent. Cæ=
terum oportet eas iniicere in aquæ te=
pidæ uas purū & amplū: dein spongia

com

I cōprehēdentes, & sordes abstergētes,
manibus admouere. Vbi autem inhæse-
rint, oleum tepidum particulæ infun-
demus, ne refrigeretur. Si manibus aut
pedibus admouebuntur, ipsam partem
aquæ cui insunt hirudines immerge-
re oportet. Vbi uerò parum attige-
rint, forfice caudas ipsarum præciden-
dæ: Quippe sanguine effluente, trahere
non cessant, donec ipsi aut saltem,
aut cinerem ori ipsarum insperseri-
mus. Vbi autem deciderint, cucurbitu-
la uirulentum elicere oportet. Sin mi-
nus, spongijs fouere. Foraminibus au-
tem si cruentæ lachrymæ effluxerint,
cuminum, aut farinam inspergito, dein
lana exiguo oleo madida inuoluito. Si
uerò sanguis cum impetu erumpat,
linteum aceto imbutum inijcito, aut
gallam uſtam, aut spongiam pice li-
quida madentem, ac postea uſtam im-
ponito. Sciendum autē hirudines non
eum qui in profundo est sanguinem
elicere, sed eum qui carni adiacet exu-

gere. Vtimur uerò ijs pro cucurbitu-
lis. Detrahimus autem eas ubi dimidiâ
sanguinis partem esse extractam conij-
cimus. Prohibemus uerò nec permitti-
mus effluere donec quod satis sit ex-
cretum fuerit: eò quòd particula tum
ab hirudinibus natura frigidis, tum ab
ambiente refrigeratur.

COMMENTARIUS.

IN hoc breui libello quicquid ad hi-
Quibus hi rudines ac earundem vsum pertinet Ga-
rudinibus lenus perstrinxit. Principiò autem qui-
utendū sit. bus hirudinibus sit vtendum monstrat,
 ijs nimirum quæ captæ aliquot diebus
 inclusæ, atque adeò cicuratae sint. Ita
 enim facilius carnes, iam scilicet fa-
 mescentes, apprehendunt. Eas autem
 quæ recens captæ sunt, ob suam viru-
 lentiam apponere haud licet, sed vno
 die exiguo pastos sanguine, asseruare.
Quo pacto Nam hac ratione quicquid in ijs viru-
pori cui hi lentum est exprimitur. Cedit enim san-
rudines ad guini quem hauserunt. Secundò, quo
moueantur pacto pars cui hirudines admoue-
sit præpa- rantur sit præparanda monstrat, vt eam fa-
randa. ciliq;

cilius apprehendant. Nitro autem prius esse perfricandam, vt scilicet incalēscat, & vt sanguis ex alto in summum euocetur, ait. Aut inungendam aliquo calōifico, & ex alto in summū trahente medicamento. Aut si ijs omnibus destituimur, vnguibus esse scalpendam docet, vt scilicet hac ratione incalēscat, ad eamq; sanguis trahatur. Tertiō, quomodo sint parti iam præparatæ adhibendæ hirudines ostendit. Inijcere enim eas in vas purum aqua tepida plenum, & amplum oportet. Purum, vt sordes rectius abstergi possint. Ad absterfionem autem hanc rectius perficiendam aquam esse tepidam cōuenit. Amplum esse dehet, vt manibus commodè attingi, atque adeò sordes spongia cōprehensæ, rectius abstergi queat. Sic purgatas manibus admouere cōuenit. Quartō, quid deinceps vbi iam admotæ sunt hirudines faciendū sit medico mōstrat. Est autē pars cui adhibitæ sunt tepido oleo fouenda, ne scilicet refrigeretur. Parte enī cui inharēt refrigerata, nō facilē sanguis sequitur, vtpote qui à frigore crasseicat, & ad interiora pellatur.

*Quo modo
parti iam
præpara-
tæ hiru-
dines sint ad
mouendæ.*

*Quid post
admotas
hirudines
sit facien-
dum medi-
co.*

Ceterum non semper opus est vt manibus hirudines admoueantur. Si enim ipsis manibus, aut pedibus admoueuntur, satis est ipsam partem aque cui insunt hirudines immergere. Nam ita sua sponte partes has apprehendent. Quinto quid faciendum sit vbi parti iam inhererint, nec admodum ad se sanguinem traxerint, ostendit: forfice caudę earundem præcidendę sunt. Sanguine enim quem emunxerunt tum effluente, trahere non desinunt. Sexto qua ratione efficere liceat vt tandem decidant docet. Salem aut cinerem si ori ipsarum

Quid faciendum sit vbi hirudines parti iam adherent. insperferimus statim sua sponte decidant. Septimo quid postquam iam deciderunt sit agendum monstrat. Cucurbita nimirum est adhibenda, quę viru lentum elicere queat. Si verò cucurbitularum vsus displicuerit, spongijs fouere partes quibus admotę sunt hirudines oportet. Spongia enim noua præsertim, non tantum est materia eorum quę humores irrigandos excipit, vt testis est lib. II. de simplic. medic. facul. Galenus, sed etiã manifestè desiccat. Quippe seruatur etiãnum in ea quam à mare accipit fa

pit facultas. Quare vt. virus ab hirudini-
 bus relictum dissipetur ac discutiatur,
 spōgijs nouis partem fouere conuenit. *Spongia.*
 Quodd si verò è foraminib⁹ cutis, legē. *Gracus*
 dum enim censeo τρήματα, non σώματα, *codex emē*
 cruentæ lachrymæ effluxerint, cuminū, *datus.*
 quod deficcādi facultatē habet, fluxio. *Cuminū.*
 nesq; cōpescit, & farinam emplastricā *Farina.*
 obturandiq; vini obtinentē inspergere
 oportet. Effluētes enim cruētās lachry-
 mas cohibēt. Dein partē lana quæ ex li-
 guo oleo est imbuta inuoluere cōuenit.
 Lana eaim commodissimè, Diosc. teste, *Lana,*
 vulneribus imponitur. Oleo verò quod *Oleum.*
 obturandi facultatē habet imbuta, effi-
 caciōr fit. Si verò non tantūm lachrymę
 cruētæ, sed & sanguis planè cum impe-
 tu, amotis hirudinib. erūpat, lintheū ace-
 to imbutū iniiciendū. Acetum enim, vt *Acetum*
 author est Diosc. adstringit, erūpentēq;
 vndecūq; sanguinē in succidis lanis; aut
 spōgia impositum sistit. Aut Galla vsta *Galla vsta.*
 imponēda, quę, vt lib. 7. Simplic. attesta-
 tur Galen. sanguinis cōprimendi facul-
 tatē habet. Aut certè spongia, cui gluti-
 nandi vis inest, liquida pice madida, & *Pix liqda.*
 dein vsta imponēda. Quippe pix liqui-
 da, ad *Pix nua-*

Zopissa, da, admixtis alijs quibus glutinandi
Quem san- vulnera facultas inest, profunda vulne-
guinẽ hiru ra, Diosc. teste, sanare potest. Est autem
dines è cor pix liquida quę incēsis pinguisimis ar-
pore eli- borũ lignis in furno fluit. Officinis ho-
ceant, die naualis dicitur, à *zopissa* Diosc. quę
 resina est cum cera nauibus derafa, di-
 uersa. Octauò, quem sanguinem hiru-

Quando de dines è corpore eliciant docet, nempe
trahẽdæ hi non eum qui in profundo corporis, sed
rudines, eum potius qui carni adiacet. Atq; hinc
 est quòd pro cucurbitulis eis vtamur.
 Nonò quando detrahendæ sint hirudi-
 nes monstrat. Detrahendæ namque vbi
 dimidiam sanguinis vitiosi aut redun-
 dantis partē esse extractam coniicimus.
 Eiusq; rei rationem statim subiicit, in-
 quiens: Prohibemus enim nec permitti-
 mus donec omnis sanguis & quod satis
 sit excernatur, quòd scilicet pars ipsa du-
 plici ratione refrigeretur, nempe ab hi-
 rudinib⁹ admotis natura frigidis, & ab
 aëre ambiente frigido. Quocirca ali-
 quid sanguinis retinendũ erit, vt hinc
 pars incalescat. Hinc est quòd dimidiã
 tantũ sanguinis partē prius extrahen-
 dam esse dixerit. Postremã hanc partem

Gauda

Gaudanus non rectè transtulit hunc in
 modũ: Prohibemus verò decidere, do *Gaudani*
 nec quod satis sit &c. Quod Græca satis *lapsus.*
 docent, quæ ita habent: ἐκκωλύομεν, ὅτι
 οὐκ ἔσμεν ἀπορρέειν ἕως ἄν αὐταρκεί ἀπο-
 κριθῇ. Nam eum planè sensum referunt,
 quæ in nostra cōuersione expressimus.

DE REVVLSIONE.



EHEMENTISSIMOS hu-
 morum influxus reuulsorij
 præsidij confertim ingruere
 prohibemus. Reuulsoria

uerò præsidia sunt irruente in thoracem & uentrem humore, ad manus retractio. Vomitus autem, ubi ad inferna decumbit: quemadmodum si ad uomitus inclinat, per acriores clysteres. Ambas uerò has inclinationes, quæ ad superiorem, inquam, & inferiorem uentrem uergunt, per urinam & sudores reuelles. Quin & urina, per sudores, & alui excretiones retrahitur. Reuulsorium autem auxilium est etiam
 mam

mammis admota cucurbitula. His uerò quæ hypochondrijs affiguntur, sanguinis ad nares impetum reuelles, perinde atq; immodicum ex utero effluxum. Cæterum ad caput & uiscera humorũ delationes, acria medicamēta pectōri imposita reuellunt. In summa humoribus sursum fluētibus, ad inferiora reuellendū. Deorsum aut fluentibus, citrà. Intrò uerò tendentibus, foràs, & rursus foràs uergētibus, intrò. Sim ad dexterās partes repāt, ad sinistrās. Et si ad sinistrās inclinent, ad cōtrariās. Sic etiam quæ retrorsum abeunt, antrorsum: quæ uerò antrorsum, retrorsum reuelles.

COMMENTARIUS.

*Præcipu⁹
reuulsionis
usus.*

IN hoc breuissimo libello præcepta quæ ad reuulsionem ipsam rectè faciendam spectant Galenus pertractat. Atq; principio quis sit reuulsionis præcipuus vsus monstrat, nempe ut uehementissimos humorum in partem aliquam corporis influxus cōfertim & celeriter per hanc ipsam prohibeamus, retrahamus, scilicet & auertendo humorum impetum.

tum in contrarium. Secundò reuulso-
 riorum auxiliorum aliquot modos &
 exépla profert, reuellere nos dicens, vbi *Exempla*
 eum humoré qui in thoracem & ventré *reuulsiõis*
 decūbit, ad manus retrahimus. Eum aut
 qui ad inferna delabitur retrahemus, si
 per vomitum expurgabimus. Veluti cō-
 trā si ad superiora, & ad vomitum incli-
 nat, per acriores ac vehementiores cly-
 steres reuellimus. porrò ambas inclina-
 tiones, tam eam scilicet quæ ad superio-
 rem, quàm quæ ad inferiorm ventrem
 repit, per vrinam & sudores reuelle-
 mus. Cuius rei exemplum extat apud
 Galenum libro 1. ad Glauconem, in
 capite de tertianæ febris curatione, vbi
 flauæ bilis humoré nunc ad ventriculū,
 nunc ad inferiora repētem, per vrinam
 & sudorē posse etiam Medicū retrahe-
 re disertè docet. Præterea quæ ad vrina-
 rios locos deferuntur, per sudores, &
 alui excretiones reuellantur. E quo fa- *Reuulsiõ-*
 nè loco sole meridiano clarius apparet, *nis nomine*
 Galenum hîc nomen reuulsiõis gene- *quomodo*
 ratim & κατὰ χρητικῶς pro omni reme- *hoc loco*
 dio quod reuellit, non curando an ad *utatur Ga*
 contraria vel vicina fiat reuulsiõ, vsur- *lenus.*
 pare

*Reuulsio
proprie.*

Deriuatio

pare. Priuatim enim & propriè loquendo reuulsio dicitur, quæ ad cōtraria fit, deriuatio autē quæ ad vicina. Sic enim metipse Galenus lib. 5. Ther. metho. cap. 3. hæc vacuationis genera definit. Quū igitur hoc loco dicat ea quæ ad vrinæ loca decumbunt per alui excretionem posse reuelli, euidentissimum est reuulsionem generatim ab eo sumi, vt scilicet etiam in se deriuationem complectatur. Tractio enim humorum quæ ab vrinæ vijs fit ad aluum, non est reuulsio propriè loquēdo, sed deriuatio. Quod luculenter admodum loco iam citato Galen⁹ mōstrat, vbi inter cetera sic scribit: Quæ per aluū fluunt, ea vel per vrinæ, vel vterū deriuabis. Quæ verò per vrinæ, ea vel per vterum, vel per sedem deriuare oportet. Reuulsorium deniq; esse præsiidiū Galenus docet si mammis admoueat cucurbitula. Quod confirmat Hippocrates ita in Aphorismis scriptū relinquens: Si mulieri menstrua sistere volueris, cucurbitulā quā maximā sub mammis desige. In cuius sententiæ explicatione multa ad institutū facientia diximus in nostris in eum librum

3. aph. 50.

brum commentarijs. Deniq; cucurbitu
 le quę hypochondrijs affiguntur, san- *Cucurbitu*
 guinis ad nares impetū reuellūt. Cuius *la hypo-*
 rei loco paulò antè citato testis est Ga *chondrijs*
 lenus in eum modū scribens: Quum è *affixa san-*
 naribus sanguis erumpit, retinēt eū ma- *guinis ad*
 gne in hypochondrijs defixę cucurbi- *nares impe*
 tē. Infigendę autē sunt, si ex dextra nare *tum reuel-*
 profluitur, super iocinore: sin ex fini- *lunt.*
 stra, super liene. Si ab vtroq; nare, super
 vtroq; sunt imponendę viscere. Deniq;
 humores ad caput & viscera declinātes,
 acria medicamenta pectori imposita re
 uellūt: id quod puto nemo inficias ibit.
 Sed notandum hoc loco erit in Græco
 Aldino codice legi ἐν τοῖς κόλποις, ideo- *Aldinus*
 quę reddidisse Gaudanū in sinus. Quæ *græcus co-*
 quidem lectio quid præ se ferat cōijcere *dex emen-*
 certò non possum. Ego quidem iudico *datus.*
 locum hunc esse deprauatum, legen-
 dumq; ἐν τοῖς στήθεσι, hoc est, vt nos con-
 uertimus, pectori. Quam quidem le-
 ctionem confirmat antiquus interpres,
 qui disertè conuertit, pectori imposita.
 Huc etiam ratio ipsa lectioni suffraga-
 tur. Nam vergentes ad caput & viscera,
 hoc est internas corporis partes, hu-
 mores,

mores, acria medicamenta pectori imposita ad sese retrahunt. Quodd si iamen quis retinere Græci codicis lectio-
κόλπος. nem velit, is *κόλπον* hoc loco pro vlna, aut manu accipiet. Nam Phauorinus testatur *κόλπον* idem etiam quod *ἀγκάλημ*, id est vlnam, & sic accipi ab in 7. Iliadis tradit, & *χερὰ*, hoc est manū significare. Et tum quidem sensus erit, illos humores qui ad caput & viscera tendunt, ad manus appositione acrium medicamentorū esse retrahendos. Tertiò summatim reuulsionis generatim sumptæ species octo recēset inquiring. 1. Sursum fluentibus humoribus, deorsum retrahendum. 2. Deorsum verò fluentibus, sursum. 3. Intrò tendentibus, foràs. 4. Foràsvergentibus, intrò. 5. Quæ ad dextras partes repunt, ad sinistras. 6. Quæ contrà ad sinistras, dextrorsum. 7. Quæ retrorsū abeūt, antrorsū. 8. Quæ antrorsum, retrorsum reuellēda. Atq; sciendū hoc loco erit, si prædictæ reuulsionis species, quod quidam faciunt, ad venæ etiam sectionē detorquentur, probè esse Galenum intelligēdum, nempe tum à dextris ad sinistras, & cōtrà reuellēdum

Reuulsionis generatim sumptæ octo species.

dum esse, vbi fibrarū quæ in venis sunt *Quando per*
 consensus & rectitudo nō impedit. Ne. *uenasectio*
 que enim perpetuò dextra cum sinistris *nem d dex.*
 rectitudinem habent, quod copiosius *tris ad fini*
 in explicatione capitis decimi quinti li- *stra sit re-*
 bri de Curanda ratione per sanguinis *uellendum.*
 missionem docuimus.

DE CUCURBITVLIS.



V C V R B I T V L A E

ijs qui antea uacuati sunt, u-
tilitatē afferunt. Si enim ple
 thorici fuerint, illis haud utimur. Eadē
 uerò ratione & in cerebri & eius mē-
 branarū phlegmonis, in principio malo-
 rum cucurbitulis non utimur: quēadmo-
 dū nec ulla alia in parte phlegmone ob-
 sessa. Verū ubi nihil iam influit, uniuer-
 sumq; corpus antea uacuatum est, o-
 pusq; est aut mouere, aut amoliri quod
 in laborante phlegmone particula exi-
 stit, aut forās trahere. Porro fientibus
 adhuc malis, non laborare incipientibus
 membris, sed ijs quæ eis coniuncta con-

COMM. IN LIB. GAL.

tinua'ue sunt, reuulsionis gratia affigē-
da cucurbitula. Cucurbitula potest ma-
teriam uacuare, dolorem soluere, phle-
gmonē minuere, inflationem discutere,
appetentiam reuocare, imbecillum uen-
triculum robustum efficere, animi deli-
quio liberare, ex alto fluxiones trāsfer-
re, ac resiccare, sanguinis eruptiones co-
hibere, facultates mensiū corruptrices
extrahere, & menses leuare.

COMMENTARIUS.

*Quando cu-
curbitulis
utendum.*

IN hoc breuissimo libello quæ ad
cucurbitularū vsum sunt necessaria Ga-
lenus cōplexus est. Principiò autē quan-
do cucurbitulis vtendum sit docet, nem-
pe tum vbi vniuersum corpus antea fue-
rit vacuatum. Plethoricis enim nihil cō-
ferunt, imò eis potius nocent. Quare in
ijs cucurbitulis haud vtendum erit. Cu-
ius rei causam affert Galenus ca. 95. Ar-
tis medicæ in eum scribens modum: Si
vniuersum corpus plethoricum fuerit
per laborantem partem minimè vacuan-
dum erit. Nam si scarificationibus, aut
sectionibus sensibiliter, vacuabimus,
plu s

plus excitati doloris ratiōe attrahemus. Si verò calefacientibus dispergere tentabimus, plus erit id quod vi caloris ad partem attrahetur, q̄ dispersum. Quòd si in eo elaborabimus, vt quòd influxit retrocedat, corpus plenum non admittit. Ad hæc igitur ambo totú corpus vacuare oportet, aut omninò ad contraria loca retrahere quod laboranti parti influit. Hæc ille. Pari quidem ratione nec in cerebri & eius membranarum inflammationibus inter initia malorum cucurbitulis vtendum, quemadmodum neq; in vlla alia parte phlegmone laborāte. Tum enim à partibus laborantibus influxus humorum auertendus magis, & nequaquam ad eas per cucurbitulas trahendum erit. Per Phlegmonem autem cerebri & eius membranarū nihil aliud quàm phrenitim intelligas. Nam, vt testis est libr. 2. de Sympto. causis, cap. 11. Galenus, phrenitis non est nisi cerebri & eius membranarū phlegmone seu inflammatione. Tum verò cucurbitularum vsus optimus, & maximè opportunus erit, quando iam ad partem laborātem nihil influit, vniuersumq; corpus antea

*Phrenitis
quid.*

per venæ sectionē vacuatum est, opusq;
 est ea quæ iam in laborante parte hæret
 aut mouere, aut amoliri, aut forās trahe
 re. Hoc enim tempore sine omni pror
 sus noxa idipsum quod desideramus ef
 ficient. Fientibus autem adhuc malis cu
 curbitulæ non ijs partibus quæ laborare
 incipiunt, sed ijs potius quæ illis cõiun
 ctæ & continuæ sunt affigendæ erunt,
 idquæ reuulsionis gratia, vt scilicet influ
 xum humorum à laborante parte ad vi
 cinas reuellant & attrahant. Nequaquã
 enim, vt dictum est, fluētibus adhuc hu
 moribus ad laborantem partem est at
 trahendum, sed ab ea potius ad vicinas,
 si commodè fieri potest, aut longius di
 stantes, reuellendum. Vbi notandum ve
 nit ex, hoc loco perspicuū esse mala quæ
 adhuc fiunt non dici Galeno morbos,
 sed πάθη. ait enim: γενομένων ὅτι τῶν
 παθῶν. Neque enim sunt affectus, hoc
 est res permanentes, sed essentiam suam
 habēt in fieri, quēadmodū idipsum co
 piofius in annotationibus nostris in li
 brum primum Galeni de Tuenda sani.
 demonstrauius. Secundo loco in hoc
 breuissimo libello docet Galenus quæ
 sit

*Mala fien
 tia nō sunt
 morbi.*

sit cucurbitularum facultas. Primum
 enim materiam in parte hærentem va- *Cucurbitu*
 cuant, præsertim vbi scarificatio acce- *larum fa-*
 dit. Secundò dolorem solum. Hinc est *cultas.*
 quòd lib. 12. The. metho. cap. vltimo, ita
 scriptum reliquerit Galenus: Dolor qui
 spiritum flatuosum comitatur, propriã
 quandam curationem sortitus est ex cu-
 curbita cum flamma copiosa multoties
 admotæ. Videbiturq; tibi præsidium hoc
 in huiusmodi malis incantamēti cuius-
 quam simile quid efficere, siue hi in in-
 testinis, siue in quauis corporis particu-
 la sunt excitati. Illico enim cucurbitula
 admota, qui spiritu flatuoso cruciatur,
 tum à dolore liberi, tum omnino sani
 redduntur. Tertiò phlegmonem iam fa-
 ctam minuunt, quòd partem humo-
 rum ab ea reuellant. Quartò inflatio-
 nem, vtpote cuius, vt iam ex Galeno mō-
 stratum est, propria sit curatio, discu-
 tiunt. Quintò appetentiam reuocant,
 quòd nimirum attractis humoribus pe-
 nurie sensum, & suctionem in ventricu-
 lo excitent. Neque enim appetentia a-
 liud est, Galeno lib. 1. de Sympt. causis, *Appeten*
 cap. 7. teste, quàm impletiois desiderium. *tia quid.*

Sextò imbecillum vētriculum, quòd nimirum eius appetentiam naturalem excitent, quàm statim nutritio sequitur vētriculi, robustum efficiunt. Septimò animi deliquio, quòd sanguinem & spiritum ad exteriora reuocent, liberant. Octauò propter eandem causam, fluxiones ex profundo corporis ad eius superficiem transferunt & resiccāt.

Nonò sanguinis eruptiones, vt in libello de Reuulsione suprā à nobis est ostētum, cohibent. Decimò, facultates quæ menses corrumpunt, extrahunt, & eosdem leuant. Hoc est causas quæ impediūt quo minus statis temporibus effluant menses tollunt cucurbitulæ & extrahunt. Nam quando menses non fluunt opportuno tempore, necesse est illos esse corruptos, hoc est sanguinem menstruum esse factum crassiorē quàm vt per angustas venas trāsire queat. Aut saltem obstructio aliqua in venis facta est, quæ mensium profluxum moratur. Has igitur causas menses corrumpentes extrahunt cucurbitulæ, adeoq; efficiunt vt ijs sine impedimēto promanantibus, mulieres mensibus leuentur. Atq;

hunc

Cucurbitulae facultates quæ menses corrumpunt extrahunt.

hunc esse verborum Galeni sensum ex antiqua conuersione colligi potest. Sic enim hūc locū interpres vetus cōuertit: Menstrua retenta ~~at~~trahere & alleuare potest. Quinetiā Auicenna 4. primi ca. de cucurbitula sic esse legendum confirmat, qui locum hunc ita ex Galeno retulit. Appositio cucurbitularū corruptionem quoq; menstruorum sanat, & corpus ab ea leuat.

DE SCARIFI- CATIONE.

SCARIFICAMVS partes corporis aut phlegmone laborantes, aut induratas, aut tensas, aut dolore uexatas, aut fluxione quæ iā firmata est tentatas, aut acri materia adiacēte, aut uenenata facultate extrinsecus accedēte, aut ubi materiā ex alijs partibus in aliā traducere uolumus. Verbi gratia, crura scarificamus capite laborāte, aut ubi materiā in corpore redundantē minuere nobis cōsiliū

est, præsertim ubi redundantia prouenit à materia quæ uacuari cōsueuerat. Veluti si hæmorrhoides supprimantur crura scarificamus balneo prius usi, aut calida per spongiam fouentes. Nam anno sæpius incidere uenam non expedire censeo: quippe cum sanguine copioso uena uitalis excernitur spiritus. Eo autem copiosius absumpto, uniuerſa corporis moles refrigeratur, omniaq; naturalia opera deterius fiunt. Quapropter ab ignobilioribus, utpote cruribus, detractionem fieri conuenit. Prodest autem scarificatio etiam oculis diutina fluxione uexatis, & capitis affectibus, malisq; thoraci dorsoq; accidentibus. Adhæc anginis, atq; humoribus impactis.

COMMENTARIUS.

IN præsentibus libello quæ ad scarificationis legitimum ac commodum *Quædo sca*
 spectat vsum, Galenus edocet, & initio *rificatione*
 quando scarificatione vtendum sit, tra- *utendum.*
 dit. Scarificandas verò primùm partes
 esse corporis, ait, quæ phlegmone labo-
 rant: idq; nō inter initia dū adhuc hu-
 mores influunt, sed tum potius vbi iam
 in parte firmati sunt, quemadmodū ex
 ijs quæ paulò suprà diximus satis patet.

Secundò eas quæ iam induratae sunt,
 vt scilicet tenaciter impacti humores e-
 ducantur. Tertiò partes tensas, eandē
 ob causam, vt nimirum tensionem effi-
 cientes humores eliciantur. Quartò
 molestatas dolore partes, eo præfer-
 tim qui à flatibus est ortus, vt diximus
 in libelli de Cucurbitulis enarratione.

Quintò partes fluxione quæ iam fir-
 mata est vexatas scarificamus, vt quæ hæ-
 rent in ijs educamus. Sextò vbi ijs ma-
 teria acris adiacet, vt ea scilicet euocata
 partes non amplius irritentur ac erodā-
 tur. Septimò vbi venenata facultas ex-
 trinsecus accedit, vt si quispiam à cane-
 rabido aut scorpiōe sit morsus & ictus.

Tum enim cucurbitis cum sacrificatio-
ne ad motus venenum iniectū extrahere
conamur. Octauò quando materiam
ab vna in aliam partem transferre cupi-
mus. Idq; simul adhibita cucurbita quę
ad eam partem quę scarificata est tra-
hat. Quare eorum quę iam diximus in-
tellectus, ex superiore de Cucurbitulis
libello pendet, vt hoc nomine hīc nos
esse breuiore neceſſe ſit. Seundò hu-
ius libelli loco, quę dixit exemplo illu-
ſtrat, & quibus malis proſit ſcarificatio,
docet Galenus inquiring: Si caput labo-
rat, aut materia in toto corpore redun-
dans minuenda erit, crura ſcarificabi-
mus, vt ſcilicet à ſupernis & nobiliori-
bus partibus ad ignobilioreſ, crura ſci-
licet, humores noxioſ et ſuperuacuoſ re-
uellamus, ac ſubinde vacuemus. Idquę
magis faciendum, vbi redundans ma-
teria talis fuerit, quę antea per hæmor-
rhoidaſ, aut alium vacuationi à natura
deſtinatum locum, vacuari ſtatim & cer-
tiſ temporibus conſueuerat. Supreſſa
itaq; quę per hæmorrhoidaſ ſit vacua-
tione, crura ſcarificabimus, priuſ tamen
vſi balneo, vt ab eiſ calore tenuatuſ &
diſſol

*Quibusma-
lis proſit
ſcarifica-
tio.*

dissolutus sanguis ad tractum & vacua-
 tionē aptior fiat. Aut si balneo vti com- *Ante crurum*
 modè non licet, saltem aqua calida ma- *rum scarifi-*
 dente crura fouebimus. Tertiò ratio *ficationem*
 nem reddit cur scarificatione crurum *balneo utè*
 fit vtendum, hanc nimirum. Non expe- *dum.*
 dit sæpius per annum incidere venam, *Cur scari-*
 quòd ita non tantum copiosus sanguis, *ficatione*
 sed & unà cum eo vitalis excernatur ipsi *crurum utè*
 ritus. Cuius quidem vacuationem vni- *dum.*
 uersi corporis refrigeratio comitatur, *Sæpius p*
 omnesque subinde naturales actiones *annum in-*
 deterius fiunt. Sunt aut naturales actiões *cidere ue-*
 seu voluntatis expertes, quæ ex vena & *nam noxa*
 arteria procedunt, quæque à cōsilio, aut nō *carer.*
 electione non pendent, sed spontè & na- *Naturales.*
 turaliter fiunt, vt est concoctio, nutritio, *actiones*
 sanguificatio, pulsus cordis, & eiusmodi. *qua.*
 Et sciendum hîc erit perperā in Al- *Aldinus*
 dino codice legi $\phi\upsilon\sigma\iota\kappa\acute{\alpha}$ pro $\phi\upsilon\sigma\iota\kappa\acute{\alpha}$. *codex cor-*
 Quippe scribendum esse $\phi\upsilon\sigma\iota\kappa\acute{\alpha}$ præ- *rectus.*
 ter antiquum interpretem, Aëtius etiā
 lib. 3. cap. 21. qui hunc Galeni locum ijs
 verbis refert, testatur inquit: Sæpius
 in anno venam incidere non vtile opi-
 nor, simul enim cum sanguine plurimū
 vitalis spiritus exhauritur, quo exhausto,

COMM. IN LIB. GAL.

& corpus totum frigidius redditur, &
actiones naturales deteriores fiunt. Ca-
terum prodest quoque scarificatio ocu-
lis diuturna fluxione vexatis, & capitis
affectibus, quodd scilicet fluxionem ab
ijs partibus ad ignobiliore trahat, &
illuc tractam vacuet. Eandem certè ob
causam thoracis & dorsi malis confert.

Item anginis, atque humoribus
alicui parti corporis impa-
ctis, eos enim elicit, &
subinde vacuat,
vt antea quo
que dictum
est.

FINIS.

I N D E X.

Uendus.	137
Arteriæ vulnus citra aneurisma quo- modo sanandum.	cod.
Arterias veteres venas appellauerūt.	132
Arteriæ quæ incidendæ.	133
Arteriæ post aures secādæ in vertigine. eodem.	
Arterias incidere quare medici metue- runt.	134
Arterias sectas quæ picula sequātur. eo.	
Arteriæ magnæ quare nō secantur.	135
Arteriæ paruæ sectæ nonnunquā nō cō- temnendā vtilitatem adferunt. eodē.	
Arteriæ cur totæ disseccandæ.	cod.
Arterias secare somnijs impulsus est Ga- lenus.	137
Artis medicæ duo officia.	23
Artus.	138
Artuum vincula reuellunt.	72
Asclepiadis elementa.	19
Athletarum bonus habitus.	24
Auicennæ perniciosum de vena secāda præceptum.	103
Auicenna homines iugulare docet.	103
Auxilium quid.	9
B Alneo vtendum ante crurum scarifi- cationem.	150
	Baln

Balneo ante venæ sectionem quibus vti expedit.	130
βοήθημαι.	9
Breuitas vix obscuritate caret.	36
Brissotus medicus	104
Cancer.	34
Κάκωσις.	6
καινομία.	12
καιναί' έννοιαι.	16
Κάϊρες	8
Capitis dolor.	130
Calamintham & pulegium exhibendi ratio.	115
Calamintha idonea ad menses prouo- candos.	eodem.
Calor cordis bifariam intenditur.	27
Calor cordis ab eadem materia auge- tur & extinguitur.	28
Calor humores ostendit.	41
Calor natiuus ex sanguine fouetur.	27
καρδία.	7
κατ' έξιν, quid Hippocrati significet.	94
κέλτοι.	91
Chrysippus Cnidius Erasistrati præce- ptor.	12
Chrysippi plures.	eod.
Clepsydra.	18
	Conf

I N D E X.

Confertim.	79
Confutatio quorundam non rectè in-	
telligentium Galenum.	118
Consideranda in ijs quos verno tempo-	
re vacuamus.	48
Consuetudo in sanguinis missione cō-	
sideranda.	38
Consuetudo quid.	eod.
Cotyla vna.	85
Coryla duplex Attica & Italica.	78
Cordis corpus duplici modo alteratur.	
29	
Cordis calor bifariam intenditur.	27
Cordis calor ab eadem materia augetur	
& extinguitur.	28
Corporis partes bifariam incalescūt &	
refrigerantur.	29
Corpus vacuandum ante cucurbitæ	
vsu.	120
χορηγία.	122
Coxa.	117
Crudititas quid.	32
Cucurbitularum facultas.	147
Cucurbitulæ facultates quæ mēses cor	
rumpunt, extrahunt.	eodem.
Cucurbitulæ hypochondrijs affixæ san	
guinis ad nares impetū reuellūt.	144
	κόλ

κόλπες.	cod.
Cucurbitulis quando vtendum.	145
Cuminum.	148
D Eambulatione vti ante venę sectio- nem nonnullis vtile est.	131
Δασύτης.	110
Deriuatio quid.	96.119.& 14.
Dextra cum sinistris etiam iectitudinē habent.	99
Dignitates.	16
Diatritarij.	125
Dolōris causæ variæ.	25
Dolorum omnium causę duę.	25
Dolor punctorius.	138
Δοξοσοφία.	12
E ffluxionis labescens robur.	88
Elementa quomodo inter se com- misceantur.	19
Elementa Asclepiadis.	eodem.
επαμφοτερίζειν.	112
ενδεια ολίγη.	27
Erasistratij sanguifugi dicti.	110
Erysipelas.	34
Excretionēs cōsuetæ in sanguinis mis- sione considerendę.	39
εύσαρκος.	75

I N D E X.

F acultas naturalis.	18
Facultatum robur & imbecillitas vnde cognoscenda.	42
Facultatum duarum tantum animantia gubernantium cur meminerit Gale.	18
Farina.	141
Febris quid.	33
Fibra quid.	94
Fluxionibus incipientibus reuulsione & deriuatione vtendum.	120
G alla vsta.	141
Galenī Demonstrationum xv. libri propediem in lucem prodibunt.	19
Galenī Græcus codex emendatus.	9. 17.
41. 42. 59. 63. 95. 115. 124. 126. 128	141. 144.
Galenī interpretum erratum.	70
Galenī codicum Græcorū varia lectio.	
135.	
Gangræna.	cod.
Gaudani erratum.	72
Genus vniuersum.	23
Gibberus.	70
Glandulę fluxiones facilè recipiunt.	55
Grauitas signum plenitudinis ad vires.	
40	
H abitus corporis in sanguinis mis- sione contemplandus.	39
	Hab

- Habitus naturalis vniuersi corporis.** 27
- Hæmorrhoidū profluuij cōmoditas.** 68
- Hiera picra Galeni.** 115
- Hirudines quem sanguinem eliceant.**
140
- Hirudines quando detrahendæ.** 140
- Hirudines quomodo sint admouendæ
parti iam præparatæ.** eod.
- Hirudines cui admouebuntur pars quo
pacto sit præparanda.** eodem.
- Hirudines qua ratione decidant.** 140
- Hirudines postquàm deciderint quid
agendum.** eodem.
- Hirudinibus parti iam adhærētibus qd
faciendum.** eodem.
- Hirudinibus quibus vtendum.** 139
- Horę inæquales.** 129
- Humor crudus quid.** 44. & 65
- Humoris in corpore redūdantis signa.**
68
- Humore in crudo coaceruato duo con
sideranda.** 44
- Humores bifariam iusto fiunt copioſio
res.** 23
- Humores pro ciborum potionūq; mo
do calidi aut frigidi fiunt.** 31
- moribus crudis reſecti robustas vi-**

I N D E X.

res non obtinent.	63
I Næqualitas quid.	79
Interuallum.	126
Inuentionis duo sunt instrumēta.	14. 16
L Ana.	141
Liber quartus de vi&tu acutorum morborum non est Hippocratis.	63
Lienosis sanguis vtiliter mittitur.	105
Loci tres in gibbero vnde sanguis mittitur. interior, exterior, & medius.	107
M Ala fientia non sunt morbi.	147
Malleoli.	70
Maximę.	16
Medico quid faciendum post hirudines admotas.	140
Medicina cur ars coniectrix.	74
Medicamenta acria non sunt temerę partibus corporis admouenda ante vacationem.	111
Medicamenta validiora quę.	115
Menodotus.	58
Menodoti ratio vt conuincatur.	73
Menses qua ratione euocandi, & quo tempore secanda vena.	114
Mēstruis suppressis perpetuò venę quę in cruribus sunt, secandę.	123
Menstrua qua ratione quibusq; auxilijs sint	

fint euocanda.	114
Mollia collyria.	118
Morbi forma, τρόπος.	126
Morbi mos.	co.
Motus & quietis affectus.	31
Mulieres maiores venas habentes.	70
Mulierib ⁹ candidis crura scarificāda. c.	
Musculi temporales.	25
N atura quid.	44. & 90
Nephritis quid.	113
Nigredo in percussis & afflētis partibus quid significet.	86
Note quę plethoricam vocatam syndromen cōstituunt, quātitatē detractio- nis sanguinis indicant.	64
Notiones communes.	16
Numero dierum primario non esse at- tendendū in sanguinis missione.	125
O Besę mulieres quę.	71
Obiectio de crudis humoribus.	63
Occasio quid.	8
Oedema.	34
Oleum.	141
Opiniones veterum varię de vacuatio- nis quantitate.	93
Os ventriculi per abusum, stomachus vocatur.	7

I N D E E.

ὄξυγλυκύ.	76
P Artes infra thoracem quarum vena- rum sectione iuuantur.	112
Partes quę morbis ab excrementis na- tis corripiuntur.	54
Partium imbecillitas excitat interdum phlegmonem citra plenitudinem.	52
Pergamum Galeni patria.	137
φάρυγξ.	119
Phlegmone.	33
Phlegmone faucium.	119
Phlegmone oculorum.	eodem.
Phrenitis quid.	146
πικροχόλοι.	48
Pix liquida.	141
Pix naualis.	eodem
Plenitudo quid.	48
Plenitudo duplex.	21
Plenitudo κατὰ τὸ ἔγχυμα.	20
Plenitudo ad vires sanis interdum acci- dit.	24
Plenitudo vtraq; celeriter vacuāda.	35
Plenitudo vacuanda dum consueta ad- huc munia fiunt.	37
Plenitudinis qualitas bifariam cogno- scitur.	38
Plenitudinis quātitas, siue qualitas.	40
Plenit	

I N D E X.

Plenitudines à suppressis mensibus or-	
te à cruribus vacuandę.	70.
Plethorica syndrome quid.	<u>59</u>
πρόβλημα.	<u>6</u>
Poples.	70
Potionis propinandę ratio.	115
Pręceptum generale de vena secāda.	127
Pręceptum de fibrarum rectitudine.	107
Pręcepta de iterata sanguinis detractio-	
ne.	131
Principia.	16
Principia cur dicta.	<u>19</u>
Pueri nō sunt virib ⁹ imbecillis p̄diti.	62
Pulsuum imminutioni diligenter atten-	
tus sit medicus.	81
Pulsuum immutatio.	88
Q ualitas idem quod species signi-	
ficat.	89
Qualitas plenitudinis bifariā cogn-	
scitur.	40
Quātitas nec dici nec scribi potest.	74
Quantitas cuiusq; præsidiij artem con-	
ieatricem facit.	73
R atio bifariam demonstrat.	<u>16</u>
Retractio.	<u>96</u>
Rectitudo	94. & 97
Rectitudo in missione sanguinis obser-	

I N D E X.

uari debet.	96
Rectitudo in pleuritide cur obseruan- da,	100
Renes ancipites sunt partes.	112
Responsio de crudis humoribus.	63
Reuulsio & deriuatio fit per vnā & eandem venam sectam.	101
Reuulsio semper ad contraria fit, non tamen semper ad distantissima.	102
Reuulsionis generatim sumptæ octo species.	144
Reuulsio quando facienda per venę se- ctionem à dextris ad sinistram.	145
Reuulsionis vsus præcipuus.	142
Reuulsionis exempla.	143
Reuulsionis nomine quomodo hoc lo- co vtatur Galenus.	eodem.
Reuulsio propriè.	eodem.
Roboratio est præcipuus scopus cura- tionis in affectibus à fluxione pro- creatis.	56
S anguis an sit mittendus si plenitu- dinis notę apparuerint homini so- lita adhuc negotia obeunti.	66
Sanguis bifariam crassus dicitur.	67
Sanguis etiam nocte interdum mitten- dus.	79
	Sang

- Sanguis partes omnes corporis alit. 26
- Sanguis quando ad defectionem animi mittendus. 78
- Sanguis calorem natium fouet. 27
- Sanguis & humores aucti idem. 48
- Sanguis cur verno tēpore mittendus. 46
- Sanguis quibus mittendus verno tempore. ~~codem.~~
- Sanguis haud detrahendus crudis adhuc cibis in ventriculo existentibus. 79
- Sanguis quare vsque ad animi defectionem mittendus ijs qui feruentis sanguinis copia laborant. 80
- Sanguis non mittendus pueris vsque ad quartumdecimum annum. 85
- Sanguis non semper mittendus in plenitudine ad vires. 43
- Sanguis vsque ad defectionem animi mittendus in acutissimis febribus. 66
- Sanguis interdum presente plenitudine mittendus. 51
- Sanguis è directo semper mittendus. 97
- Sanguis tempore frigido cur non mittendus. 38
- Sanguinis missio sæpius iterata efficacius reuellit. 81
- Sanguinis missione innoxie semper vti

I N D E X.

volentibus quæ sint cognitu neces- saria.	83
Sanguinis mittendi primis scopi. eod.	
Sanguinis missione vti tutius est in o- mni pleuritide , quàm purgatio- ne.	56
Sanguinis missio à uictu præcedenti cõ- templanda.	38
Sanguinis missio à corporis habitu per- pendenda.	39
Sanguinis missionem ex venis poplitis & malleoli, iam retractionem, iam de- riuationem vocat Galenus.	114
Sanguinis missio iteranda.	106
Sanguinis missio à regione considerã- da.	38
Sanguinis missio ab excretionibus cõ- suetis contemplanda.	39
Sanguinis missionem cur ægri ferre nõ possint.	6
Sanguinis missione ijs qui rectè vti vo- lunt, tria considerata.	eod.
Sanguinis missio ab exercitijs perpen- denda.	39
Sanguinis mittendi occasio quomodo dierum numero amittatur.	127
Sanguis quo tempore mittendus in fe- brib	

bribus.	128
Sanguinis mittendi primi & maxime proprij scopi.	57
Sanguinis mittendi duo primi & maxime proprij scopi.	60
Sanguinis mittendi dignotionem tria in vniuersum continent.	61
Sanguinis mutatio non semper in colore expectanda.	88
Sanguinis mutatio quando expectanda.	eodem.
Sanguinis extracti quantitatis exemplum.	110
Sanguinis libræ sex quibusdam detractæ.	91
Sanguinis plusquàm hodie sit veteres extraxerunt.	eodẽ.
Sanitas quid.	24
Scarificatio quibus malis proffit	149
Scarificatione crurum cur vtendũ.	150
Scarificatione quando vtendum.	149
Sciatica.	116
Scirrhus.	34
Scopi mensuræ vacuationis duo.	10
Scopi primi in sanguinis missione expendendi, decem.	37
Senectus sub robore viriũ completi- tur.	62

I N D E X.

Senatores Romani vehiculis vfi.	111
Senioribus minus quàm florentibus æ-	
tate sanguinis extrahendum.	86
Signa tria quibus quo tempore sanguis	
effluxus fit cohibendus cognoscimus.	87
Signa validæ virtutis è pulsu cogno-	
scenda.	85
Signa quibusvacuationis quantitas co-	
gnoscitur.	64
Species plenitudinis vt distinguenda.	41
Spongia.	141
Stomachus propriè quid.	7
Stomachus abusiue, Os ventriculi voca-	
tur.	eodem.
Structura thoracis idonea ad spuitio-	
nem sanguinis.	66
T Αμερίνυς Θιάκι.	76
Θιώραμα.	6
Theodorici Gaudani versio notatur.	
8.114.129.121.	
Temperãtia in victu opus est ad poda-	
græ & articulorum doloris cura-	
tionem.	48
Temperamentum ægrotantis calidum	
& humidum.	90
Tempus in sanguinis missione expen-	
dendum.	38

Tempus matutinum quando ad venam
secundam convenientissimū. 130

Tempore calido cur non vacuandū. 38

Tempore frigido sanguis non mitten-
dus. eodem.

Tensio signū plenitudinis ad vasa. 40

Τριχίαις 110

Vacuatio simplex. 96. & 119

Vacuatio retrahēs & derivā. eod.

Vacuatio interdum idem quod deriva-
tio significat. 121

Vacuatio non est proroganda in sup-
pressis mensibus. 69

Vacuationis quantitas per venę sectio-
nem coniecturalis efficitur propter
duo 90

Vacuationē quando partiri oporteat. 75

Vacuationis quatuor modi. 96

Vacuationis vocē Galenus vtitur inter-
dum pro derivatione 101

Vacuationes confertæ cauendæ nisi ma-
gna necessitas urgeat. 81

Vena axillaris gibberi, & iecoraria ea-
dem. 107

Vena in contrario latere cur non sit in-
cidenda in pleuritide. 103

I N D E X.

Vena par ^{is} expers.	98
Vena quando secanda in profluuo sanguinis narium.	73
Vena quę secāda in pleuritide.	97. & 102
Vena quę incidenda, si ea quę parti laboranti propria est non apparet.	107
Venę poplitis sectio.	116
Vena quę est inter annularem & mediu ^m digitum secabatur olim in lienis affectibus	92
Venę communes	100
Venę primę quę.	126
Venę laborantibus iam partibus quę incidendę.	118
Venę sectio purgationi præfertur.	71
Venę sectione non semper opus.	26
Venę sectionem in profluuo sanguinis vt reuulsorio præsidio vtuntur.	73
Venę sectio reuulsorium remedium.	72
Venę sectio quę in rectum fit tanto est præstantior quanto morbi initio vicinior.	105
Venę sectio cur iu internis inflammationibus commodior	56
Venę quę secandę partibus nondum laborantibus.	122
Venarum quę secanda.	10

I N D E X.


Venam ſæpius per annum incidere no-	160
xa non caret	150
Venam paris expertem quare Galenus	
sub corde emergere tradit.	99
Venę ex contrarij lateris ſeſſione quę	
incommoda ſequantur.	103
Venis proximis quando vacnandum,	
item quando ex diſtantiſſimis.	102
Viſus præcedens in ſanguinis miſſione	
contemplandus.	38
Virium diſſolutionis quę cauſę.	90
Virium robur & infirmitas.	37
Virtutis robur à copioſa cruditate exol-	
uitur.	84
Vlceris ſenſus.	24
Z Opiffa.	141


FINIS.

BIBLIOTECA NAZ.
ROMA
GIORGIO EMANUELE











REST. LIBRO ANTICO
Cav. Giovanni D' Giacomo
Tel. 71550 - PESCARA

1975

